

Chapter 12 : Coordinate Geometry II

শুরু করার আগে ৬ নম্বর অধ্যায় থেকে দূরত্বের সূত্র, ঢাল, সরলরেখা ও বৃত্তের সমীকরণ, এবং ৭ নম্বর অধ্যায় থেকে একক বৃত্ত, radian এবং যোগ ও বিয়োগ সূত্র ঝালিয়ে নাও। ৩ নম্বর অধ্যায়ের পূর্ণবর্গ সম্পূর্ণ করার কায়দাটিও এখানে বারবার লাগবে।

৬ নম্বর অধ্যায়ে আমরা একটি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা বেছে নিয়ে তাতে জ্যামিতি করেছিলাম। এই অধ্যায়ের মূল সুর একটু আলাদা: স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটি নিজেই আমাদের পছন্দ, এবং বুদ্ধি করে বেছে নিলে একই সমস্যা অনেক সহজ হয়ে যায়। প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা অক্ষ সরাব ও ঘোরাব; দ্বিতীয়টিতে দেখব যে একটিমাত্র সংজ্ঞা থেকে parabola, ellipse ও hyperbola তিনটিই বেরিয়ে আসে; তৃতীয়টিতে কার্ভেসীয় অক্ষ ছেড়ে দিয়ে কোণ ও দূরত্ব দিয়ে বিন্দু চিহ্নিত করব; আর শেষটিতে সেই ধারণাকে তিন মাত্রায় নিয়ে যাব।

শেষ অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে ভবিষ্যতের জন্য। ২১ নম্বর অধ্যায়ে vector calculus করতে গিয়ে cylindrical ও spherical স্থানাঙ্ক লাগবেই; সেগুলোর জ্যামিতিটুকু এখানে সেরে রাখলে তখন কেবল ক্যালকুলাসটুকু করলেই চলবে। এই অধ্যায়ে মোট ৩৪ পয়েন্ট আছে।

১ অক্ষের স্থানান্তর ও ঘূর্ণন

একটি বক্ররেখা যা, তা-ই থাকে; কিন্তু তার সমীকরণ নির্ভর করে আমরা অক্ষ কোথায় বসিয়েছি তার উপর। তাই অক্ষ সরিয়ে বা ঘুরিয়ে সমীকরণটিকে সরল করে নেওয়া যায়।

ধারণা ১: অক্ষের স্থানান্তর

নতুন মূলবিন্দু পুরনো ব্যবস্থার (h, k) বিন্দুতে বসালে এবং অক্ষের দিক অপরিবর্তিত রাখলে, একই বিন্দুর পুরনো স্থানাঙ্ক (x, y) ও নতুন স্থানাঙ্ক (x', y') -এর সম্পর্ক

$$x' = x - h, \quad y' = y - k,$$

অর্থাৎ $x = x' + h, y = y' + k$ ।

চিহ্ন নিয়ে গুলিয়ে ফেলা এখানে খুব সাধারণ। মনে রাখার সহজ উপায়: নতুন মূলবিন্দু ডান দিকে h সরালে প্রতিটি বিন্দুকে নতুন ব্যবস্থায় h কম দূরে মনে হবে, তাই বিয়োগ। ১০ নম্বর অধ্যায়ে ফাংশনের লেখচিত্র সরানোর সময় ঠিক একই ব্যাপার ঘটেছিল, কেবল সেখানে আমরা ছবিটা সরাচ্ছিলাম, এখানে অক্ষ সরাচ্ছি; দুটি একে অপরের উল্টো।

উদাহরণ ১

$x^2 + y^2 - 6x + 4y - 12 = 0$ বক্ররেখাটি শনাক্ত করো এবং উপযুক্ত স্থানান্তরের পরে তার সমীকরণ লেখো।

সমাধান

x ও y আলাদা করে পূর্ণবর্গ সম্পূর্ণ করি:

$$(x^2 - 6x + 9) + (y^2 + 4y + 4) = 12 + 9 + 4 \implies (x - 3)^2 + (y + 2)^2 = 25.$$

এটি $(3, -2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট ৫ ব্যাসার্ধের বৃত্ত। নতুন মূলবিন্দু $(3, -2)$ -এ বসালে, অর্থাৎ $h = 3, k = -2$ নিলে,

$x' = x - 3$ ও $y' = y + 2$, তাই সমীকরণ দাঁড়ায়

$$x'^2 + y'^2 = 25.$$

পূর্ণবর্গ সম্পূর্ণ করা আর অক্ষ সরানো আসলে একই কাজ, দুই ভাষায় বলা।


ধারণা ২: অক্ষের ঘূর্ণন

অক্ষ দুটিকে মূলবিন্দুর সাপেক্ষে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে θ কোণে ঘোরালে

$$x' = x \cos \theta + y \sin \theta, \quad y' = -x \sin \theta + y \cos \theta,$$

এবং উল্টো দিকে

$$x = x' \cos \theta - y' \sin \theta, \quad y = x' \sin \theta + y' \cos \theta.$$



প্রমাণটি ৭ নম্বর অধ্যায়ের বিয়োগ সূত্র থেকে সরাসরি আসে। ধরি P বিন্দুটি মূলবিন্দু থেকে r দূরে এবং পুরনো x -অক্ষের সঙ্গে α কোণে, অর্থাৎ

$$x = r \cos \alpha, \quad y = r \sin \alpha.$$

নতুন অক্ষ θ কোণে ঘোরানো, তাই নতুন ব্যবস্থায় P -এর কোণ $\alpha - \theta$ এবং দূরত্ব সেই একই r । সুতরাং

$$x' = r \cos(\alpha - \theta) = r \cos \alpha \cos \theta + r \sin \alpha \sin \theta = x \cos \theta + y \sin \theta,$$

$$y' = r \sin(\alpha - \theta) = r \sin \alpha \cos \theta - r \cos \alpha \sin \theta = -x \sin \theta + y \cos \theta.$$

উল্টো সম্পর্ক দুটি একইভাবে পাওয়া যায়, কেবল θ -এর জায়গায় $-\theta$ বসিয়ে।

ঘূর্ণনের সবচেয়ে বড় ব্যবহার হলো দ্বিঘাত সমীকরণ থেকে xy পদটি তাড়ানো। সাধারণ দ্বিঘাত সমীকরণ

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0.$$

উপরের প্রতিস্থাপন বসিয়ে গুণ করলে নতুন $x'y'$ পদের সহগ দাঁড়ায়

$$B' = B (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) - 2(A - C) \sin \theta \cos \theta.$$

৭ নম্বর অধ্যায়ের যোগ সূত্রে $B = A$ বসালেই পাওয়া যায় $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$ এবং $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$ (এই দুটি ১৩ নম্বর অধ্যায়ে আলাদা করে আসবে)। তাই

$$B' = B \cos 2\theta - (A - C) \sin 2\theta,$$

এবং $B' = 0$ করতে চাইলে

$$\cot 2\theta = \frac{A - C}{B}.$$

উদাহরণ ২

$xy = 1$ বক্ররেখাটি অক্ষ 45° ঘুরিয়ে শনাক্ত করো।

সমাধান

এখানে $A = C = 0$, তাই $\cot 2\theta = 0$, অর্থাৎ $2\theta = 90^\circ$ এবং $\theta = 45^\circ$ । তখন $\cos \theta = \sin \theta = 1/\sqrt{2}$, সুতরাং

$$x = \frac{x' - y'}{\sqrt{2}}, \quad y = \frac{x' + y'}{\sqrt{2}}.$$

বসিয়ে দিলে

$$xy = \frac{(x' - y')(x' + y')}{2} = \frac{x'^2 - y'^2}{2} = 1,$$

অর্থাৎ

$$\frac{x'^2}{2} - \frac{y'^2}{2} = 1.$$

এটি একটি hyperbola, যার অক্ষ পুরনো ব্যবস্থার $y = x$ রেখা বরাবর। অর্থাৎ $xy = 1$ আর “মান বিপরীত অনুপাতে বদলায়” এই চেনা লেখচিত্রটি আসলে একটি hyperbola, কেবল 45° হেলানো অবস্থায় বসানো।

- [২] **সমস্যা ১।** $x^2 + 4y^2 + 6x - 16y + 21 = 0$ সমীকরণটিকে উপযুক্ত স্থানান্তরের মাধ্যমে সরলতম রূপে আনো এবং কেন্দ্র নির্ণয় করো।
- [২] **সমস্যা ২।** অক্ষকে 30° ঘোরানো হলো। $(x, y) = (\sqrt{3}, 1)$ বিন্দুটির নতুন স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এবং ফলটি ব্যাখ্যা করো।
- [৩] **সমস্যা ৩।** অক্ষ θ কোণে ঘোরানো হলে দেখাও যে $x'^2 + y'^2 = x^2 + y^2$ । এখান থেকে দেখাও যে দুটি বিন্দুর মধ্যকার দূরত্ব ঘূর্ণনে বদলায় না।

২ কনিক


ধারণা ৩: Focus, directrix ও eccentricity

একটি বিন্দু F (focus), একটি সরলরেখা d (directrix, যা F -এর মধ্য দিয়ে যায় না) এবং একটি ধনাত্মক সংখ্যা e (eccentricity) নাও। যেসব বিন্দু P -এর জন্য

$$PF = e \cdot \text{dist}(P, d),$$

তাদের সমষ্টিকে বলে conic। $e < 1$ হলে ellipse, $e = 1$ হলে parabola, $e > 1$ হলে hyperbola।

তিনটি আলাদা বক্ররেখা নয়, একটিই পরিবার; কেবল e সংখ্যাটি বদলায়। এই একত্রিত দৃষ্টিভঙ্গিটাই তৃতীয় অনুচ্ছেদে সবচেয়ে বেশি কাজে দেবে।



$e = 1$ ক্ষেত্রটি দিয়ে শুরু করি, কারণ সেটি সবচেয়ে সহজ। Focus $(p, 0)$ এবং directrix $x = -p$ নিলে শর্তটি দাঁড়ায়

$$\sqrt{(x-p)^2 + y^2} = x + p.$$

দুই পাশ বর্গ করে

$$x^2 - 2px + p^2 + y^2 = x^2 + 2px + p^2 \implies y^2 = 4px.$$

এটিই parabola-র আদর্শ রূপ। $p > 0$ হলে সে ডানে খোলে, $p < 0$ হলে বামে।

এবার $e \neq 1$ । Focus $(ae, 0)$ এবং directrix $x = a/e$ নিই, যেখানে $a > 0$ একটি ধ্রুবক (কেন এই বিশেষ পছন্দ, তা এম্ফুনি পরিষ্কার হবে)। শর্তটি

$$\sqrt{(x-ae)^2 + y^2} = e \left(\frac{a}{e} - x \right) = a - ex.$$

বর্গ করে

$$x^2 - 2aex + a^2e^2 + y^2 = a^2 - 2aex + e^2x^2,$$

অর্থাৎ $x^2(1-e^2) + y^2 = a^2(1-e^2)$ । $a^2(1-e^2)$ দিয়ে ভাগ করে

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2(1-e^2)} = 1.$$

ধারণা 8: Ellipse ও hyperbola-র আদর্শ রূপ

$e < 1$ হলে $b^2 = a^2(1-e^2) > 0$ ধরে

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{ellipse, } a > b),$$

এবং $e > 1$ হলে $b^2 = a^2(e^2 - 1) > 0$ ধরে

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \quad (\text{hyperbola}).$$

দুই ক্ষেত্রেই $c = ae$ লিখলে focus $(\pm c, 0)$, এবং

$$c^2 = a^2 - b^2 \text{ (ellipse), } c^2 = a^2 + b^2 \text{ (hyperbola), } e = \frac{c}{a}.$$

Hyperbola-র asymptote দুটি $y = \pm \frac{b}{a}x$ ।

a -কে ওভাবে বেছে নেওয়ার কারণটা এবার দেখা যাচ্ছে: ellipse-এর ক্ষেত্রে $x = \pm a$ বিন্দু দুটিই বক্ররেখার দুই প্রান্ত, তাই a হলো অর্ধ-বৃহৎ অক্ষ।

উপরের হিসাবের মাঝপথে একটি ফল লুকিয়ে আছে, যা আলাদা করে তুলে রাখার মতো। শর্তটি লেখার সময়ই আমরা পেয়েছি

$$PF_2 = a - ex,$$

যেখানে $F_2 = (ae, 0)$ । প্রতিসাম্যের কারণে বাম দিকের focus $F_1 = (-ae, 0)$ ও তার directrix $x = -a/e$ নিলে একইভাবে $PF_1 = a + ex$ । যোগ করলে

$$PF_1 + PF_2 = 2a.$$

অর্থাৎ ellipse-এর যেকোনো বিন্দু থেকে দুই focus-এর দূরত্বের যোগফল ধ্রুবক। এটিই সেই চেনা সুতোর কৌশল: দুটি পিন পুঁতে সুতো টান টান রেখে পেন্সিল ঘোরালে ellipse আঁকা হয়। Hyperbola-র ক্ষেত্রে একই হিসাব দেয় $|PF_1 - PF_2| = 2a$, যোগফলের বদলে বিয়োগফল।

ধারণা ৫: সাধারণ দ্বিঘাত সমীকরণ চেনা

$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0$ সমীকরণটি (অবক্ষ্যী ক্ষেত্র বাদে)

$$B^2 - 4AC < 0 \Rightarrow \text{ellipse, } B^2 - 4AC = 0 \Rightarrow \text{parabola, } B^2 - 4AC > 0 \Rightarrow \text{hyperbola.}$$

কেন এটি কাজ করে? কারণ $B^2 - 4AC$ রাশিটি অক্ষের ঘূর্ণন ও স্থানান্তরে বদলায় না। এই অপরিবর্তনীয়তা এখানে প্রমাণ করা হচ্ছে না, ধরে নেওয়া হচ্ছে; তবে ইচ্ছা করলে আগের অনুচ্ছেদের প্রতিস্থাপন বসিয়ে হাতে যাচাই করা যায়, কেবল হিসাবটা লম্বা। অবক্ষ্যী ক্ষেত্র বলতে বোঝানো হচ্ছে সেসব ক্ষেত্র, যেখানে সমীকরণটি একটি বিন্দু, এক জোড়া সরলরেখা, বা কিছুই না বোঝায়; যেমন $x^2 + y^2 = 0$ ।

উদাহরণ ৩

$9x^2 + 4y^2 - 18x + 16y - 11 = 0$ শনাক্ত করো এবং তার কেন্দ্র, a , b , focus ও eccentricity নির্ণয় করো।

সমাধান

$B = 0$ এবং $B^2 - 4AC = -144 < 0$, তাই ellipse আশা করছি। পূর্ণবর্গ সম্পূর্ণ করি:

$$9(x^2 - 2x) + 4(y^2 + 4y) = 11 \implies 9(x - 1)^2 - 9 + 4(y + 2)^2 - 16 = 11,$$

অর্থাৎ $9(x - 1)^2 + 4(y + 2)^2 = 36$, এবং 36 দিয়ে ভাগ করে

$$\frac{(x - 1)^2}{4} + \frac{(y + 2)^2}{9} = 1.$$

কেন্দ্র $(1, -2)$ । বড় হরটি y -এর নিচে, তাই বৃহৎ অক্ষ উল্লম্ব: $a = 3$ (উল্লম্ব দিকে), $b = 2$ । সুতরাং

$$c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{5}, \quad e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{3} \approx 0.745.$$

Focus দুটি কেন্দ্র থেকে উল্লম্বভাবে $\sqrt{5}$ দূরে, অর্থাৎ $(1, -2 \pm \sqrt{5})$ ।

- [২] সমস্যা ৪। $y^2 = -12x$ parabola-টির focus, directrix ও অক্ষ নির্ণয় করো, এবং সে কোন দিকে খোলে তা বলো।
- [২] সমস্যা ৫। $4x^2 + 9y^2 - 8x + 36y + 4 = 0$ শনাক্ত করো এবং কেন্দ্র, a , b , focus ও eccentricity নির্ণয় করো।
- [৩] সমস্যা ৬। $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ hyperbola-র জন্য দেখাও যে x বড় হলে বক্ররেখাটি $y = \frac{b}{a}x$ রেখার যত কাছে ইচ্ছা চলে যায়, কিন্তু কখনো তাকে ছোঁয় না।
- [৩] সমস্যা ৭। $5x^2 - 6xy + 5y^2 - 8 = 0$ বক্ররেখাটি ঘূর্ণন ব্যবহার করে শনাক্ত করো এবং তার a ও b নির্ণয় করো।

৩ পোলার স্থানাঙ্ক

কোনো বিন্দু চিহ্নিত করার আরেকটি স্বাভাবিক উপায় হলো বলা: মূলবিন্দু থেকে কত দূরে, আর কোন দিকে। এটিই polar coordinate, এবং বৃত্তীয় প্রতিসাম্য থাকলে এতে কাজ অনেক সহজ হয়।



ধারণা ৬: Polar coordinate

বিন্দু P -এর polar coordinate (r, θ) , যেখানে r হলো মূলবিন্দু থেকে দূরত্ব এবং θ হলো ধনাত্মক x -অক্ষ থেকে ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে মাপা কোণ। সম্পর্কগুলো

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \cos \theta = \frac{x}{r}, \quad \sin \theta = \frac{y}{r}.$$

এই সিরিজে আমরা সবসময় $r \geq 0$ ধরব।



মন্তব্য

$r \geq 0$ শর্তটি একটি পছন্দ, সর্বজনীন নিয়ম নয়। অনেক ক্যালকুলাস বইয়ে r ঋণাত্মকও হতে দেওয়া হয়, যেখানে $(-r, \theta)$ মানে $(r, \theta + \pi)$ বিন্দুটি। পদার্থবিজ্ঞানে দূরত্ব ঋণাত্মক হয় না, তাই আমরা $r \geq 0$ -ই রাখছি। এর একটি ফল আছে যা খেয়াল রাখতে হবে: $r = f(\theta)$ ধরনের বক্ররেখা কেবল সেসব θ -তে সংজ্ঞায়িত, যেখানে $f(\theta) \geq 0$ । একই বক্ররেখার সমীকরণ তাই দুই নিয়মে দুই রকম বস্তু বোঝাতে পারে, আর সেটাই এই অনুচ্ছেদের শেষ সমস্যাটির বিষয়।

আরেকটি ছোট কথা: (r, θ) আর $(r, \theta + 2\pi)$ একই বিন্দু, তাই polar coordinate এক-এক নয়। মূলবিন্দুতে $r = 0$ এবং θ অনির্ধারিত।

ধারণা ৭: কয়েকটি চেনা বক্ররেখা

- (ক) $r = a$ (ধ্রুবক) হলো মূলবিন্দু-কেন্দ্রিক a ব্যাসার্ধের বৃত্ত।
- (খ) $\theta = \alpha$ (ধ্রুবক) হলো মূলবিন্দু থেকে বেরোনো একটি রশ্মি, পুরো সরলরেখা নয়, কারণ $r \geq 0$ ।
- (গ) $r = 2a \cos \theta$ হলো $(a, 0)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট a ব্যাসার্ধের বৃত্ত, যা মূলবিন্দু দিয়ে যায়।

তৃতীয়টি দেখা সহজ। দুই পাশকে r দিয়ে গুণ করে

$$r^2 = 2ar \cos \theta \implies x^2 + y^2 = 2ax \implies (x - a)^2 + y^2 = a^2.$$

r দিয়ে গুণ করার ধাপটি মূলবিন্দুতে ($r = 0$) বাড়তি একটি সমাধান ঢোকাতে পারে, কিন্তু এখানে মূলবিন্দু এমনিতেই বক্ররেখার উপরে ($\theta = \pi/2$ -তে $r = 0$), তাই কোনো ক্ষতি নেই।

উদাহরণ ৪

$x^2 + y^2 = 4x$ বৃত্তটিকে polar আকারে লেখো, এবং $r = 3 \sin \theta$ -কে কার্তেসীয় আকারে লিখে শনাক্ত করো।

সমাধান

প্রথমটি: $x^2 + y^2 = r^2$ ও $x = r \cos \theta$ বসিয়ে $r^2 = 4r \cos \theta$, অর্থাৎ $r = 4 \cos \theta$ (এবং $r = 0$, যা এই বক্ররেখারই একটি বিন্দু)।

দ্বিতীয়টি: দুই পাশকে r দিয়ে গুণ করে $r^2 = 3r \sin \theta$, অর্থাৎ

$$x^2 + y^2 = 3y \implies x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{9}{4}.$$

এটি $(0, 3/2)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট $3/2$ ব্যাসার্ধের বৃত্ত, যা মূলবিন্দু স্পর্শ করে এবং y -অক্ষের উপর বসানো।

ধারণা ৮: Conic-এর polar সমীকরণ

Focus মূলবিন্দুতে এবং directrix $x = d$ ($d > 0$) রেখায় বসালে eccentricity e বিশিষ্ট conic-এর সমীকরণ

$$r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta}.$$

প্রমাণটি ছবির ডান পাশ থেকে এক লাইনে আসে। P বিন্দুর focus থেকে দূরত্ব r , আর directrix থেকে দূরত্ব $d - r \cos \theta$ । সংজ্ঞা বলছে

$$r = e(d - r \cos \theta) \implies r(1 + e \cos \theta) = ed \implies r = \frac{ed}{1 + e \cos \theta}.$$

Directrix বাম পাশে ($x = -d$) বসালে হরে চিহ্নটি বিয়োগ হয়ে যায়, আর directrix অনুভূমিক হলে $\cos$ -এর জায়গায় $\sin$ আসে।

এই একটিমাত্র সমীকরণে তিনটি conic-ই ধরা আছে, এবং focus মূলবিন্দুতে বসানো বলে এটিই সেই রূপ যা পদার্থবিজ্ঞানে দরকার হয়।

উদাহরণ ৫

$r = \frac{6}{1 + \frac{1}{2} \cos \theta}$ বক্ররেখাটি শনাক্ত করো এবং তার e , d , focus থেকে নিকটতম ও দূরতম দূরত্ব, এবং a নির্ণয় করো।

সমাধান

আদর্শ রূপের সঙ্গে মিলিয়ে $e = \frac{1}{2}$ এবং $ed = 6$, তাই $d = 12$ । $e < 1$, সুতরাং এটি একটি ellipse যার একটি focus মূলবিন্দুতে।

$\cos \theta$ -এর মান -1 থেকে 1 পর্যন্ত যায়, তাই হর সবচেয়ে বড় হয় $\theta = 0$ -তে এবং সবচেয়ে ছোট হয় $\theta = \pi$ -তে:

$$r_{\min} = \frac{6}{1 + \frac{1}{2}} = 4, \quad r_{\max} = \frac{6}{1 - \frac{1}{2}} = 12.$$

এই দুটি হলো বৃহৎ অক্ষের দুই প্রান্ত, তাই $2a = 4 + 12 = 16$, অর্থাৎ $a = 8$ । তারপর $c = ae = 4$ এবং $b = a\sqrt{1 - e^2} = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3}$ । যাচাই: $a - c = 8 - 4 = 4 = r_{\min}$, মিলে যাচ্ছে।

মন্তব্য

গ্রহের কক্ষপথ ঠিক এই আকারের: সূর্য একটি focus-এ, আর কক্ষপথ একটি conic যার e কক্ষপথের চ্যাপ্টা ভাব ঠিক করে। পৃথিবীর জন্য $e \approx 0.017$, অর্থাৎ প্রায় বৃত্ত; ধূমকেতুর জন্য e প্রায় 1 , তাই সে লম্বা সরু পথে আসে আর যায়। উপরের $r_{\min}$ ও $r_{\max}$ হলো সূর্যের নিকটতম ও দূরতম বিন্দু।

কেন বর্গ-বিপরীত আকর্ষণ থেকে ঠিক এই বক্ররেখাগুলোই বেরোয়, সেটি এখানে দেখানো যাচ্ছে না; তার জন্য differential equation লাগে, যা ১৯ নম্বর অধ্যায়ের বিষয়। এখানে কেবল এটুকু জেনে রাখো যে যন্ত্রপাতিটা তৈরি হয়ে গেল।

[২] সমস্যা ৮। নিচেরগুলোকে polar আকারে লেখো এবং শনাক্ত করো।

(ক) $x^2 + y^2 = 9$

(খ) $y = x$

(গ) $x^2 + y^2 - 6y = 0$

[২] সমস্যা ৯। $r = 4 \sin \theta + 2 \cos \theta$ বক্ররেখাটিকে কার্তেসীয় আকারে লিখে শনাক্ত করো।

[৩] সমস্যা ১০। $r = \frac{8}{3 + \cos \theta}$ বক্ররেখাটি শনাক্ত করো এবং e, d, a, b, c এবং focus থেকে নিকটতম ও দূরতম দূরত্ব নির্ণয় করো।

[৩] সমস্যা ১১। $r = 4 \cos 2\theta$ বক্ররেখাটি $r \geq 0$ নিয়মে বিবেচনা করো। কোন কোন θ -তে এটি সংজ্ঞায়িত, এবং লেখচিত্রে কয়টি পাপড়ি থাকবে? r ঋণাত্মক হতে দিলে উত্তর কীভাবে বদলাত?

৪ অন্যান্য বক্ররৈখিক স্থানাঙ্ক

তিন মাত্রায় polar-এর দুটি স্বাভাবিক সম্প্রসারণ আছে, আর কোনটি বেছে নেবে তা ঠিক করে দেয় সমস্যার প্রতিসাম্য: অক্ষ-প্রতিসাম্য হলে cylindrical, বিন্দু-প্রতিসাম্য হলে spherical।

ধারণা ৯: Cylindrical coordinate (s, ϕ, z)

s হলো z -অক্ষ থেকে বিন্দুটির লম্ব দূরত্ব, ϕ হলো ধনাত্মক x -অক্ষ থেকে xy -সমতলে মাপা কোণ, আর z যথারীতি উচ্চতা। এখানে $s \geq 0$ এবং $0 \leq \phi < 2\pi$ ।

$$x = s \cos \phi, \quad y = s \sin \phi, \quad z = z,$$


$$s = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}.$$

ধারণা ১০: Spherical coordinate (r, θ, ϕ)

r হলো মূলবিন্দু থেকে দূরত্ব, θ হলো ধনাত্মক z -অক্ষ থেকে মাপা কোণ (polar angle), আর ϕ হলো আগের মতোই xy -সমতলে মাপা কোণ (azimuthal angle)। এখানে $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \phi < 2\pi$ ।

$$x = r \sin \theta \cos \phi, \quad y = r \sin \theta \sin \phi, \quad z = r \cos \theta,$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, \quad \cos \theta = \frac{z}{r}, \quad \tan \phi = \frac{y}{x}.$$



Spherical সূত্র তিনটি মুখস্থ করার দরকার নেই, ছবি থেকে দুই ধাপে বেরিয়ে আসে। P থেকে z -অক্ষের উপর লম্ব ফেলো। যে সমকোণী ত্রিভুজ হয় তার অতিভুজ r এবং z -অক্ষের সঙ্গে কোণ θ , তাই

$$z = r \cos \theta, \quad s = r \sin \theta.$$

এবার xy -সমতলে নেমে এসো: সেখানে P -এর ছায়া মূলবিন্দু থেকে s দূরে এবং x -অক্ষের সঙ্গে ϕ কোণে, তাই আগের অনুচ্ছেদের polar সূত্র অনুযায়ী $x = s \cos \phi$ ও $y = s \sin \phi$ । এখানে s -এর জায়গায় $r \sin \theta$ বসিয়ে দিলেই তিনটি সূত্র পাওয়া গেল।

ধারণা ১১: ধ্রুবক স্থানাঙ্কের তল

- (ক) $s = s_0$: z -অক্ষ ঘিরে s_0 ব্যাসার্ধের cylinder।
- (খ) $\phi = \phi_0$: z -অক্ষে কজা লাগানো একটি অর্ধ-সমতল।
- (গ) $r = r_0$: মূলবিন্দু-কেন্দ্রিক r_0 ব্যাসার্ধের গোলক।
- (ঘ) $\theta = \theta_0$: মূলবিন্দুতে শীর্ষবিন্দুবিশিষ্ট একটি অর্ধ-cone, যার অক্ষ z -অক্ষ। বিশেষ ক্ষেত্রে $\theta_0 = \pi/2$ দেয় xy -সমতল।

মন্তব্য

এখানে একটি সতর্কবার্তা, এবং এটি সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ। গণিতের বইয়ে (এই সিরিজের সহায়ক বইগুলো সহ) spherical coordinate লেখা হয় (ρ, θ, ϕ) আকারে, যেখানে θ হলো azimuthal কোণ আর ϕ হলো z -অক্ষ থেকে মাপা কোণ; অর্থাৎ আমাদের θ ও ϕ -এর ভূমিকা ঠিক উল্টো, আর দূরত্বকে বলা হয় ρ । পদার্থবিজ্ঞানে প্রায় সর্বত্র (এবং ২১ নম্বর অধ্যায়ে) উপরের নিয়মটিই চলে, তাই এই সিরিজ সেটিকেই ধরছে। বই বদলালে প্রথমেই ছবি দেখে যাচাই করে নাও কোন অক্ষর কোন কোণ বোঝাচ্ছে; নাহলে একটি sine আর একটি cosine অদলবদল হয়ে গোটা হিসাব ভুল হয়ে যাবে।

দ্বিতীয় ছোট কথা: দ্বিমাত্রিক polar coordinate-এ আমরা কোণটিকে θ বলেছি, যেটি তিন মাত্রায় গিয়ে ϕ হয়ে গেল। এটি অসংগতি নয়, প্রচলিত অভ্যাস; সমতলে কোণ একটাই, তাই তার নাম নিয়ে বিভ্রান্তির সুযোগ নেই।

মন্তব্য

ভূগোলের সঙ্গে মিলিয়ে নিলে θ মনে রাখা সহজ। ϕ হলো দ্রাঘিমাংশ (longitude), আর θ হলো উত্তর মেরু থেকে মাপা কোণ, অর্থাৎ অক্ষাংশ নয় বরং তার পরিপূরক; অক্ষাংশকে λ ধরলে $\theta = 90^\circ - \lambda$ । উত্তর মেরুতে $\theta = 0$, বিষুবরেখায় $\theta = 90^\circ$, দক্ষিণ মেরুতে $\theta = 180^\circ$ ।

উদাহরণ ৬

(ক) $(x, y, z) = (0, 2, 2\sqrt{3})$ বিন্দুটির spherical স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।

(খ) $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ তলটিকে spherical স্থানাঙ্কে প্রকাশ করো।

সমাধান

(১) $r = \sqrt{0 + 4 + 12} = 4$ । তারপর $\cos \theta = z/r = 2\sqrt{3}/4 = \sqrt{3}/2$, অর্থাৎ $\theta = 30^\circ$ । xy -সমতলে ছায়াটি $(0, 2)$, যা ধনাত্মক y -অক্ষের উপর, তাই $\phi = 90^\circ$ । সুতরাং $(r, \theta, \phi) = (4, 30^\circ, 90^\circ)$ ।

যাচাই: $x = 4 \sin 30^\circ \cos 90^\circ = 0$, $y = 4 \sin 30^\circ \sin 90^\circ = 2$, $z = 4 \cos 30^\circ = 2\sqrt{3}$ ।

(২) $\sqrt{x^2 + y^2} = s = r \sin \theta$ এবং $z = r \cos \theta$, তাই শর্তটি দাঁড়ায় $r \cos \theta = r \sin \theta$ । মূলবিন্দু বাদে $r > 0$, তাই $\tan \theta = 1$, অর্থাৎ

$$\theta = \frac{\pi}{4}.$$

অর্থাৎ তলটি একটি অর্ধ-cone, যা ঠিক ধ্রুবক- θ তলের উদাহরণ। কার্তেসীয় আকারে এটি চেনা কঠিন ছিল, spherical-এ একটিমাত্র সমীকরণ।

[২] সমস্যা ১২।

(ক) $(x, y, z) = (1, 1, \sqrt{2})$ -এর spherical স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।

(খ) $(r, \theta, \phi) = (6, 60^\circ, 120^\circ)$ -এর কার্তেসীয় স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।

[২] সমস্যা ১৩। নিচের প্রতিটি সমীকরণ কোন তল বোঝায় তা বর্ণনা করো।

(ক) $r = 3$ (spherical)

(খ) $\theta = \pi/4$ (spherical)

(গ) $\phi = \pi/3$

(ঘ) $s = 2$ (cylindrical)

[৩] সমস্যা ১৪। Spherical স্থানাঙ্কে $r = 2a \cos \theta$ ($a > 0$) সমীকরণটি কোন তল বোঝায়? তার কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো।