Les valeurs manquantes selon la provenance
Pourcentage calculé dans chaque source, variable par variable
Âge (ans) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
Sexe 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
Type de douleur thoracique 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
Pression artérielle au repos (mmHg) 0.0 % 0.3 % 1.6 % 28.6 %
Cholestérol (mg/dL) 0.0 % 7.5 % 100.0 % 28.1 %
Glycémie à jeun > 120 mg/dL 0.0 % 2.7 % 61.0 % 3.5 %
ECG au repos 0.0 % 0.3 % 0.8 % 0.0 %
Fréquence cardiaque maximale 0.0 % 0.3 % 0.8 % 26.6 %
Angine à l'effort 0.0 % 0.3 % 0.8 % 26.6 %
Dépression du segment ST 0.0 % 0.0 % 4.9 % 28.1 %
Pente du segment ST 0.0 % 64.5 % 13.8 % 50.8 %
Nombre de vaisseaux visualisés 1.3 % 99.0 % 95.9 % 99.0 %
Résultat du test au thallium 0.7 % 90.4 % 42.3 % 82.9 %
Diagnostic (code 0−4) 0.0 % 0.0 % 0.0 % 0.0 %
Cleveland (n = 303)
Hongrie (n = 293)
Suisse (n = 123)
VA Long Beach (n = 199)
% de NA
100
75
50
25
0
Source : UCI Heart Disease. Après dédoublonnage et recodage ciblé des zéros.
NA initiaux + zéros de pression au repos et de cholestérol ; aucune imputation.