

# TD - Outils Mathématiques

L1 - 4TPU101U

---

## Exercices et corrections

---

*Jules GAGNAIRE*



# Présentation

Les énoncés de ces exercices ne sont pas de moi : ils proviennent du livret d'exercices d'outils mathématiques réalisé par plusieurs chercheurs de l'université de Bordeaux. Les corrections proposées, en revanche, sont les miennes. N'hésitez pas à me contacter pour signaler d'éventuelles coquilles, proposer des solutions alternatives ou pour toute autre remarque à l'adresse suivante : [jules.gagnaire@math.u-bordeaux.fr](mailto:jules.gagnaire@math.u-bordeaux.fr). Les dernières mises à jour de ce document (ajouts d'exercices et de corrections) sont consultables directement sur mon site web, [en cliquant ici](#).

**Important, avis aux étudiants sur les corrections :** ne consultez une correction qu'après avoir sérieusement cherché l'exercice de votre côté, les corrections sont utiles pour vérifier votre réponse ou lever un doute précis. Lire directement une correction ne vous permettra jamais de comprendre le mécanisme de l'exercice. Si vous bloquez trop longtemps (entre 5 et 15 minutes selon l'énoncé), allez voir la correction et notez l'idée, la définition ou le théorème qui vous manquait pour réussir plutôt que de la lire en entier.

Les mathématiques se comprennent en réfléchissant, et en se trompant. Passer une heure à chercher sans rien écrire ne veut pas dire que vous n'avancez pas, c'est au contraire souvent là que vous construisez les images mentales et les manipulations qui vous feront progresser. Faire des mathématiques, ce n'est pas répéter des choses apprises par cœur, c'est apprendre à faire des « mouvements » dans sa tête.

La correction d'un exercice est une rédaction, une formulation universelle que tout le monde peut lire et comprendre. Mais elle ne reflète pas l'intuition qui a permis de la construire et c'est cette intuition qui est l'essence même des mathématiques. Tout le monde peut la développer, il n'y a pas d'élite. Comprendre une solution, ce n'est donc pas la même chose qu'avoir compris le mécanisme qui est derrière.

Cet [extrait](#) d'Alain Connes illustre ce que j'essaie d'expliquer (3min44). Pour une vidéo qui approfondit ce sujet, voir [cette conférence](#) de David Bessis (2h05).

**Important, avis aux étudiants sur l'IA :** l'intelligence artificielle générative est un outil formidable, mais son intérêt dépend entièrement de la manière dont on l'utilise. Les idées développées ci-dessus s'appliquent directement : donner l'énoncé à l'IA et lire sa réponse ne vous fera pas progresser en mathématiques, pas plus que lire directement la correction. En revanche, utiliser l'IA comme un mentor, pour obtenir des indices, est une bonne pratique, à condition qu'elle ne vous donne jamais la réponse directement. Ne lui demandez pas de l'aide d'emblée : cherchez d'abord de votre côté, puis présentez-lui vos idées, même incomplètes ou fausses, et demandez-lui de vous orienter sans résoudre l'exercice à votre place.

Voici un exemple de prompt que vous pouvez utiliser :

« Je travaille sur l'exercice suivant : [énoncé]. Voici ce que j'ai déjà essayé et compris : [vos idées, calculs, pistes]. Je suis bloqué sur [point précis]. Peux-tu m'aider à avancer en me donnant seulement un indice ou une piste de réflexion, sans me donner la solution ni l'étape suivante complète ? »

Pour plus d'information sur ce sujet regardez [cette vidéo](#) de Micode (38min23).

Vous avez toute liberté pour télécharger, imprimer, photocopier ce document et le diffuser gratuitement. Toute diffusion à titre onéreux ou utilisation commerciale est interdite sans accord de l'auteur. Si vous êtes le gestionnaire d'un site internet, vous avez le droit de créer un lien de votre site vers mon site, à condition que ce lien soit accessible librement et gratuitement. Vous ne pouvez pas télécharger les fichiers de mon site pour les installer sur le vôtre.

# Sommaire

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Préface                          | i         |
| <b>I Énoncés des exercices</b>   | <b>3</b>  |
| 1 Révisions                      | 5         |
| 2 Géométrie plane                | 11        |
| <b>II Solution des exercices</b> | <b>13</b> |
| 3 Révisions                      | 15        |



Première partie

**Énoncés des exercices**



# Chapitre 1

## Révisions

Exercices traités en séance de TD : 2, 3, 4, 9(a, b, c, g, i), 11 (a)

↓ **Fiche de rappel** : [télécharger la fiche de rappel de ce chapitre \(PDF\)](#)

Les exercices de ce chapitre reprennent des notions vues au lycée (souvent avant la Terminale). Si certaines d'entre elles ne vous rappellent rien, ce n'est pas grave : c'est justement l'objet de ce TD que de les revoir. Chaque solution est rédigée en détaillant *toutes* les étapes de calcul, y compris les plus élémentaires.

### EXERCICE 1

*Opposé – Inverse*

- Soit  $x$  un réel. L'opposé de  $x$  est ...
- Soit  $x$  un réel non nul. L'inverse de  $x$  est ...

Donner, lorsque c'est possible, l'opposé puis l'inverse de chacun de ces nombres :

$$a = 2 \quad b = \frac{3}{7} \quad c = \frac{11}{3} \quad d = 0 \quad e = \frac{1}{4} \quad f = -\sqrt{5}$$

→ **Voir la solution**

### EXERCICE 2

*Fractions et opérations*

Soit  $(a, c) \in \mathbb{R}^2$  et  $(b, d) \in (\mathbb{R}^*)^2$ .

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \dots \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \dots \quad \text{si } c \neq 0, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \dots$$

Calculer, sans calculatrice, les nombres suivants :

a)  $-5 - 2$

b)  $3 - 7$

c)  $3 + 5 \div 5 + 3$

d)  $3 + \frac{1}{3}$

e)  $-\frac{3}{2} + \frac{5}{4}$

f)  $\frac{2}{3} - \frac{3}{2}$

g)  $9 \times \frac{35}{9}$

h)  $\frac{4}{5} \times \frac{2}{5}$

i)  $\frac{7}{5} \div \frac{3}{10}$

j)  $-\frac{4/5}{5}$

k)  $\frac{4/9}{-3/2}$

l)  $\frac{1}{3} + \frac{7}{3} \times \left(\frac{3}{7} + \frac{5}{7}\right)$

→ **Voir la solution**

### EXERCICE 3

*Puissances*

Soit  $a \in \mathbb{R}^*$ ,  $b \in \mathbb{R}^*$  et  $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$ .

$$a^n = \dots \quad a^{-n} = \dots \quad a^n \times a^m = \dots \quad \frac{a^m}{a^n} = \dots \quad (a^m)^n = \dots \quad (ab)^n = \dots \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \dots$$

Simplifier :

- |                                    |                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) $(-2)^3$                        | h) $\frac{(5^3)^4}{(5^4)^5}$                                                                                              |
| b) $5^2$                           | i) $\frac{3^3 \times 7^4 \times (3^2)^3}{3^8 \times (7^2)^2}$                                                             |
| c) $3 \times 2^3$                  | j) $\frac{30 \times 10^{-7} \times 2 \times 10^{12} \times 4 \times 10^{-2}}{6 \times 10^{11} \times 200 \times 10^{13}}$ |
| d) $4^2 \times 4^5 \times (4^3)^2$ | k) $\left(-\frac{5}{8}\right)^8 \left(-\frac{25}{9}\right)^{-4}$                                                          |
| e) $(9^3)^7$                       | l) $(3a^4b^3) \times (8ab^2)$                                                                                             |
| f) $\frac{2^{12}}{2^5}$            |                                                                                                                           |
| g) $7^9 \times 2^9$                |                                                                                                                           |

→ Voir la solution

#### EXERCICE 4

Racines carrées

Soit  $a \in \mathbb{R}_+$ ,  $b \in \mathbb{R}_+$ .

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \dots \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \dots \quad \text{Attention, en général } \sqrt{a+b} \neq \dots$$

Représenter rapidement, dans un repère orthonormé, la courbe de  $f(x) = x^2$  sur  $\mathbb{R}$ . Déterminer les coordonnées des points d'abscisses  $x_1 = -1,5$  et  $x_2 = 1,5$ . Que remarque-t-on pour les ordonnées ? Représenter ensuite  $g(x) = \sqrt{x}$  sur  $\mathbb{R}_+$ . Déterminer les coordonnées du point de la courbe de  $g$  d'abscisse  $f(x_1)$ . En déduire :

$$\sqrt{(-1,5)^2} \quad \text{puis} \quad \sqrt{1,5^2}.$$

Plus généralement :  $\sqrt{a^2} = \dots$

Simplifier sans la calculatrice :

- |                            |                                           |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| a) $\sqrt{136^2}$          | d) $2\sqrt{5} + 2\sqrt{125} - 7\sqrt{45}$ | h) $\sqrt{\frac{16}{27}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{50}}$ |
| b) $\sqrt{\frac{81}{36}}$  | e) $-2\sqrt{72} + 4\sqrt{98}$             |                                                             |
| c) $\sqrt{121 \times 7^2}$ | f) $\sqrt{75} + 7\sqrt{3} - 2\sqrt{27}$   | i) $\sqrt{8} \times \sqrt{72} \times \sqrt{125}$            |
|                            | g) $\sqrt{144 \times 36 \times 12}$       |                                                             |

→ Voir la solution

#### EXERCICE 5

Développement et réduction

Développer et réduire (simplifier sans la calculatrice) :

- |                  |                             |                                          |
|------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| a) $x(2x + 1)$   | d) $\frac{-4x}{3}(-6x + 9)$ | g) $2x^2(x^2 + 5x + 9) - 2x^2 - 15x$     |
| b) $3x(-2x + 2)$ | e) $3(2x + 1)(-x)$          | h) $5(2x - 8)(1 + 3x)$                   |
| c) $5x^2(x + 7)$ | f) $(5x - 2)(2x + 3)$       | i) $(5 - 2x)(2x + 1) + (10 - 4x)(x - 3)$ |

→ Voir la solution

**EXERCICE 6***Identités remarquables*Soit  $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ .

$$(a+b)^2 = \dots \quad (a-b)^2 = \dots \quad (a-b)(a+b) = \dots$$

Développer ou calculer sans la calculatrice :

a)  $(x+5)^2$

e)  $(2-\sqrt{3})^2$

h)  $\left(-3x - \frac{1}{3}\right)^2$

b)  $(5x-3)^2$

f)  $(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2$

c)  $(3x+7)(3x-7)$

d)  $(3-\sqrt{5})(3+\sqrt{5})$

g)  $99^2$

i)  $\left(\frac{1}{2} - 3x\right)\left(3x - \frac{1}{2}\right)$

→ Voir la solution

**EXERCICE 7***Factorisations*

Factoriser les expressions suivantes :

a)  $2a + 2b - 2c$

e)  $a^2 + 36 - 12a$

$12x - 9$

b)  $3x + xy$

f)  $x^2 - 100$

i)  $(x+1)^2 + x^2 - 1$

c)  $xy^2 + x^2y$

g)  $9x^2 - 16 + (3x+4)(3x-2)$

d)  $2x + x^2 + 1$

h)  $(2x+3)(2x-1) - 4x^2 -$

→ Voir la solution

**EXERCICE 8***Équations du premier degré*Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes :

a)  $x + 27,8 = -19,3$

d)  $4x - 5 + 3 = x - 9 + x - 13$

g)  $(2x+4)(3x-1) = 0$

b)  $x + \frac{7}{6} = 521$

e)  $(2x-1) - (2+x) - 7 = \frac{3+7x}{4}$

h)  $(x+1)(x-1)(2x-3) = 0$

c)  $\frac{-4x}{9} = 53$

f)  $\frac{x-3}{4} = -\frac{2x}{3} + 2$

i)  $(5x-2)(x+7) = -(5x-2)^2$

→ Voir la solution

**EXERCICE 9***Inéquations du premier degré*Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes. On donnera les solutions à l'aide d'intervalles.

a)  $x + 3 > -5$

4)  $\leq 0$

g)  $(2x-4)(x+3) > 0$

b)  $x + 3 \leq 2$

e)  $(x+5)^2 + (x+5)(2x+10) < 0$

h)  $(x+9)(-2x-4)(3x-2) < 0$

c)  $4x > -8$

f)  $-\frac{3}{2} + 9 \geq 0$

i)  $\frac{x-5}{4-x} \geq 0$

d)  $2(x-3) + 3(x-6) + 6(x-$

→ Voir la solution

**EXERCICE 10***Équations du second degré (1) – sans discriminant*Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes, **sans utiliser le discriminant** :

a)  $x^2 - 25 = 0$

c)  $x^2 + 7 = 0$

e)  $9x^2 - 4 = 0$

b)  $3x^2 + 4x = 0$

d)  $x^2 - 2x + 1 = 0$

→ Voir la solution

**EXERCICE 11**

Équations du second degré (2)

Dans chacun des cas, résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $f(x) = 0$  et, si possible, factoriser  $f(x)$ .

a)  $f(x) = 2x^2 - 5x - 3$

c)  $f(x) = 9x^2 - 12x + 4$

e)  $f(x) = -0,5x^2 + 3x - 9,5$

b)  $f(x) = x^2 + x + 1$

d)  $f(x) = -2x^2 + 12x - 18$

f)  $f(x) = 5x^2 + 12x + 3$

→ Voir la solution

**EXERCICE 12**

Équations du second degré (3)

Dans chacun des cas, résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $f(x) = g(x)$ .

a)  $f(x) = 3x^2 + 5x$  et  $g(x) = 2x^2 - 2x + 4$

b)  $f(x) = (2x + 4)^2$  et  $g(x) = 3x + 5$

→ Voir la solution

**EXERCICE 13**

Inéquations du second degré

Dans chacun des cas, résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes en faisant un tableau de signes.

a)  $2x^2 - 3x + 4 \geq 0$

c)  $7x^2 + 2x - 4 < 0$

e)  $-x^2 + 8x - 7 > 3x^2 + 1$

b)  $-3x^2 + 30x - 75 < 0$

d)  $2x^2 - 3x + 4 \geq 5x + 6$

→ Voir la solution

**EXERCICE 14**

Proportionnalité

1. Compléter les deux tableaux suivants.

|                    |   |   |    |    |   |    |  |     |     |         |
|--------------------|---|---|----|----|---|----|--|-----|-----|---------|
| Côté d'un carré    | 1 | 2 |    | 7  | 8 |    |  | $a$ | $b$ | $a + b$ |
| Périmètre du carré |   |   | 20 | 28 |   | 40 |  |     |     |         |

|                 |   |   |   |    |   |     |  |     |     |         |
|-----------------|---|---|---|----|---|-----|--|-----|-----|---------|
| Côté d'un carré | 1 |   | 5 | 7  | 8 |     |  | $a$ | $b$ | $a + b$ |
| Aire du carré   |   | 4 |   | 49 |   | 100 |  |     |     |         |

- Dire lequel des deux tableaux est un tableau de proportionnalité. Quel est le coefficient de proportionnalité? Vérifier qu'il existe aussi un coefficient qui permet de passer de la ligne inférieure à la ligne supérieure.
- On considère que les valeurs des tableaux sont les coordonnées de points. Représenter ces points. Vérifier que, pour le tableau de proportionnalité, la courbe obtenue est une droite passant par l'origine. Quelle est la pente de cette droite?

→ Voir la solution

**EXERCICE 15**

Calculs de débit

1. On sauvegarde une banque de films. On parvient à sauvegarder un fichier de 300 Mo en 20 s. Combien d'heures met-on à sauvegarder toute la banque, qui pèse 500 Go en tout ?
2. On souhaite effectuer une sauvegarde chaque jour. Quelle taille maximum la banque peut-elle peser pour que la sauvegarde puisse se faire en moins de 24 h ?

→ Voir la solution

**EXERCICE 16**

On remplit un coffre-fort de  $1 \text{ m}^3$  de disques durs, chacun contenant 10 To, pour des dimensions  $50 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} \times 4 \text{ mm}$ . Combien de stockage cela représente-t-il ?

→ Voir la solution

**EXERCICE 17**

Échelles et cartes

1. On souhaite représenter un projet de bâtiment sur une carte au  $1/25\,000$ . Quelle est l'allure de la représentation graphique de la fonction qui donne les dimensions sur la carte en fonction de la dimension réelle ? Tracer le graphe de cette fonction et donner les dimensions sur la carte d'un bâtiment rectangulaire de 30 m sur 50 m.
2. Sur une carte du Mali, la distance en ligne droite entre Bamako et Ségou est de 17,5 cm. En réalité, elle est de 206 km. Quelle est l'échelle de la carte ? Déterminer la fonction qui exprime la dimension réelle en cm en fonction de la dimension sur la carte en km.
3. Pour une carte à l'échelle  $1/10\,000$ , quelle est l'allure de la fonction qui donne l'aire réelle d'un bâtiment carré en fonction de la longueur du côté sur la carte ?

→ Voir la solution

**EXERCICE 18**

Dilution

Pour une solution stock d'un antibiotique concentrée à  $10 \text{ mg/mL}$ , compléter le tableau suivant :

|                         |      |                  |                   |                 |
|-------------------------|------|------------------|-------------------|-----------------|
| Quantité prélevée       | 1 mL | 10 $\mu\text{L}$ |                   |                 |
| Quantité d'antibiotique |      |                  | 100 $\mu\text{g}$ | 1 $\mu\text{g}$ |

Dans les questions qui suivent, on part d'une solution stock concentrée à  $10 \text{ mg/mL}$ .

2. Lorsqu'on ajoute 20  $\mu\text{L}$  de solution stock à 980  $\mu\text{L}$  d'eau, quelle est la concentration de la solution obtenue ?
3. À partir d'une solution stock concentrée à  $10 \text{ mg/mL}$ , on veut faire une solution concentrée à  $1 \text{ mg/mL}$ . Montrer que le volume  $V_S$  (exprimé en mL) de solution stock à ajouter à 1 mL d'eau est solution de  $10x = x + 1$ , puis calculer  $V_S$ .
4. On appelle *facteur de dilution* le rapport  $\frac{V_S}{V_f}$  où  $V_S$  est le volume de la solution stock et  $V_f$  est le volume de la solution obtenue après ajout d'eau (dilution). Montrer que  $\frac{V_S}{V_f} = \frac{C_f}{C_S}$  où  $C_S$  et  $C_f$  sont respectivement les concentrations des solutions stock et finale.
5. Le facteur de dilution est  $10^{-4}$  et on souhaite obtenir 10 mL de solution finale. Calculer le volume  $V_S$  à prélever et le volume  $V_d$  d'eau à ajouter.

→ Voir la solution



## Chapitre 2

# Géométrie plane

**Exercices pour la séance suivante :** 19, 20, 24, 27, 34



Deuxième partie

**Solution des exercices**



## Chapitre 3

# Révisions

---

Dans ce chapitre :

---

### Solution de l'exercice 1

(Retour à l'énoncé)

#### Rappel de cours.

- L'**opposé** d'un réel  $x$  est le réel noté  $-x$  tel que  $x + (-x) = 0$ . Géométriquement,  $-x$  est le symétrique de  $x$  par rapport à 0 sur la droite des réels.
- L'**inverse** d'un réel  $x$  *non nul* est le réel noté  $\frac{1}{x}$  (ou  $x^{-1}$ ) tel que  $x \times \frac{1}{x} = 1$ . Le nombre 0 n'a **pas** d'inverse, car il n'existe aucun réel  $y$  tel que  $0 \times y = 1$ .

On applique ces définitions à chacun des six nombres.

- $a = 2$  : opposé  $-2$  ; inverse  $\frac{1}{2}$ .
- $b = \frac{3}{7}$  : opposé  $-\frac{3}{7}$  ; inverse  $\frac{7}{3}$  (on retourne la fraction : l'inverse de  $\frac{p}{q}$ , avec  $p \neq 0$ , est  $\frac{q}{p}$ ).
- $c = \frac{11}{3}$  : opposé  $-\frac{11}{3}$  ; inverse  $\frac{3}{11}$ .
- $d = 0$  : opposé  $-0 = 0$  ; inverse **non défini** (n'existe pas), pour la raison rappelée ci-dessus.
- $e = \frac{1}{4}$  : opposé  $-\frac{1}{4}$  ; inverse 4 (car  $\frac{1}{1/4} = 4$ ).
- $f = -\sqrt{5}$  : opposé  $\sqrt{5}$  ; inverse  $\frac{1}{-\sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{5}$  (on a multiplié numérateur et dénominateur par  $\sqrt{5}$  pour rendre le dénominateur rationnel :  $\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5} \times \sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$ ).

### Solution de l'exercice 2

(Retour à l'énoncé)

**Rappel de cours.** Pour  $(a, c) \in \mathbb{R}^2$  et  $(b, d) \in (\mathbb{R}^*)^2$  :

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad + bc}{bd}, \quad \frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}, \quad \frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc} \quad (c \neq 0).$$

On rappelle aussi les **règles de priorité** : dans une expression sans parenthèses, on effectue d'abord les multiplications et divisions, *puis* les additions et soustractions.

- a)  $-5 - 2 = -7$ .
- b)  $3 - 7 = -4$ .
- c)  $3 + 5 \div 5 + 3$  : on calcule d'abord  $5 \div 5 = 1$  (priorité sur l'addition), donc  $3 + 1 + 3 = 7$ .

- d)  $3 + \frac{1}{3} = \frac{9}{3} + \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$  (on met 3 au même dénominateur que  $\frac{1}{3}$ ).
- e)  $-\frac{3}{2} + \frac{5}{4} = -\frac{6}{4} + \frac{5}{4} = -\frac{1}{4}$  (dénominateur commun 4).
- f)  $\frac{2}{3} - \frac{3}{2} = \frac{4}{6} - \frac{9}{6} = -\frac{5}{6}$  (dénominateur commun 6).
- g)  $9 \times \frac{35}{9} = \frac{9 \times 35}{9} = 35$  (les 9 se simplifient).
- h)  $\frac{4}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{4 \times 2}{5 \times 5} = \frac{8}{25}$ .
- i)  $\frac{7}{5} \div \frac{3}{10} = \frac{7}{5} \times \frac{10}{3} = \frac{70}{15} = \frac{14}{3}$  (on a simplifié 70/15 par 5).
- j) C'est une fraction de fraction (fraction « double étage ») :  $-\frac{4/5}{5} = -\frac{4}{5} \times \frac{1}{5} = -\frac{4}{25}$ .
- k) De même,  $\frac{4/9}{-3/2} = \frac{4}{9} \times \left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{8}{27}$ .
- l) On calcule d'abord la parenthèse :  $\frac{3}{7} + \frac{5}{7} = \frac{8}{7}$ . Puis, priorité à la multiplication :  $\frac{7}{3} \times \frac{8}{7} = \frac{56}{21} = \frac{8}{3}$ . Enfin  $\frac{1}{3} + \frac{8}{3} = \frac{9}{3} = 3$ .

**Solution de l'exercice 3**

(Retour à l'énoncé)

**Rappel de cours.** Pour  $a, b \in \mathbb{R}^*$  et  $n, m \in \mathbb{Z}$  :

$$a^n \times a^m = a^{n+m}, \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}, \quad (a^m)^n = a^{mn},$$

$$(ab)^n = a^n b^n, \quad \left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

On retient aussi que si  $n$  est **pair**,  $(-a)^n = a^n > 0$  (le signe disparaît), et si  $n$  est **impair**,  $(-a)^n = -a^n$  (le signe est conservé).

- a)  $(-2)^3 = -2^3 = -8$  (exposant impair : le signe se conserve).
- b)  $5^2 = 25$ .
- c)  $3 \times 2^3 = 3 \times 8 = 24$ .
- d)  $4^2 \times 4^5 \times (4^3)^2 = 4^2 \times 4^5 \times 4^{3 \times 2} = 4^{2+5+6} = 4^{13}$ .
- e)  $(9^3)^7 = 9^{3 \times 7} = 9^{21}$ .
- f)  $\frac{2^{12}}{2^5} = 2^{12-5} = 2^7 = 128$ .
- g)  $7^9 \times 2^9 = (7 \times 2)^9 = 14^9$  (on regroupe car même exposant).
- h)  $\frac{(5^3)^4}{(5^4)^5} = \frac{5^{12}}{5^{20}} = 5^{12-20} = 5^{-8} = \frac{1}{5^8}$ .
- i) Numérateur :  $3^3 \times 7^4 \times (3^2)^3 = 3^3 \times 7^4 \times 3^6 = 3^9 \times 7^4$ . Donc  $\frac{3^9 \times 7^4}{3^8 \times 7^4} = 3^{9-8} \times 7^{4-4} = 3^1 \times 7^0 = 3 \times 1 = 3$ .
- j) On regroupe les facteurs numériques d'une part, les puissances de 10 d'autre part. Numérateur :  $30 \times 2 \times 4 = 240$  et  $10^{-7} \times 10^{12} \times 10^{-2} = 10^{-7+12-2} = 10^3$ , donc numérateur =  $240 \times 10^3$ . Dénominateur :  $6 \times 200 = 1200$  et  $10^{11} \times 10^{13} = 10^{24}$ , donc dénominateur =  $1200 \times 10^{24}$ . Le quotient vaut

$$\frac{240 \times 10^3}{1200 \times 10^{24}} = \frac{240}{1200} \times 10^{3-24} = 0,2 \times 10^{-21} = 2 \times 10^{-22}.$$

- k) On utilise  $(-x)^n = x^n$  pour  $n$  pair. Ici les deux exposants (8 et  $-4$ ) sont pairs, donc les signes disparaissent :

$$\left(-\frac{5}{8}\right)^8 = \frac{5^8}{8^8}, \quad \left(-\frac{25}{9}\right)^{-4} = \left(\frac{25}{9}\right)^{-4} = \left(\frac{9}{25}\right)^4 = \frac{9^4}{25^4}.$$

Comme  $25 = 5^2$ , on a  $25^4 = 5^8$ , donc

$$\frac{5^8}{8^8} \times \frac{9^4}{5^8} = \frac{9^4}{8^8} = \frac{3^8}{2^{24}} = \frac{6561}{16\,777\,216}.$$

(Le numérateur est une puissance de 3 et le dénominateur une puissance de 2 : la fraction est déjà irréductible.)

l)  $(3a^4b^3) \times (8ab^2) = (3 \times 8) \times a^{4+1} \times b^{3+2} = 24a^5b^5.$

### Solution de l'exercice 4

(Retour à l'énoncé)

**Rappel de cours.** Pour  $a \in \mathbb{R}_+$  et  $b \in \mathbb{R}_+^*$  :

$$\sqrt{a}\sqrt{b} = \sqrt{ab}, \quad \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}.$$

Attention en revanche : en général  $\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}$  (c'est l'erreur la plus fréquente!). Sur le graphique,  $f(x_1) = f(-1,5) = (-1,5)^2 = 2,25$  et  $f(x_2) = f(1,5) = 2,25$  : **les deux points ont la même ordonnée**, car élever au carré « efface » le signe. En passant sur la courbe de  $g = \sqrt{\cdot}$  à l'abscisse 2,25, l'ordonnée lue est 1,5 (positive), aussi bien en partant de  $x_1$  que de  $x_2$ . On en déduit

$$\sqrt{(-1,5)^2} = \sqrt{2,25} = 1,5 \quad \text{et} \quad \sqrt{1,5^2} = \sqrt{2,25} = 1,5.$$

Plus généralement, **pour tout réel**  $a$ ,  $\sqrt{a^2} = |a|$  (valeur absolue de  $a$ ) : le résultat est  $a$  si  $a \geq 0$ , et  $-a$  si  $a < 0$  ; dans tous les cas c'est un nombre **positif ou nul**. C'est un piège classique d'écrire  $\sqrt{a^2} = a$  sans réfléchir au signe de  $a$ .

- a)  $\sqrt{136^2} = |136| = 136$  (car  $136 \geq 0$ ).  
 b)  $\sqrt{\frac{81}{36}} = \frac{\sqrt{81}}{\sqrt{36}} = \frac{9}{6} = \frac{3}{2}.$   
 c)  $\sqrt{121 \times 7^2} = \sqrt{121} \times \sqrt{7^2} = 11 \times 7 = 77.$

Pour les questions d), e), f), la méthode est la même : on **fait apparaître un carré parfait** dans chaque racine pour la simplifier, en utilisant  $\sqrt{k^2 \times x} = k\sqrt{x}$  (pour  $k \geq 0$ ).

- d) On écrit  $\sqrt{125} = \sqrt{25 \times 5} = 5\sqrt{5}$  et  $\sqrt{45} = \sqrt{9 \times 5} = 3\sqrt{5}$ . Donc

$$2\sqrt{5} + 2\sqrt{125} - 7\sqrt{45} = 2\sqrt{5} + 2 \times 5\sqrt{5} - 7 \times 3\sqrt{5} = 2\sqrt{5} + 10\sqrt{5} - 21\sqrt{5} = -9\sqrt{5}.$$

- e)  $\sqrt{72} = \sqrt{36 \times 2} = 6\sqrt{2}$  et  $\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2} = 7\sqrt{2}$ . Donc

$$-2\sqrt{72} + 4\sqrt{98} = -2 \times 6\sqrt{2} + 4 \times 7\sqrt{2} = -12\sqrt{2} + 28\sqrt{2} = 16\sqrt{2}.$$

- f)  $\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3} = 5\sqrt{3}$  et  $\sqrt{27} = \sqrt{9 \times 3} = 3\sqrt{3}$ . Donc

$$\sqrt{75} + 7\sqrt{3} - 2\sqrt{27} = 5\sqrt{3} + 7\sqrt{3} - 2 \times 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3} + 7\sqrt{3} - 6\sqrt{3} = 6\sqrt{3}.$$

- g)  $\sqrt{144 \times 36 \times 12} = \sqrt{144} \times \sqrt{36} \times \sqrt{12} = 12 \times 6 \times \sqrt{12} = 72\sqrt{12} = 72 \times 2\sqrt{3} = 144\sqrt{3}$  (car  $\sqrt{12} = \sqrt{4 \times 3} = 2\sqrt{3}$ ).

h) On regroupe astucieusement :

$$\sqrt{\frac{16}{27}} \times \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{50}} = \sqrt{\frac{16}{27}} \times 3 \times \frac{1}{\sqrt{50}} = \sqrt{\frac{16}{9}} \times \frac{1}{\sqrt{50}} = \frac{4}{3} \times \frac{1}{\sqrt{50}}.$$

Comme  $\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2} = 5\sqrt{2}$ , on obtient

$$\frac{4}{3 \times 5\sqrt{2}} = \frac{4}{15\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{15 \times 2} = \frac{2\sqrt{2}}{15}$$

(on a multiplié en haut et en bas par  $\sqrt{2}$  pour supprimer la racine au dénominateur).

i) On regroupe tout sous une seule racine :  $\sqrt{8} \times \sqrt{72} \times \sqrt{125} = \sqrt{8 \times 72 \times 125}$ . On décompose en facteurs premiers :  $8 = 2^3$ ,  $72 = 2^3 \times 3^2$ ,  $125 = 5^3$ , donc le produit vaut  $2^6 \times 3^2 \times 5^3$ . Ainsi

$$\sqrt{2^6 \times 3^2 \times 5^3} = \sqrt{2^6} \times \sqrt{3^2} \times \sqrt{5^2 \times 5} = 2^3 \times 3 \times 5\sqrt{5} = 120\sqrt{5}.$$

### Solution de l'exercice 5

(Retour à l'énoncé)

**Rappel de cours. Développer**, c'est transformer un produit en somme, en utilisant la distributivité  $k(u+v) = ku + kv$  (et, pour un produit de deux parenthèses,  $(u+v)(w+z) = uw + uz + vw + vz$ , chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second). **Réduire**, c'est ensuite regrouper les termes de même nature (même puissance de  $x$ ).

a)  $x(2x + 1) = 2x^2 + x.$

b)  $3x(-2x + 2) = -6x^2 + 6x.$

c)  $5x^2(x + 7) = 5x^3 + 35x^2.$

d)  $\frac{-4x}{3}(-6x + 9) = \frac{-4x}{3} \times (-6x) + \frac{-4x}{3} \times 9 = \frac{24x^2}{3} - \frac{36x}{3} = 8x^2 - 12x.$

e)  $3(2x + 1)(-x)$  : on développe d'abord  $3 \times (-x) = -3x$ , puis  $-3x(2x + 1) = -6x^2 - 3x.$

f)  $(5x - 2)(2x + 3) = 5x \times 2x + 5x \times 3 - 2 \times 2x - 2 \times 3 = 10x^2 + 15x - 4x - 6 = 10x^2 + 11x - 6.$

g)  $2x^2(x^2 + 5x + 9) - 2x^2 - 15x = 2x^4 + 10x^3 + 18x^2 - 2x^2 - 15x = 2x^4 + 10x^3 + 16x^2 - 15x.$

h) On développe  $(2x - 8)(1 + 3x) = 2x + 6x^2 - 8 - 24x = 6x^2 - 22x - 8$ , puis on multiplie par 5 :

$$5(2x - 8)(1 + 3x) = 5(6x^2 - 22x - 8) = 30x^2 - 110x - 40.$$

i) On développe séparément les deux produits.

$$(5 - 2x)(2x + 1) = 10x + 5 - 4x^2 - 2x = -4x^2 + 8x + 5,$$

$$(10 - 4x)(x - 3) = 10x - 30 - 4x^2 + 12x = -4x^2 + 22x - 30.$$

On additionne :  $(-4x^2 + 8x + 5) + (-4x^2 + 22x - 30) = -8x^2 + 30x - 25.$

### Solution de l'exercice 6

(Retour à l'énoncé)

**Rappel de cours — les trois identités remarquables** (à connaître par cœur, elles reviennent sans cesse) :

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2,$$

$$(a - b)(a + b) = a^2 - b^2.$$

a)  $(x + 5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25.$

b)  $(5x - 3)^2 = (5x)^2 - 2 \times 5x \times 3 + 3^2 = 25x^2 - 30x + 9.$

- c)  $(3x + 7)(3x - 7) = (3x)^2 - 7^2 = 9x^2 - 49$ .
- d)  $(3 - \sqrt{5})(3 + \sqrt{5}) = 3^2 - (\sqrt{5})^2 = 9 - 5 = 4$  (la racine disparaît : c'est le principe de la « quantité conjuguée », très utile pour rationaliser un dénominateur).
- e)  $(2 - \sqrt{3})^2 = 2^2 - 2 \times 2 \times \sqrt{3} + (\sqrt{3})^2 = 4 - 4\sqrt{3} + 3 = 7 - 4\sqrt{3}$ .
- f)  $(\sqrt{3} + \sqrt{7})^2 = (\sqrt{3})^2 + 2\sqrt{3}\sqrt{7} + (\sqrt{7})^2 = 3 + 2\sqrt{21} + 7 = 10 + 2\sqrt{21}$ .
- g)  $99^2 = (100 - 1)^2 = 100^2 - 2 \times 100 \times 1 + 1^2 = 10000 - 200 + 1 = 9801$ .
- h)  $\left(-3x - \frac{1}{3}\right)^2 = \left(3x + \frac{1}{3}\right)^2$  (le carré « efface » le signe global)  $= (3x)^2 + 2 \times 3x \times \frac{1}{3} + \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 9x^2 + 2x + \frac{1}{9}$ .
- i) On remarque que  $\frac{1}{2} - 3x = -\left(3x - \frac{1}{2}\right)$ . Donc

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2} - 3x\right) \left(3x - \frac{1}{2}\right) &= -\left(3x - \frac{1}{2}\right) \left(3x - \frac{1}{2}\right) = -\left(3x - \frac{1}{2}\right)^2 \\ &= -\left(9x^2 - 3x + \frac{1}{4}\right) = -9x^2 + 3x - \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

**Solution de l'exercice 7***(Retour à l'énoncé)*

**Rappel de cours. Factoriser**, c'est l'opération inverse de développer : transformer une somme en produit. On cherche un **facteur commun**, ou on reconnaît une identité remarquable à l'envers :  $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ ,  $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$ ,  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ .

- a)  $2a + 2b - 2c = 2(a + b - c)$  (2 est facteur commun).
- b)  $3x + xy = x(3 + y)$  ( $x$  est facteur commun).
- c)  $xy^2 + x^2y = xy(y + x) = xy(x + y)$  ( $xy$  est facteur commun).
- d) On réordonne :  $2x + x^2 + 1 = x^2 + 2x + 1$ . On reconnaît  $a^2 + 2ab + b^2$  avec  $a = x$ ,  $b = 1$  :  $x^2 + 2x + 1 = (x + 1)^2$ .
- e)  $a^2 + 36 - 12a = a^2 - 12a + 36$ . On reconnaît  $a^2 - 2ab + b^2$  avec  $a = a$ ,  $b = 6$  (car  $2 \times a \times 6 = 12a$  et  $6^2 = 36$ ) :  $a^2 - 12a + 36 = (a - 6)^2$ .
- f)  $x^2 - 100 = x^2 - 10^2 = (x - 10)(x + 10)$ .
- g) On reconnaît que  $9x^2 - 16 = (3x)^2 - 4^2 = (3x - 4)(3x + 4)$ . L'expression devient

$$(3x - 4)(3x + 4) + (3x + 4)(3x - 2).$$

Le facteur  $(3x + 4)$  est commun aux deux termes, on le met en facteur :

$$(3x + 4)[(3x - 4) + (3x - 2)] = (3x + 4)(6x - 6) = (3x + 4) \times 6 \times (x - 1) = 6(3x + 4)(x - 1).$$

- h) On développe d'abord  $(2x + 3)(2x - 1) = 4x^2 + 2x - 6x - 3 = 4x^2 - 4x - 3$ . L'expression devient

$$4x^2 - 4x - 3 - 4x^2 - 12x - 9 = -16x - 12 = -4(4x + 3).$$

- i) On reconnaît que  $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$  (identité remarquable). L'expression devient

$$(x + 1)^2 + (x - 1)(x + 1).$$

Le facteur  $(x + 1)$  est commun :

$$(x + 1)[(x + 1) + (x - 1)] = (x + 1)(2x) = 2x(x + 1).$$

## Solution de l'exercice 8

(Retour à l'énoncé)

**Méthode.** Pour résoudre une équation, on regroupe les termes en  $x$  d'un côté, les termes constants de l'autre, en effectuant *la même opération des deux côtés du signe* = (on peut ajouter, soustraire, ou multiplier/diviser par un nombre **non nul**, sans changer l'égalité). Pour une équation du type « produit = 0 », on utilise la règle : **un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un au moins des facteurs est nul**.

- a)  $x + 27,8 = -19,3$ , donc  $x = -19,3 - 27,8 = -47,1$ .  $S = \{-47,1\}$ .
- b)  $x + \frac{7}{6} = 521$ , donc  $x = 521 - \frac{7}{6} = \frac{3126}{6} - \frac{7}{6} = \frac{3119}{6}$ .  $S = \left\{\frac{3119}{6}\right\}$ .
- c)  $\frac{-4x}{9} = 53$ , donc  $-4x = 53 \times 9 = 477$ , donc  $x = -\frac{477}{4}$ .  $S = \left\{-\frac{477}{4}\right\}$ .
- d) On réduit chaque membre séparément : à gauche  $4x - 5 + 3 = 4x - 2$  ; à droite  $x - 9 + x - 13 = 2x - 22$ . L'équation devient  $4x - 2 = 2x - 22$ , donc  $4x - 2x = -22 + 2$ , donc  $2x = -20$ , donc  $x = -10$ .  $S = \{-10\}$ .
- e) On développe le membre de gauche en faisant attention aux signes devant les parenthèses :  $(2x - 1) - (2 + x) - 7 = 2x - 1 - 2 - x - 7 = x - 10$ . L'équation devient  $x - 10 = 3 + 7x$ , donc  $x - 7x = 3 + 10$ , donc  $-6x = 13$ , donc  $x = -\frac{13}{6}$ .  $S = \left\{-\frac{13}{6}\right\}$ .
- f) On multiplie les deux membres par 12 (PPCM de 4 et 3) pour supprimer les dénominateurs :

$$12 \times \frac{x-3}{4} = 12 \times \left(-\frac{2x}{3} + 2\right),$$

c'est-à-dire  $3(x - 3) = -8x + 24$ , donc  $3x - 9 = -8x + 24$ , donc  $3x + 8x = 24 + 9$ , donc  $11x = 33$ , donc  $x = 3$ .  $S = \{3\}$ .

- g) Un produit de deux facteurs est nul si et seulement si l'un des deux est nul :

$$2x + 4 = 0 \text{ ou } 3x - 1 = 0,$$

$$\text{donc } x = -2 \text{ ou } x = \frac{1}{3}. S = \left\{-2, \frac{1}{3}\right\}.$$

- h) De même avec trois facteurs :  $x + 1 = 0$  ou  $x - 1 = 0$  ou  $2x - 3 = 0$ , soit  $x = -1$ ,  $x = 1$  ou  $x = \frac{3}{2}$ .  $S = \left\{-1, 1, \frac{3}{2}\right\}$ .
- i) **Attention** : on ne divise jamais par une expression contenant  $x$  sans savoir si elle est nulle ! On ramène tout d'un côté :

$$(5x - 2)(x + 7) + (5x - 2)^2 = 0.$$

Le facteur  $(5x - 2)$  est commun :

$$(5x - 2)[(x + 7) + (5x - 2)] = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad (5x - 2)(6x + 5) = 0.$$

$$\text{Donc } 5x - 2 = 0 \text{ ou } 6x + 5 = 0, \text{ soit } x = \frac{2}{5} \text{ ou } x = -\frac{5}{6}. S = \left\{\frac{2}{5}, -\frac{5}{6}\right\}.$$

## Solution de l'exercice 9

(Retour à l'énoncé)

**Rappel de cours.** On résout une inéquation comme une équation (on ajoute/soustrait librement), mais **si on multiplie ou divise les deux membres par un nombre négatif, il faut inverser le sens de l'inégalité**. Pour un produit ou un quotient de plusieurs facteurs dont le signe dépend de  $x$ , on fait un **tableau de signes** : on étudie le signe de chaque facteur séparément, puis on applique la règle des signes (produit de deux termes de même signe  $\rightarrow$  positif, de signes contraires  $\rightarrow$  négatif) sur chaque intervalle délimité par les valeurs qui annulent un facteur (ou le dénominateur).

- a)  $x + 3 > -5$ , donc  $x > -8$ .  $S = ] - 8; +\infty[$ .
- b)  $x + 3 \leq 2$ , donc  $x \leq -1$ .  $S = ] - \infty; -1]$ .
- c)  $4x > -8$ , donc  $x > -2$  (on a divisé par  $4 > 0$ , le sens ne change pas).  $S = ] - 2; +\infty[$ .
- d) On développe et réduit :  $2(x - 3) + 3(x - 6) + 6(x - 4) = 2x - 6 + 3x - 18 + 6x - 24 = 11x - 48$ .  
L'inéquation devient  $11x - 48 \leq 0$ , donc  $x \leq \frac{48}{11}$ .  $S = ] - \infty; \frac{48}{11}]$ .
- e) On remarque que  $2x + 10 = 2(x + 5)$ , donc  $(x + 5)(2x + 10) = 2(x + 5)^2$ . L'expression devient  

$$(x + 5)^2 + 2(x + 5)^2 = 3(x + 5)^2.$$

Or un carré est **toujours positif ou nul** :  $3(x + 5)^2 \geq 0$  pour tout  $x$ , il ne peut donc **jamais** être strictement négatif.  $S = \emptyset$ .

- f) **Attention, piège** : cette expression ne contient pas d'inconnue  $x$  ! C'est une simple affirmation numérique :  $-\frac{3}{2} + 9 = \frac{-3 + 18}{2} = \frac{15}{2} \geq 0$ , ce qui est **vrai**. L'inégalité est donc vérifiée pour **tout** réel  $x$  (elle ne dépend pas de  $x$ ).  $S = \mathbb{R}$ .
- g) Les deux facteurs s'annulent en  $x = 2$  et  $x = -3$ . On dresse un tableau de signes : pour  $x < -3$  : les deux facteurs  $(2x - 4)$  et  $(x + 3)$  sont négatifs, produit **positif** ; entre  $-3$  et  $2$  :  $(x + 3) > 0$  et  $(2x - 4) < 0$ , produit **négatif** ; pour  $x > 2$  : les deux facteurs sont positifs, produit **positif**. On veut le produit strictement positif :  $S = ] - \infty; -3[ \cup ]2; +\infty[$ .
- h) Les trois facteurs s'annulent en  $x = -9$  (pour  $x + 9$ ),  $x = -2$  (pour  $-2x - 4$ ) et  $x = \frac{2}{3}$  (pour  $3x - 2$ ). On ordonne les valeurs :  $-9 < -2 < \frac{2}{3}$ , et on teste le signe du produit sur chaque intervalle (par exemple avec  $x = -10$ ,  $x = -5$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$ ) :

| $x$              | $-\infty$ | $-9$ | $-2$ | $\frac{2}{3}$ | $+\infty$ |   |   |   |
|------------------|-----------|------|------|---------------|-----------|---|---|---|
| signe du produit |           | +    | 0    | -             | 0         | + | 0 | - |

On veut le produit strictement négatif :  $S = ] - 9; -2[ \cup ]\frac{2}{3}; +\infty[$ .

- i) C'est un **quotient** : il est défini pour  $4 - x \neq 0$ , c'est-à-dire  $x \neq 4$ . Le numérateur  $x - 5$  s'annule en  $x = 5$ , le dénominateur  $4 - x$  s'annule en  $x = 4$  (valeur interdite). Tableau de signes : pour  $x < 4$  :  $x - 5 < 0$  et  $4 - x > 0$ , quotient **négatif** ; pour  $4 < x < 5$  :  $x - 5 < 0$  et  $4 - x < 0$ , quotient **positif** ; pour  $x > 5$  :  $x - 5 > 0$  et  $4 - x < 0$ , quotient **négatif** ; en  $x = 5$ , le quotient vaut 0 (ce qui convient puisque l'inégalité est large). On obtient :  $S = ]4; 5]$  (on exclut 4, valeur interdite, et on inclut 5).

### Solution de l'exercice 10

(Retour à l'énoncé)

**Méthode.** Certaines équations du second degré se résolvent directement, sans discriminant, en reconnaissant une factorisation simple (facteur commun ou identité remarquable), ou en isolant  $x^2$ .

- a)  $x^2 - 25 = 0$ , c'est-à-dire  $x^2 - 5^2 = 0$ , donc  $(x - 5)(x + 5) = 0$ , donc  $x = 5$  ou  $x = -5$ .  
 $S = \{-5, 5\}$ .
- b)  $3x^2 + 4x = 0$ , donc  $x(3x + 4) = 0$ , donc  $x = 0$  ou  $3x + 4 = 0$ , c'est-à-dire  $x = 0$  ou  $x = -\frac{4}{3}$ .  
 $S = \left\{0, -\frac{4}{3}\right\}$ .
- c)  $x^2 + 7 = 0$  équivaut à  $x^2 = -7$ . Or un carré de réel est toujours **positif ou nul**, il ne peut jamais valoir  $-7$ .  $S = \emptyset$ .
- d) On reconnaît l'identité remarquable  $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$  avec  $a = x, b = 1$  :  $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$ . Donc  $(x - 1)^2 = 0$ , c'est-à-dire  $x - 1 = 0$ , donc  $x = 1$  (racine **double**).  $S = \{1\}$ .

e)  $9x^2 - 4 = 0$ , c'est-à-dire  $(3x)^2 - 2^2 = 0$ , donc  $(3x - 2)(3x + 2) = 0$ , donc  $x = \frac{2}{3}$  ou  $x = -\frac{2}{3}$ .

$$S = \left\{ \frac{2}{3}, -\frac{2}{3} \right\}.$$

**Solution de l'exercice 11**

(Retour à l'énoncé)

**Rappel de cours — résolution générale par le discriminant.** Pour une équation  $ax^2 + bx + c = 0$  avec  $a \neq 0$ , on calcule le **discriminant**  $\Delta = b^2 - 4ac$  :

- si  $\Delta > 0$  : deux solutions distinctes  $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ ,  $x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$ , et  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$  ;
- si  $\Delta = 0$  : une solution double  $x_0 = \frac{-b}{2a}$ , et  $f(x) = a(x - x_0)^2$  ;
- si  $\Delta < 0$  : aucune solution réelle, et  $f$  ne se factorise pas dans  $\mathbb{R}$ .

La rédaction suivante n'est pas celle attendue, c'est juste les solutions de l'exercice pour que ce soit clair pour vous. La rédaction est plutôt la suivante : Le discriminant de l'équation est "valeur du discriminant", les solutions sont alors données par "solution 1" et "solution 2".

a)  $a = 2, b = -5, c = -3$ .  $\Delta = (-5)^2 - 4 \times 2 \times (-3) = 25 + 24 = 49 = 7^2 > 0$ . Donc

$$x_1 = \frac{5 - 7}{4} = -\frac{1}{2}, \quad x_2 = \frac{5 + 7}{4} = 3.$$

$$S = \left\{ -\frac{1}{2}, 3 \right\} \text{ et } f(x) = 2 \left( x + \frac{1}{2} \right) (x - 3) = (2x + 1)(x - 3).$$

b)  $a = 1, b = 1, c = 1$ .  $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$ .  $S = \emptyset$  (pas de factorisation réelle).

c)  $a = 9, b = -12, c = 4$ .  $\Delta = 144 - 4 \times 9 \times 4 = 144 - 144 = 0$ . Racine double :  $x_0 = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}$ .  
 $S = \left\{ \frac{2}{3} \right\}$  et  $f(x) = 9 \left( x - \frac{2}{3} \right)^2 = (3x - 2)^2$ .

d) On peut factoriser  $-2$  directement :  $f(x) = -2(x^2 - 6x + 9) = -2(x - 3)^2$  (identité remarquable).  $f(x) = 0$  équivaut à  $(x - 3)^2 = 0$ , donc  $x = 3$  (racine double).  $S = \{3\}$ ,  $f(x) = -2(x - 3)^2$ .

e)  $a = -0,5, b = 3, c = -9,5$ .  $\Delta = 3^2 - 4 \times (-0,5) \times (-9,5) = 9 - 19 = -10 < 0$ .  $S = \emptyset$ .

f)  $a = 5, b = 12, c = 3$ .  $\Delta = 144 - 60 = 84 = 4 \times 21$ , donc  $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{21}$  (irrationnel, ce n'est pas grave).

$$x_1 = \frac{-12 - 2\sqrt{21}}{10} = \frac{-6 - \sqrt{21}}{5}, \quad x_2 = \frac{-12 + 2\sqrt{21}}{10} = \frac{-6 + \sqrt{21}}{5}.$$

$$S = \left\{ \frac{-6 - \sqrt{21}}{5}, \frac{-6 + \sqrt{21}}{5} \right\} \text{ et } f(x) = 5 \left( x - \frac{-6 - \sqrt{21}}{5} \right) \left( x - \frac{-6 + \sqrt{21}}{5} \right).$$

**Solution de l'exercice 12**

(Retour à l'énoncé)

**Méthode.** Pour résoudre  $f(x) = g(x)$ , on ramène tout d'un seul côté de l'égalité (on calcule  $f(x) - g(x) = 0$ ), on développe et réduit pour obtenir une équation de la forme  $ax^2 + bx + c = 0$ , puis on applique la méthode du discriminant.

a)  $f(x) = g(x)$  équivaut à  $3x^2 + 5x - (2x^2 - 2x + 4) = 0$ , c'est-à-dire  $3x^2 + 5x - 2x^2 + 2x - 4 = 0$ , donc  $x^2 + 7x - 4 = 0$ .  $\Delta = 7^2 - 4 \times 1 \times (-4) = 49 + 16 = 65 > 0$ . Donc

$$x = \frac{-7 \pm \sqrt{65}}{2}.$$

$$S = \left\{ \frac{-7 - \sqrt{65}}{2}, \frac{-7 + \sqrt{65}}{2} \right\}.$$

- b) On développe  $(2x + 4)^2 = 4x^2 + 16x + 16$  (identité remarquable). L'équation devient  $4x^2 + 16x + 16 = 3x + 5$ , c'est-à-dire  $4x^2 + 16x + 16 - 3x - 5 = 0$ , donc  $4x^2 + 13x + 11 = 0$ .  $\Delta = 13^2 - 4 \times 4 \times 11 = 169 - 176 = -7 < 0$ .  $S = \emptyset$ .

### Solution de l'exercice 13

(Retour à l'énoncé)

**Rappel de cours — signe d'un trinôme  $ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) :**

- si  $\Delta < 0$  : le trinôme a **toujours le signe de  $a$** , quel que soit  $x$  ;
  - si  $\Delta = 0$  : le trinôme a le signe de  $a$  pour tout  $x \neq x_0$  (et vaut 0 en  $x_0$ ) ;
  - si  $\Delta > 0$  : le trinôme est du signe de  $a$  **à l'extérieur** des racines  $x_1 < x_2$ , et du signe opposé à  $a$  **entre** les racines.
- a)  $a = 2, b = -3, c = 4$  :  $\Delta = 9 - 32 = -23 < 0$ . Comme  $a = 2 > 0$ , le trinôme est **toujours strictement positif**, donc en particulier toujours  $\geq 0$ .  $S = \mathbb{R}$ .
- b) On factorise directement :  $-3x^2 + 30x - 75 = -3(x^2 - 10x + 25) = -3(x - 5)^2$ . Or  $(x - 5)^2 \geq 0$  toujours, donc  $-3(x - 5)^2 \leq 0$  toujours, avec égalité seulement en  $x = 5$ . On veut l'inégalité **stricte**  $< 0$ , donc on exclut  $x = 5$ .  $S = \mathbb{R} \setminus \{5\} = ] - \infty; 5[ \cup ] 5; +\infty[$ .
- c)  $a = 7, b = 2, c = -4$  :  $\Delta = 4 + 112 = 116 = 4 \times 29$ , donc  $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{29}$ . Racines :  $x_{1,2} = \frac{-2 \pm 2\sqrt{29}}{7} = \frac{-1 \pm \sqrt{29}}{7}$ . Comme  $a = 7 > 0$ , le trinôme est négatif **entre** les racines.  $S = \left] \frac{-1 - \sqrt{29}}{7}; \frac{-1 + \sqrt{29}}{7} \right[$ .
- d) On ramène tout à gauche :  $2x^2 - 3x + 4 - 5x - 6 \geq 0$ , c'est-à-dire  $2x^2 - 8x - 2 \geq 0$ . On divise par  $2 > 0$  (le sens de l'inégalité est conservé) :  $x^2 - 4x - 1 \geq 0$ .  $\Delta = 16 + 4 = 20 = 4 \times 5$ , donc  $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{5}$ . Racines :  $x = \frac{4 \pm 2\sqrt{5}}{2} = 2 \pm \sqrt{5}$ . Comme  $a = 1 > 0$ , le trinôme est positif **à l'extérieur** des racines.  $S = ] - \infty; 2 - \sqrt{5}] \cup [2 + \sqrt{5}; +\infty[$ .
- e) On ramène tout à gauche :  $-x^2 + 8x - 7 - 3x^2 - 1 > 0$ , c'est-à-dire  $-4x^2 + 8x - 8 > 0$ . On divise par  $-4$  (**négatif** : on inverse le sens de l'inégalité) :  $x^2 - 2x + 2 < 0$ . Or  $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$  et  $a = 1 > 0$ , donc ce trinôme est **toujours strictement positif** : il ne peut jamais être  $< 0$ .  $S = \emptyset$ .

### Solution de l'exercice 14

(Retour à l'énoncé)

**Rappel de cours.** Un tableau de deux grandeurs  $x$  et  $y$  est un **tableau de proportionnalité** si  $y = k \times x$  pour une constante  $k$  (le **coefficient de proportionnalité**) valable **pour toutes les colonnes** ; dans le repère, les points sont alors alignés sur une droite passant par l'origine, de pente  $k$ .

1. **Périmètre** =  $4 \times \text{côté}$  (formule du périmètre d'un carré de côté  $c$  :  $4c$ ) :

|                    |   |   |    |    |    |    |  |     |     |         |
|--------------------|---|---|----|----|----|----|--|-----|-----|---------|
| Côté d'un carré    | 1 | 2 | 5  | 7  | 8  | 10 |  | $a$ | $b$ | $a + b$ |
| Périmètre du carré | 4 | 8 | 20 | 28 | 32 | 40 |  | 4a  | 4b  | 4(a+b)  |

(par exemple, colonne 3 : périmètre = 20, donc côté =  $20/4 = 5$  ; colonne 6 : périmètre = 40, donc côté = 10.)

**Aire** = côté<sup>2</sup> (formule de l'aire d'un carré) :

|                 |          |          |           |    |           |           |  |       |       |             |
|-----------------|----------|----------|-----------|----|-----------|-----------|--|-------|-------|-------------|
| Côté d'un carré | 1        | <b>2</b> | 5         | 7  | 8         | <b>10</b> |  | $a$   | $b$   | $a + b$     |
| Aire du carré   | <b>1</b> | 4        | <b>25</b> | 49 | <b>64</b> | 100       |  | $a^2$ | $b^2$ | $(a + b)^2$ |

(par exemple, colonne 2 : aire = 4, donc côté =  $\sqrt{4} = 2$ ; colonne 6 : aire = 100, donc côté =  $\sqrt{100} = 10$ .)

**2.** Le tableau du **périmètre** est un tableau de proportionnalité : à chaque fois, périmètre =  $4 \times$  côté, avec le **même** coefficient  $k = 4$  dans toutes les colonnes. Le coefficient qui permet de repasser du périmètre au côté est  $\frac{1}{4}$  (l'inverse de 4) : côté =  $\frac{1}{4} \times$  périmètre.

Le tableau de l'**aire** n'est **pas** un tableau de proportionnalité : le rapport aire/côté n'est pas constant (par exemple  $\frac{1}{1} = 1$  mais  $\frac{4}{2} = 2$ ). On le confirme algébriquement grâce à la dernière colonne : pour le périmètre, on a bien  $4(a + b) = 4a + 4b$  (la valeur pour  $a + b$  est la somme des valeurs pour  $a$  et pour  $b$  — c'est la caractéristique d'une relation linéaire/proportionnelle) ; en revanche pour l'aire,  $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \neq a^2 + b^2$  en général (il manque le terme  $2ab$ ) : l'aire du carré de côté  $a + b$  n'est **pas** la somme des aires des carrés de côtés  $a$  et  $b$ .

**3.** Pour le tableau « périmètre », les points (côté, périmètre) sont alignés sur la droite d'équation  $y = 4x$ , qui passe par l'origine  $(0, 0)$  (un côté nul donne un périmètre nul) et a pour **pente** (coefficient directeur) 4 — c'est exactement le coefficient de proportionnalité. Pour le tableau « aire », les points (côté, aire) sont sur la courbe d'équation  $y = x^2$ , une **parabole** et non une droite : l'aire n'est pas proportionnelle au côté.

### Solution de l'exercice 15

(Retour à l'énoncé)

On travaille avec les unités usuelles en informatique : 1 Go = 1000 Mo (comme 1 km = 1000 m).

**1.** On calcule d'abord le **débit** (quantité de données par seconde) :

$$\text{débit} = \frac{300 \text{ Mo}}{20 \text{ s}} = 15 \text{ Mo/s.}$$

La banque pèse 500 Go = 500 000 Mo. Le temps nécessaire est

$$t = \frac{\text{quantité}}{\text{débit}} = \frac{500\,000 \text{ Mo}}{15 \text{ Mo/s}} = \frac{500\,000}{15} \text{ s} = \frac{100\,000}{3} \text{ s} \approx 33\,333,3 \text{ s.}$$

On convertit en heures (on divise par 3600, le nombre de secondes dans une heure) :

$$t \approx \frac{33\,333,3}{3600} \approx 9,26 \text{ h,}$$

soit environ 9 h 15 min.

**2.** On cherche la quantité maximale  $Q$  de données telle que  $\frac{Q}{15 \text{ Mo/s}} < 24 \text{ h}$ . On convertit 24 h en secondes :  $24 \times 3600 = 86\,400 \text{ s}$ . Donc

$$Q < 15 \text{ Mo/s} \times 86\,400 \text{ s} = 1\,296\,000 \text{ Mo} = 1\,296 \text{ Go} = 1,296 \text{ To.}$$

La banque peut donc peser au maximum (un peu moins de) 1 296 Go, soit environ 1,3 To.

### Solution de l'exercice 16

(Retour à l'énoncé)

On calcule d'abord le **volume d'un disque dur**, en multipliant ses trois dimensions :

$$V_{\text{disque}} = 50 \times 30 \times 4 = 6000 \text{ mm}^3.$$

On convertit le volume du coffre en  $\text{mm}^3$ , en se souvenant que 1 m = 1000 mm, donc  $1 \text{ m}^3 = 1000^3 \text{ mm}^3 = 10^9 \text{ mm}^3$  (**attention** : on met le facteur de conversion **au cube** car il s'agit d'un volume, une erreur fréquente est d'oublier cette mise au cube).

Le nombre de disques que l'on peut ranger dans le coffre est donc

$$n = \frac{V_{\text{coffre}}}{V_{\text{disque}}} = \frac{10^9}{6000} = \frac{10^9}{6 \times 10^3} = \frac{10^6}{6} \approx 166\,667 \text{ disques}$$

(on arrondit à l'entier inférieur puisqu'on ne peut pas avoir une fraction de disque).

Le stockage total est alors

$$n \times 10 \text{ To} \approx 166\,667 \times 10 \approx 1\,666\,667 \text{ To} \approx 1,67 \times 10^6 \text{ To},$$

soit environ 1 667 Po (pétaoctets, avec 1 Po = 1000 To), c'est-à-dire environ 1,67 Eo (exaoctets, avec 1 Eo = 1000 Po) : une quantité de stockage colossale !

### Solution de l'exercice 17

(Retour à l'énoncé)

**Rappel.** Une carte à l'échelle  $1/N$  signifie que **1 unité de longueur sur la carte représente  $N$  unités de longueur dans la réalité**, autrement dit  $d_{\text{carte}} = \frac{1}{N} \times d_{\text{réelle}}$  (mêmes unités des deux côtés).

1. La fonction  $d_{\text{réelle}} \mapsto d_{\text{carte}} = \frac{1}{25\,000} \times d_{\text{réelle}}$  est une fonction **linéaire** (proportionnelle) : c'est une **droite passant par l'origine**, de pente très faible ( $1/25\,000$ ), donc presque « plate » sur un graphique usuel.

Pour le bâtiment de 30 m sur 50 m :

$$30 \text{ m} \times \frac{1}{25\,000} = 0,0012 \text{ m} = 1,2 \text{ mm}, \quad 50 \text{ m} \times \frac{1}{25\,000} = 0,002 \text{ m} = 2 \text{ mm}.$$

Sur la carte, le bâtiment mesurera donc  $1,2 \text{ mm} \times 2 \text{ mm}$ .

2. L'échelle est le rapport  $\frac{d_{\text{carte}}}{d_{\text{réelle}}}$ , calculé avec la **même unité** des deux côtés. On convertit 206 km en cm :  $206 \text{ km} = 206\,000 \text{ m} = 20\,600\,000 \text{ cm}$ . L'échelle vaut donc

$$\frac{17,5}{20\,600\,000} = \frac{1}{1\,177\,143} \approx \frac{1}{1,18 \times 10^6},$$

soit environ  $1/1\,177\,000$ .

La fonction qui donne la dimension réelle (en km) en fonction de la dimension sur la carte (en cm) est la fonction **réciproque** de l'échelle : 206 km correspond à 17,5 cm, donc 1 cm correspond à  $\frac{206}{17,5} \approx 11,77 \text{ km}$ . La fonction cherchée est donc

$$d_{\text{réelle}}(\text{km}) = \frac{206}{17,5} \times d_{\text{carte}}(\text{cm}) \approx 11,77 \times d_{\text{carte}}(\text{cm}),$$

encore une fonction linéaire (droite passant par l'origine).

3. Si  $c$  désigne la longueur du côté **sur la carte**, la longueur réelle du côté vaut  $10\,000 c$  (même unité). L'aire réelle du bâtiment carré vaut alors

$$\mathcal{A}(c) = (10\,000 c)^2 = 10^8 c^2.$$

Ce n'est **pas** une fonction linéaire de  $c$  : c'est une fonction **du second degré** (une parabole), car l'aire dépend du **carré** de la longueur, contrairement à une simple longueur qui, elle, dépend linéairement de l'échelle (comme en question 1).

### Solution de l'exercice 18

(Retour à l'énoncé)

**Rappel.** Une concentration  $C$  (en mg/mL par exemple) relie une quantité de matière  $m$  et un volume  $V$  par  $m = C \times V$ . On utilise aussi  $1 \text{ mg} = 1000 \mu\text{g}$  et  $1 \text{ mL} = 1000 \mu\text{L}$ , donc une concentration de  $10 \text{ mg/mL}$  équivaut à  $10 \mu\text{g}/\mu\text{L}$  (les deux facteurs 1000 se simplifient).

**Tableau.** Avec  $C_S = 10 \mu\text{g}/\mu\text{L} = 10 \text{ mg/mL}$  :

- 1 mL prélevé  $\rightarrow 1 \text{ mL} \times 10 \text{ mg/mL} = 10 \text{ mg} = 10\,000 \text{ }\mu\text{g}$ .
- 10  $\mu\text{L}$  prélevés  $\rightarrow 10 \text{ }\mu\text{L} \times 10 \text{ }\mu\text{g}/\mu\text{L} = 100 \text{ }\mu\text{g}$ .
- Pour obtenir 100  $\mu\text{g}$ , il faut prélever  $\frac{100 \text{ }\mu\text{g}}{10 \text{ }\mu\text{g}/\mu\text{L}} = 10 \text{ }\mu\text{L}$  (on retrouve la colonne précédente, ce qui confirme la cohérence du facteur de conversion).
- Pour obtenir 1  $\mu\text{g}$ , il faut prélever  $\frac{1 \text{ }\mu\text{g}}{10 \text{ }\mu\text{g}/\mu\text{L}} = 0,1 \text{ }\mu\text{L}$ .

**2.** Le volume final est  $V_f = 20 \text{ }\mu\text{L} + 980 \text{ }\mu\text{L} = 1000 \text{ }\mu\text{L} = 1 \text{ mL}$ . La quantité d'antibiotique apportée par les 20  $\mu\text{L}$  de stock est  $20 \times 10 = 200 \text{ }\mu\text{g}$  (l'eau n'apporte pas d'antibiotique). La concentration finale est donc

$$C_f = \frac{200 \text{ }\mu\text{g}}{1 \text{ mL}} = 200 \text{ }\mu\text{g/mL} = 0,2 \text{ mg/mL}.$$

**3.** Notons  $x = V_S$  (en mL) le volume de solution stock prélevé, ajouté à 1 mL d'eau. La quantité d'antibiotique apportée est  $10x$  (mg), et le volume final obtenu est  $x + 1$  (mL). La concentration finale doit valoir 1 mg/mL, donc

$$\frac{10x}{x + 1} = 1, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 10x = x + 1$$

(on a multiplié les deux membres par  $x + 1 > 0$ ). On résout :  $10x - x = 1$ , donc  $9x = 1$ , donc  $x = \frac{1}{9}$ .

Donc  $V_S = \frac{1}{9} \text{ mL} \approx 0,111 \text{ mL} = 111 \text{ }\mu\text{L}$ .

**4.** La quantité de matière active prélevée est  $C_S \times V_S$  (concentration du stock  $\times$  volume prélevé). Cette même quantité de matière se retrouve, après dilution, répartie dans tout le volume final  $V_f$  (l'eau ajoutée ne contient pas de matière active, elle ne fait que diluer) : la quantité totale ne change pas, seulement le volume dans lequel elle est répartie. On a donc l'égalité des quantités :

$$C_S \times V_S = C_f \times V_f.$$

En divisant les deux membres par  $V_f \times C_S$  (tous deux non nuls), on obtient

$$\frac{V_S}{V_f} = \frac{C_f}{C_S}.$$

**5.** On a  $\frac{V_S}{V_f} = 10^{-4}$  et  $V_f = 10 \text{ mL}$ , donc

$$V_S = 10^{-4} \times 10 \text{ mL} = 10^{-3} \text{ mL} = 1 \text{ }\mu\text{L}.$$

Le volume d'eau à ajouter est

$$V_d = V_f - V_S = 10 \text{ mL} - 0,001 \text{ mL} = 9,999 \text{ mL} \approx 10 \text{ mL}$$

(le volume de solution stock prélevé est ici tellement petit — 1  $\mu\text{L}$  — qu'il est négligeable devant le volume final).