Biomarker	Better	k	Change, % (95% CI)	I^2
Leptin	lower	8	−35.5 (−53.7 to −17.3)	86%
hsCRP	lower	36	−31.1 (−36.7 to −25.5)	91%
Liver fat (MRI-PDFF)	lower	9	−30.6 (−47.2 to −13.9)	78%
HOMA-IR	lower	10	−23.7 (−31.3 to −16.1)	63%
Glucagon	lower	5	−21.6 (−44.2 to 1.0)	97%
Fasting insulin	lower	17	−20.1 (−29.3 to −11.0)	90%
ALT	lower	10	−18.8 (−33.1 to −4.5)	86%
Visceral adipose tissue	lower	7	−17.6 (−28.6 to −6.7)	70%
GGT	lower	6	−15.1 (−30.1 to −0.2)	55%
NT-proBNP	lower	4	−13.5 (−25.8 to −1.2)	16%
Triglycerides	lower	28	−13.3 (−18.0 to −8.6)	90%
TNF-alpha	lower	10	−11.5 (−17.5 to −5.5)	64%
GDF-15	lower	3	−10.3 (−24.4 to 3.8)	0%
Fasting glucose	lower	30	−6.7 (−11.0 to −2.4)	96%
Total lean mass	higher	2	−5.0 (−29.8 to 19.7)	13%
LDL cholesterol	lower	26	−4.7 (−6.6 to −2.8)	56%
HbA1c	lower	38	−4.6 (−6.6 to −2.7)	98%
IL-6	lower	5	−3.5 (−17.4 to 10.4)	20%
SBP	lower	27	−3.3 (−4.2 to −2.4)	79%
Total cholesterol	lower	26	−3.2 (−4.4 to −2.1)	53%
C-peptide	lower	6	−2.7 (−25.1 to 19.7)	94%
AST	lower	6	−1.5 (−30.3 to 27.4)	70%
DBP	lower	25	−1.4 (−2.4 to −0.5)	72%
Body fat percentage	lower	2	0.2 (−9.9 to 10.2)	0%
Resting heart rate	lower	10	2.7 (0.7 to 4.7)	72%
eGFR	higher	3	2.9 (−3.6 to 9.4)	0%
Adiponectin	higher	19	15.8 (9.5 to 22.1)	58%
HOMA-beta	higher	7	33.7 (−0.3 to 67.8)	93%

