

Cénozoïque:

Quaternaire:

-  Alluvions des vallées
-  Eboulis de pentes
-  Tuf calcaire
-  Terrasses fluviatiles
-  Sable et cailloux, limon avec galets
-  Limons des plateaux
-  Limons avec concrétions ferrugineuses remaniées
-  Limons fluviatiles avec concrétions ferrugineuses remaniées

Tertiaire:

-  Terrasse supérieure

Tertiaire à Quaternaire:

-  Dépôts pleistocènes et néogènes indifférenciés

Tertiaire:

-  Limons des plateaux, probablement d'âge neogène
-  Concrétions de minerai de fer des prés dans un limon sablo-argileux
-  Limons et minerai de fer pisolithique

Mésozoïque:

Jurassique:

-  Calcaire de Haut-Pont
-  Marnes micacées
-  Calcaire d'Ottange; Couches à Sonninia
-  Marnes sableuses d'Audun-le-Tiche; Calcaire d'Audun-le-Tiche
-  Dogger inférieur
-  Minette
-  Minette
-  Couches à Hildoceras bifrons
-  Couches à Pseudogrammoceras fallaciosum
-  Couches à Grammoceras striatulum
-  Marnes à Astarte voltzi
-  Couches à Harpoceras falciferum
-  Couches à Pleuroceras spinatum
-  Marnes feuilletées
-  Calcaire ocreux
-  Couches à Pleuroceras spinatum – Macigno
-  Couches à Pleuroceras spinatum – Faciès sablo-marneux
-  Marnes à Septaries; Marnes à Ovoïdes ferrugineux
-  Marnes et Calcaires de Strassen
-  Formation de Luxembourg / Faciès de transition
-  Grès de Luxembourg
-  Marnes pauvres en fossiles
-  Formation de Luxembourg / Grès de Luxembourg
-  Marnes d'Elvange

Trias:

-  Keuper à marnolites compactes
-  Keuper à pseudomorphoses de sel
-  Argiles de Levallois
-  Grès de Mortinsart
-  Keuper à pseudomorphoses de sel, faciès grés-conglomératique
-  Dolomie limite
-  Marnes bariolées
-  Marnes rouges gypsifères
-  Gisement de gypse
-  Lettenkeuper
-  Grès à roseaux
-  Dolomie conglomératique
-  Formation de Mortinsart
-  Conglomérat dolomitique
-  Gisement de gypse
-  Couches limites et Couches à Ceratites
-  Couches à entroques
-  Dolomie à Lingula tenuissima
-  Marnes gypsifères
-  Formation de Gilsdorf
-  Grès coquillier
-  Conglomérat de base avec cailloutis et gravier résiduels du Grès à Voltzia
-  Grès à Voltzia
-  Couches de transition
-  Conglomérat de base avec cailloutis et nodules dolomitiques résiduels des Couches de Transition
-  Groupe de l'anhydrite
-  Couches à cératites & couches à entroques
-  Couches à Myophoria orbicularis
-  Grès coquillier
-  Muschelkalk grossier (mm-mo1)
-  Buntsandstein
-  Muschelkalk et Buntsandstein indifférenciés

Paléozoïque:

Dévonien:

-  Schiste de Stolzembourg
-  Quartzophyllades de Schuttbourg
-  Quartzite de Berlé
-  Couches bigarrées de Clervaux
-  Schiste de Wiltz
-  Quartzite du Taunus
-  Grès et Schistes gréseux, compact
-  Siegenien supérieur en général
-  Siegenien supérieur: à la base, faciès local de phyllades très fissiles (ardoises)
-  Phyllade bleu, noir et quartzophyllade gris
-  Schiste de Bas-Bellain