

2D-Vision Blatt 7

Aufgabe 2

$p_1 = (1, 1)$	$K(p_1) = 0$	$p_2 = (1, 3)$	$K(p_2) = 0$
$p_3 = (1, 5)$	$K(p_3) = 1$	$p_4 = (3, 1)$	$K(p_4) = 0$
$p_5 = (5, 1)$	$K(p_5) = 1$	$p_6 = (5, 5)$	$K(p_6) = 1$

Wobei $K(x)$ die Klasse von x ist.

a) $p_7 = (3, 3)$

$$\text{Sei } A(p) = \|p - p_7\|_2 = \sqrt{(p * x - p_7 * x)^2 + (p * y - p_7 * y)^2}$$

$$A(p_1) = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \approx 2,83$$

$$A(p_2) = \sqrt{4 + 0} = \sqrt{4} \approx 2$$

$$A(p_3) = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \approx 2,83$$

$$A(p_4) = \sqrt{0 + 4} = \sqrt{4} \approx 2$$


$$A(p_5) = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \approx 2,83$$

$$A(p_6) = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} \approx 2,83$$

\Rightarrow Nächste Nachbarn sind p_1 und p_4

$$K(p_2) = K(p_4) = 0 \Rightarrow K(p_7) = 0$$

b) (1) ohne p_7




(2) mit p_7 : NICHT linear separierbar

p_2, p_7 und p_5 liegen auf einer Geraden. Würde man z.B. zwischen p_2 und p_7 separieren, so wäre p_5 auf der Seite von p_7 . Widerspruch ⚡

Aufgabe 3

1. $y = (w_0 \ w_1) * x + b = (-1 \ -2) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + 1 = 1$
2. $n = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} w_0 \\ w_1 \end{pmatrix} \quad p = \begin{pmatrix} 1 \\ 0,5 \end{pmatrix} \quad w_2 = n^T p = -1,5$
 $w_0 = 1, \quad w_1 = 1, \quad w_2 = -1,5, \quad b = 1$



Aufgabe 4

$$f(n) = \frac{1}{1 + e^{\lambda n}} \quad , \lambda \in (0, \infty)$$

$$g(n) = \frac{e^{\lambda n} - e^{-\lambda n}}{e^{\lambda n} + e^{-\lambda n}} \quad , \lambda \in (0, \infty)$$

Zu zeigen: $g(n) = 2f(2n) - 1$

Beweis:

$$2f(2n) - 1 = \frac{2}{1 + e^{-2\lambda n}} - 1 = \frac{2 - (1 + e^{-\lambda n})}{1 + e^{-2\lambda n}} = \frac{1 - e^{-2\lambda n}}{1 + e^{-2\lambda n}} = \frac{e^{\lambda n} - e^{-\lambda n}}{e^{\lambda n} + e^{-\lambda n}} = g(n)$$

Multipliziert man jedes Gewicht des MLP mit Aktivierungsfunktion f mit 2 und fügt nach dem 1. Layer ein Bias $b = -1$ für alle folgenden Layer ein, so erhält man ein MLP, das Äquivalent zu einem MLP mit den ursprünglichen Gewichten und Aktivierungsfunktion g ist.