

SEGUIMENT PROACTIU

061/Salut Respon

SEGUIMENT CRS als 30 dies de l'alta hospitalària

- Heu rebut la trucada del vostre CSM?
- Teniu dia de visita confirmada?
- Us trobeu millor?
- Heu estat visitat al vostre CSM?

IDENTIFICACIÓ FACTORS DE RISC

- Estar deprimit/da (depressió major).
- Diagnòstic psiquiàtric de:
 - Trastorn depressiu.
 - Trastorn psicòtic.
 - Trastorn bipolar.
 - Trastorn límit de la personalitat.
 - Trastorn conducta alimentària.
- Impulsivitat, agressivitat, agitació, nivell de consciència alterat.
- Consum excessiu i/o dependència de l'alcohol.
- Consum i/o addicció a d'altres substàncies.
- Malalties orgàniques greus.
- Altres factors de risc:
 - Gènere home.
 - >65 anys o adolescent.
 - Problemes socials.
 - Esdeveniments vitals estressants <3 mesos (laborals, parella, econòmics, família)
- Accés a armes, tòxics i altres mitjans letals o situacions de violència.
- Antecedents familiars (1r grau) de suïcidi consumat.

codi RISC SUÏCIDI



Atenció
d'emergència
a la sospita de
risc de suïcidi



ALERTA!

Central de
Coordinació
Sanitària
del SEM
(CECOS)



061
/Salut
Respon

112
emergències



Activació
de
recursos

**Temptativa
de suïcidi**

- Valoració de l'estat
del pacient
- Contenció

**TRASLLAT A
HOSPITAL DE
REFERÈNCIA CRS**

Seguiment posterior a
l'alta hospitalària

061/Salut
Respon

**Sospita de Risc de
Suïcidi**

MINI (mini entrevista neuropsiquiàtrica
internacional)

DURANT L'ÚLTIM MES...

- | | |
|--|-----------|
| | SÍ |
| • Heu pensat que estàrieu millor mort/a? | 1p |
| • Heu volgut fer-vos mal? | 2p |
| • Heu pensat en el suïcidi? | 6p |
| • Heu planejat com fer-ho? | 10p |
| • Ho heu intentat recentment? | 10p |
| <hr/> | |
| • Ho heu intentat en algun moment de la vostra vida? | 4p |

+ 10 punts RS ALT

1-5 punts RS BAIX
6-9 punts RS MITJÀ*

**ACTIVACIÓ
CODI RISC
SUÏCIDI**

acompanyament telefònic
continuat

**CONSELL
TELÈFONIC**

**Informació dels
dispositius de la xarxa
disponibles:**

- Atenció Primària
- Salut Mental

*Excepcionalment, l'avaluació clínica de la comorbiditat i dels factors de risc presents en el pacient amb risc moderat o mitjà pot aconsellar la necessitat d'incrementar el nivell de sospita inicial a un nivell de risc alt.