Soluciónes

Julian Diemer

```
source("teoriadecision_funciones_incertidumbre.R")
```

🛑 Enunciado del Problema 1

Problema 1: Matrices de valores numéricos

Se consideran dos matrices de decisión de 4×4 compuestas por valores enteros aleatorios: una representa una situación de beneficios (favorable) y la otra una situación de costes (desfavorable). Se pide analizar ambas matrices aplicando los seis criterios de decisión bajo incertidumbre estudiados para determinar la alternativa óptima en cada caso. Además hay las siguientes cinco preguntas de Verdadero o Falso relacionadas con los resultados:

- 1) En la matriz favorable el criterio de Wald elige dos alternativas equivalentes.
- 2)
- 3)
- 4)
- 5) En la matriz desfavorable el criterio de Hurwitz

	e1	e2	e3	e4
d1	6	−7	−4	9
d2	−6	7	−7	7
d3	−10	6	−6	4
d4	−1	4	3	−8

	e1	e2	e3	e4
d1	−2	−6	−8	4
d2	−7	9	−10	−3
d3	−6	−9	−1	−7
d4	2	−3	0	−7

Solución (favorable): Empezamos con el análisis de la primera matriz (favorable), aplicando de manera sistemática los seis criterios de decisión estudiados en clase para evaluar las diferentes alternativas y determinar la decisión óptima bajo cada uno de ellos:

```
tb01a = crea.tablaX(c(6,-7,-4,9,
                      -6,7,-7,7,
                      -10,6,-6,4,
```

```
                    -1,4,3,-8), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb01a
```

```
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8
```

```
criterio.Wald(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 -7  -7 -10  -8

$ValorOptimo
[1] -7

$AlternativaOptima
d1 d2
 1  2
```

Aplicando el criterio de Wald (pesimista), podemos observar que las alternativas d_1 y d_2 resultan ser equivalentes, ya que ambas ofrecen el mismo valor en el peor de los escenarios.

```
criterio.Optimista(tb01a, T)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 9  7  6  4

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Aplicando el criterio optimista (Maximax), se selecciona la alternativa d_1, ya que es la que ofrece el mayor beneficio posible en el mejor escenario.

```
criterio.Savage(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8
```

```
$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  3  9

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  0 14  7  0
d2 12  0 10  2
d3 16  1  9  5
d4  7  3  0 17

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
14 12 16 17

$ValorOptimo
[1] 12

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Según el criterio de Savage (minimax del arrepentimiento), la opción recomendada es d_2, ya que es la alternativa que minimiza el máximo coste de oportunidad o pérdida en el peor de los escenarios.

```
criterio.Laplace(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
```

```
 1.00  0.25 -1.50 -0.50

$ValorOptimo
[1] 1

$AlternativaOptima
d1
 1
```

Según el criterio de Laplace (equiprobable), se selecciona la alternativa d_1, ya que presenta el mayor valor medio o esperanza matemática bajo la suposición de que todos los estados de la naturaleza tienen la misma probabilidad de ocurrir.

```
criterio.PuntoIdeal(tb01a,T)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "favorable"

$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$Mejores
e1 e2 e3 e4
 6  7  3  9

$ValorAlternativas
[1] 15.65248 15.74802 19.05256 18.62794

$ValorOptimo
[1] 15.65248

$AlternativaOptima
[1] 1
```

Según el método del punto ideal, el resultado también señala la opción d_1, aunque el margen fue muy ajustado y por poco resulta elegida la opción d_2.

Para el criterio de Hurwicz, elegimos un coeficiente de optimismo de $\alpha = 0,6$, que representa un buen término medio entre el mejor y el peor escenario.

```
criterio.Hurwicz(tb01a, alfa=0.6, T)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.6

$metodo
[1] "favorable"


$tablaX
    e1 e2 e3 e4
d1   6 -7 -4  9
d2  -6  7 -7  7
d3 -10  6 -6  4
d4  -1  4  3 -8

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
 2.6  1.4 -0.4 -0.8

$ValorOptimo
[1] 2.6

$AlternativaOptima
d1
 1
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01a, T)
```



Ahora vamos a ver la evaluación final:

```
criterio.Todos(tb01a, 0.6, T)
```

```
                   e1   e2   e3   e4  Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
d1                  6   -7   -4    9    -7         9     2.6     14    1.00
d2                 -6    7   -7    7    -7         7     1.4     12    0.25
d3                -10    6   -6    4   -10         6    -0.4     16   -1.50
d4                 -1    4    3   -8    -8         4    -0.8     17   -0.50
iAlt.Opt (fav.) <NA> <NA> <NA> <NA> d1,d2        d1      d1     d2      d1
                Punto Ideal
d1                    15.65
d2                    15.75
d3                    19.05
d4                    18.63
iAlt.Opt (fav.)          d1
```

Vemos que la alternativa d_1 se propone cinco veces y la alternativa d_2, dos veces. Ningún criterio apoya las alternativas d_3 y d_4. Por lo tanto, la elección definitiva sería la alternativa d_1.

Solución (desfavorable): Continuamos con la solución de la segunda tabla, aplicando los seis mismos criterios:

```
tb01b = crea.tablaX(c(-2,-6,-8,4,
                      -7,9,-10,-3,
                      -6,-9,-1,-7,
                      2,-3,0,-7), numalternativas = 4, numestados = 4)
tb01b
```

```
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7
```

```
criterio.Wald(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Wald"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
 4  9 -1  2

$ValorOptimo
[1] -1

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Aplicando el criterio de Wald a la segunda tabla (desfavorable), la alternativa óptima es la opción d_3, ya que es la que minimiza el coste máximo en el peor de los escenarios.

```
criterio.Optimista(tb01b, F)
```

```
$criterio
[1] "Optimista"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
 d1  d2  d3  d4
 -8 -10  -9  -7

$ValorOptimo
[1] -10

$AlternativaOptima
d2
 2
```

Con el criterio optimista obtenemos como mejor decisión la alternativa d_2.

```
criterio.Savage(tb01b, F)
```

```
$criterio
[1] "Savage"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7
```

```
$Mejores
 e1  e2  e3  e4
 -7  -9 -10  -7

$Pesos
   e1 e2 e3 e4
d1  5  3  2 11
d2  0 18  0  4
d3  1  0  9  0
d4  9  6 10  0

$ValorAlternativas
d1 d2 d3 d4
11 18  9 10

$ValorOptimo
[1] 9

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Con el criterio de savage obtenemos como mejor alternativa d_3.

```
criterio.Laplace(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Laplace"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
   d1    d2    d3    d4
```

```
-3.00 -2.75 -5.75 -2.00

$ValorOptimo
[1] -5.75

$AlternativaOptima
d3
 3
```

Con el criterio de Laplace obtenemos la alternativa d_3 otra vez.

```
criterio.PuntoIdeal(tb01b,F)
```

```
$criterio
[1] "Punto Ideal"

$metodo
[1] "desfavorable"

$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$Mejores
 e1  e2  e3  e4
 -7  -9 -10  -7

$ValorAlternativas
[1] 12.609520 18.439089  9.055385 14.730920

$ValorOptimo
[1] 9.055385

$AlternativaOptima
[1] 3
```

El criterio del punto ideal también surgiere la alternativa d_3.

```
criterio.Hurwicz(tb01b, alfa=0.4, F)
```

```
$criterio
[1] "Hurwicz"

$alfa
[1] 0.4

$metodo
[1] "desfavorable"


$tablaX
   e1 e2  e3 e4
d1 -2 -6  -8  4
d2 -7  9 -10 -3
d3 -6 -9  -1 -7
d4  2 -3   0 -7

$ValorAlternativas
  d1   d2   d3   d4
-0.8  1.4 -4.2 -1.6

$ValorOptimo
[1] -4.2

$AlternativaOptima
d3
 3
```

```
dibuja.criterio.Hurwicz(tb01b, F)
```




```
criterio.Todos(tb01b, 0.4, F)
```

```
                     e1   e2   e3   e4 Wald Optimista Hurwicz Savage Laplace
d1                   -2   -6   -8    4    4        -8    -0.8     11   -3.00
d2                   -7    9  -10   -3    9       -10     1.4     18   -2.75
d3                   -6   -9   -1   -7   -1        -9    -4.2      9   -5.75
d4                    2   -3    0   -7    2        -7    -1.6     10   -2.00
iAlt.Opt (Desfav.) <NA> <NA> <NA> <NA>   d3        d2      d3     d3      d3
                   Punto Ideal
d1                      12.610
d2                      18.439
d3                       9.055
d4                      14.731
iAlt.Opt (Desfav.)          d3
```

Vemos que todos los criterios, excepto el criterio optimista, se decantan por la alternativa d_3, por lo que esta es nuestra decisión definitiva.