

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna secara statistik pada massa tumor, namun secara klinis terjadi pengecilan ukuran massa tumor sebelum kemoterapi seri 1 dan sesudah kemoterapi seri 6 paklitaksel cisplatin pada pasien kanker serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB di RSUP Sanglah Denpasar.
2. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada nilai BUN sebelum kemoterapi seri 1 dan sesudah kemoterapi seri 6 paklitaksel cisplatin pada pasien kanker serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB di RSUP Sanglah Denpasar.
3. Tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada nilai serum kreatinin sebelum kemoterapi seri 1 dan sesudah kemoterapi seri 6 paklitaksel cisplatin pada pasien kanker serviks sel skuamosa stadium IIB-IIIB di RSUP Sanglah Denpasar.

5.2 Saran

1. Penelitian untuk melihat efektivitas dan toksisitas sebelum dan sesudah enam seri kemoterapi perlu dilakukan dengan jumlah sampel yang lebih besar sehingga dapat memberikan informasi yang lebih optimal kepada tenaga kesehatan lainnya.

2. Perlu dilakukan pemantauan terhadap efek terapi dan efek samping secara rutin dan terus menerus untuk setiap pemberian kemoterapi kepada pasien oleh farmasis.
3. Perlu dilakukan penelitian untuk melihat efektivitas dan toksisitas kemoterapi yang dilanjutkan dengan radioterapi untuk mendapatkan hasil pengobatan yang lebih optimal.