

TABLE A1. Prévalence d’infection pour chaque espèce de poisson dans les lacs échantillonnés. Les valeurs de prévalence sont présentées en pourcentage.

Lake	<i>Ambloplites rupestris</i>	<i>Fundulus diaphanus</i>	<i>Micropterus dolomieu</i>	Unknown centrarchids	<i>Lepomis gibbosus</i>	<i>Perca flavescens</i>	<i>Pimephales promelas</i>	<i>Chrosomus spp</i>
Achigan	0.00	0.00	8.62	0.00	10.34	0.00	NaN	NaN
Beaver	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	1.79	0.00
Coeur	NaN	NaN	36.30	NaN	89.47	19.79	NaN	NaN
Cornu	NaN	NaN	41.38	NaN	88.89	33.33	NaN	NaN
Corriveau	NaN	NaN	NaN	NaN	62.41	NaN	NaN	0.00
Croche	NaN	NaN	NaN	NaN	29.18	NaN	0.00	0.00
Cromwell	NaN	NaN	0.00	NaN	78.72	NaN	NaN	0.00
Echo	47.06	NaN	51.85	NaN	66.07	90.48	NaN	NaN
Fournelle	47.62	NaN	28.19	NaN	80.51	0.00	NaN	NaN
Montaubois	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	65.15	NaN	NaN
Morency	NaN	NaN	7.84	NaN	75.22	NaN	NaN	NaN
Pin rouge	57.89	NaN	0.00	NaN	75.88	50.00	NaN	NaN
St-Onge	NaN	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00	NaN	NaN
Triton	NaN	NaN	NaN	NaN	0.00	NaN	NaN	0.00