

Opti Num 2A - TD 2

mardi 6 octobre 2020
09:57

▷ **Exercice 1.** Soit le problème d'optimisation

$$\begin{cases} \min f(x) = \frac{1}{2} ((x_1 - 1)^2 + x_2^2) \\ x \in \mathbb{R}^2 \\ -x_1 + \beta x_2^2 = 0 \end{cases}$$

paramétré par β dans \mathbb{R} .

1.1. Représenter graphiquement la contrainte et les lignes de niveau associées au critère.

1.2. Déterminer la nature (minimum/maximum, local/global) des points critiques suivant la valeur de β .

▷ **Exercice 2.** Soit le problème d'optimisation

$$\begin{cases} \min f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \\ x \in \mathbb{R}^3 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_3 = -2. \end{cases}$$

2.1. Montrer qu'on a existence et unicité.

2.2. Caractériser la solution.

2.3. Soient

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 7 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & -2 & 1 \\ \hline 2 & 7 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ et } b = \begin{bmatrix} 3 \\ -9 \\ -4 \\ \hline 5 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

(abc 1x1) = diag > 0 et dominante strictement
c'est une matrice def-ps

Montrer que $Az = b$ si et seulement si (x_1, x_2, x_3) est solution d'un problème d'optimisation quadratique à contraintes linéaires à préciser.

le domaine \mathcal{C} est l'intersection de deux hyperplans affines dans \mathbb{R}^3 , non vide car $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{C}$
c'est naturellement un fermé de \mathbb{R}^3 , non borné, convexe.

$f(x) = \|x\|_2^2$ est bien évidemment croissante à l'abscisse (et n'est pas polynomiale).

on a donc l'existence d'un min global de f sur $\mathcal{C} (\neq \emptyset)$

Unicité: \mathcal{C} étant convexe, étudier la Hessienne de f .

$$\forall x \in \mathcal{C}, \quad \nabla^2 f(x) = 2I_n \text{ def. pos.}$$

donc f est strictement convexe sur le convexe \mathcal{C}

$$(\forall x \neq y \in \mathcal{C}, \quad \langle \nabla^2 f(x), \underbrace{y-x}_{\substack{\uparrow \\ \alpha \vec{u}}} \rangle = \alpha^2 \vec{u}^T [\nabla^2 f(x)] \vec{u} > 0)$$

d'où l'unicité du min global.

24

① la qualification des contraintes est automatiquement acquise dans le cas de contraintes toutes affines.

② CMI, qui dans le cas convexe devient une CMS d'optimalité globale (sous HAC)

on pose le Lagrangien:

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = f(x) + \lambda_1 (x_1 + 2x_2 - x_3 - 4) + \lambda_2 (x_1 - x_2 + x_3 + 2)$$

$$x \in \mathbb{R}^3, \lambda \in \mathbb{R}^2$$

$$\text{car } \nabla \mathcal{L}(x, \lambda) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ 2x_2 + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \end{cases}$$

$$\min_{x, \lambda} \left\{ \begin{array}{l} \nabla_{\lambda} \mathcal{L}(x, \lambda) = 0 \\ (x \in \mathcal{C}) \end{array} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} 2x_2 + 2\lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ 2x_3 - \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 4 \\ x_1 - x_2 + x_3 = -2 \end{array} \right.$$

Systeme lineaire 5×5 .

$$\left[\begin{array}{ccc|cc} 2 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 1 \\ \hline 1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{c} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \hline \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{array} = \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \hline 4 \\ -2 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} f(x) = \frac{1}{2} x^T A x + g^T x \\ x / Cx = d \end{array} \right.$$

$$\left(\begin{array}{l} \text{systeme symetrique} \\ \text{avec un bloc diagonal de } \phi \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} \nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda) = Ax + g + C^T \lambda = 0 \\ \nabla_{\lambda} \mathcal{L}(x, \lambda) = Cx - d = 0 \end{array}$$

Ce systeme est appele systeme augmente

▷ **Exercice 3.** Soit le problème d'optimisation

$$\begin{cases} \min f(x) = \frac{1}{2} \|x - a\|^2 \\ x \in \mathbb{R}^n \\ \sum_{i=1}^{n-1} x_i^2 = 0 \end{cases}$$

avec a fixé dans \mathbb{R}^n .

3.1. Montrer qu'on a existence et unicité.

1

3.2. Caractériser la solution.

Existence et unicité = :

- $\mathcal{C} = \text{Vect}\{e_i\}$ est un fermé convexe - non borné -
- $f(a) = \frac{1}{2} \|x - a\|_2^2$ est \mathcal{C}^∞ , \nearrow à l' ∞ .
 - d'où l'existence
 - et pour l'unicité, $\nabla^2 f(a) = I_n$ définitive positive.


$$\begin{pmatrix} f(x) = \frac{1}{2} x^T x - a^T x + \frac{1}{2} a^T a \\ \nabla f(x) = x - a \\ \nabla^2 f(x) = I_n \end{pmatrix}$$

$$\bullet \quad \mathcal{L}(x, \lambda) = \frac{1}{2} \|x - a\|_2^2 + \lambda \left(\sum_{i=1}^{n-1} x_i^2 \right)$$

$x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}$

ds le cas contraire, la CRES est une CRES -

$$\text{KKT} \quad \begin{cases} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 2x_1 \\ \vdots \\ 2x_{n-1} \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \\ \sum_{i=1}^{n-1} x_i^2 = 0 \end{cases} \rightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_{n-1} = 0$$

et $x = a$ - 

HQC n'est pas valide !

en effet, $\forall x \in \mathcal{C}$, $\nabla \mathcal{L}(x) = \begin{pmatrix} 2x_1 \\ \vdots \\ 2x_{n-1} \end{pmatrix}$

mais $x \in \mathcal{C} \Leftrightarrow \begin{matrix} x_1 = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} = 0 \end{matrix}$

$$C(x) = \sum_{i=1}^{n-1} x_i^2 \quad \begin{pmatrix} x_{n-1} \\ 0 \end{pmatrix} \quad x_{n-1} = 0$$

$$\Rightarrow \nabla C(x) = 0$$

Changeons la formulation du PB -

$$\begin{cases} \min \frac{1}{2} \|x - a\|_2^2 \\ x \in \mathbb{R}^n / \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} = 0 \end{cases} \quad (n-1 \text{ eqs linéaires}) \end{cases}$$

• HRC automatiquement acquise ds le cas de contraintes affines -

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x, \lambda) &= \frac{1}{2} \|x - a\|_2^2 + \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i x_i \\ x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}^{n-1} \end{aligned}$$

KKT
(CNS)

$$\begin{cases} x_1 - a_1 + \lambda_1 = 0 \\ x_2 - a_2 + \lambda_2 = 0 \\ \vdots \\ x_{n-1} - a_{n-1} + \lambda_{n-1} = 0 \\ x_n - a_n = 0 \\ x_1 = x_2 = \dots = x_{n-1} = 0 \end{cases}$$

Soln 0: $x = a_n e_n$

et $\lambda_1 = a_1$

\vdots
 $\lambda_{n-1} = a_{n-1}$

▷. **Exercice 4.** Soit le problème d'optimisation

$$\begin{cases} \min f(x) = 3x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 6x_1x_2x_3 \\ x \in \mathbb{R}^3 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

4.1. Le point $x = (1, 1, -1)$ est-il solution locale? Globale?

4.2. Donner l'ensemble des solutions locales, puis l'ensemble des solutions globales.

f est \mathcal{C}^∞ sur \mathbb{R}^3 (polynomiale)

$\mathcal{C} = \{x / x_1 + x_2 + x_3 = 1\}$ est un hyperplan affine
 \mathcal{C} est fermé, non borné, convexe.

$$f(3,3,3) = 9 \cdot 3^2 + 6 \cdot 3^3 \xrightarrow{3 \rightarrow +\infty} +\infty \quad \text{donc pas de max global}$$

$$\xrightarrow{3 \rightarrow -\infty} -\infty \quad \text{et pas de min global.}$$

$$\bar{x} = (1, 1, -1) \in \mathcal{C}.$$

La qualification des contraintes est automatiquement acquise dans le cas de contraintes affines.

On regarde alors les CML / CM2 / CS2

$$\mathcal{L}(x, \lambda) = 3(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 6x_1x_2x_3 + \lambda(x_1 + x_2 + x_3 - 1)$$

$x \in \mathbb{R}^3, \lambda \in \mathbb{R}$

$$\text{KKT : } \begin{cases} 6x_1 + 6x_2x_3 + \lambda = 0 \\ 6x_2 + 6x_1x_3 + \lambda = 0 \\ 6x_3 + 6x_1x_2 + \lambda = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - 1 = 0 \end{cases}$$

effectivement, on vérifie que $\bar{x} = (1, 1, -1)$, $\bar{\lambda} = 0$ est solution du système KKT.

$$\nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(x, \lambda) = \nabla^2 f(x) + \lambda \nabla^2 c(x)$$

(nul car $c(x)$ est affine)

$$= \begin{bmatrix} 6 & 6x_3 & 6x_2 \\ 6x_3 & 6 & 6x_1 \\ 6x_2 & 6x_1 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{et } \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(\bar{x}, \bar{\lambda}) = \begin{bmatrix} 6 & -6 & 6 \\ -6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \end{bmatrix}$$

les dble ici correspondent aux vecteurs $h \in \mathcal{Z}(\bar{x}, \mathcal{C})$

Sous HCC : $Z(\bar{x}, \bar{c}) = Z_L(\bar{x}, \bar{c}) = \left\{ h \in \mathbb{R}^3 / \langle \nabla c(\bar{x}), h \rangle = 0 \right\}$
 $= \left\{ h \in \mathbb{R}^3 \quad h \perp \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$
 $= \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

Regardons donc

$$H = V^T \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(\bar{x}, \bar{\lambda}) V \quad \text{avec } V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & -6 & 6 \\ -6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 12 & -12 \\ -12 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 24 & -12 \\ -12 & 0 \end{bmatrix} \quad \det = -(12)^2 < 0$$

donc elle est indéfinie.

• Cela invalide la CNE de min local.

[même raisonnement pour le max local ;
 on minimise $-f(x)$, avec $c(x)=0$]

KKT :

$$\begin{cases} 6x_1 + 6x_2x_3 + \lambda = 0 \\ 6x_2 + 6x_1x_3 + \lambda = 0 \\ 6x_3 + 6x_1x_2 + \lambda = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - 1 = 0 \end{cases}$$

on a : $6x_1 - 6x_1x_3 = 6x_2 - 6x_2x_3 \Leftrightarrow 6x_1(1-x_3) = 6x_2(1-x_3)$
 $\Leftrightarrow 6(x_1-x_2)(1-x_3) = 0$

donc :

$$6(x_2-x_3)(1-x_1) = 0$$

$$6(x_1-x_3)(1-x_2) = 0$$

•

```

      0
     / \
    x3=1 x3≠1
    /      \
  x1=-x2  x1=x2 et x3=1-2x1
  
```

- Soit $x_2=1, x_1=-1$ et $x_1-x_3 = 3x_1-1 = 0$ ssi $x_1 = +\frac{1}{3} = x_2$
 $x_3=1$ $J=0$ $x_3 = \frac{1}{3}; J = -\frac{8}{3}$

- Soit $x_2 \neq 1, x_2 = -x_3 = -1$ si $x_1-x_2 \neq 0$ next
 et $x_1 = 1$ $J=0$ on doit avoir $\begin{cases} x_2 = 1 = x_1 \\ x_3 = -1 \end{cases}, J=0$

(déjà traité)

en $\bar{n} = (1/3, 1/3, 1/3)$, $\bar{\lambda} = -8/3$

$$\nabla^2 \mathcal{L}(\bar{n}, \bar{\lambda}) = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 2 \\ 2 & 6 & 2 \\ 2 & 2 & 6 \end{bmatrix}$$

diag $\gg 0$ et dominante
strictes
($6 > 4$)

\Rightarrow définie positive sur \mathbb{R}^3

donc a fortiori sur $\mathcal{Z}_L(\bar{n}, \bar{\lambda})$

$\Rightarrow (1/3, 1/3, 1/3)$ est un min local strict

Exo 5

mardi 6 octobre 2020
10:01



▷ Exercice 5. Soit le problème d'optimisation

$$\begin{cases} \min f(x) = \frac{1}{2} \|x - a\|^2 \\ x \in \mathbb{R}^n \\ \sum_{i=1}^n x_i = 1 \\ x \geq 0 \end{cases}$$

avec $a = (1, \dots, 1)$.

5.1. Montrer qu'on a existence et unicité.

5.2. Caractériser la solution.



$$\sum x_i = 1 \Leftrightarrow \langle b, x \rangle = 1 \quad \text{avec } b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Hyperplan \perp à b qui passe $\frac{b}{\|b\|^2}$

• le domaine \mathcal{C} est fermé borné dans \mathbb{R}^n .

en effet: $0 \leq x_i \leq 1 \quad \forall i$

(le caractère fermé étant trivial)

$\mathcal{C} \neq \emptyset$ est compact dans \mathbb{R}^n , et f continue (\mathcal{C}^{∞})
sur \mathcal{C} admet un min global
(et un max global aussi)

• Unicité: le domaine \mathcal{C} \cap du 1^{er} quadrant positif
et d'un Hyperplan affine est
convexe dans \mathbb{R}^n

et $\forall x \in \mathcal{C} \quad \nabla f(x) = I_n$ (def pos)

d'où f strictement convexe sur le convexe \mathcal{C} .

et le min global est unique.

• HOC: toutes les contraintes étant affines.

HOC est automatiquement
validée.

• la CNL sera alors une CNS de min global.



avec des contraintes d'inégalité: mettre en 1^{er} le pb
sous forme canonique.

$$\min \quad \frac{1}{2} \|x - a\|_2^2$$

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R}^n \text{ tq } \begin{cases} \sum_{i=1}^n x_i - 1 = 0 \\ -x_1 \leq 0 \\ \vdots \\ -x_n \leq 0 \end{cases} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(x, \lambda, \mu) &= \frac{1}{2} \|x - a\|_2^2 + \lambda(b, x) - 1 + \sum_{i=1}^n \mu_i(-x_i) \\ x \in \mathbb{R}^n, \lambda \in \mathbb{R}, \mu \in (\mathbb{R}^+)^n \end{aligned}$$

$$\text{KKT (CNS)} \begin{cases} x - a + \lambda b - \mu = 0 \\ \sum x_i = 1 \\ x_i \geq 0 \quad \forall i \\ \mu_i \geq 0 \quad \forall i \\ \mu_i(-x_i) = 0 \quad \forall i \end{cases}$$

ce pb n'a qu'une solution

1 seule configuration possible dans l'arbre des choix entre les contraintes saturées ou pas

si $a = b - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ on peut (c.f. le dessin)

faire l'hypothèse que $x_i > 0 \quad \forall i$, et $\mu_i = 0 \quad \forall i$
on trouve bien une solution avec $x_i = 1/n \quad \forall i$
 $\mu_i = 0 \quad \forall i$
et $\lambda = 1 - 1/n$

Pour le pb du max de f sur \mathcal{C} compact :
on écrit le Lagrangien après avoir mis le pb sous
forme canonique :
$$\begin{cases} \max_x -f(x) \\ x / -x_i \leq 0 \quad \forall i \\ \text{et } \sum x_i = 1 \end{cases}$$

(HAC tj ok)

KKT devient :

$$\begin{cases} -(x-a) + \lambda b - \mu = 0 \\ \sum b_i x_i = 1 \\ x_i \geq 0 \quad \forall i \\ \text{et } \mu_i \geq 0 \quad \forall i ; \mu_i(-x_i) = 0 \quad \forall i \end{cases}$$

on n'a plus la garantie de l'unicité (car $-f$ n'est pas convexe) sur le convexe \mathcal{C} .

Ceci dit, il y a une (ou plusieurs) solutions au système KKT -

Par contre, si on regarde les CN2
1.1. ...

on doit vérifier :

$$\langle \nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) h, h \rangle \geq 0 \quad \forall h \in \mathcal{Z}_L(\bar{x}, e) \quad \text{CN2}$$

Si on note $\mathcal{I}(\bar{x}) = \{ \text{indices } i \in \{1, \dots, n\}, \text{ tq } -x_i = 0 \text{ (contrainte saturée)} \}$
 au pt \bar{x}

$$\mathcal{Z}_L(\bar{x}, e) = \left\{ h \text{ tq } \begin{array}{l} h \perp (e_i) \text{ (} i \in \mathcal{I}(\bar{x}) \text{)} \\ \text{et } h \perp b \end{array} \right\}$$

Ici on est dans un cas très particulier car

$$\nabla_{xx}^2 \mathcal{L}(\bar{x}, \bar{\lambda}, \bar{\mu}) = -I_n \text{ défine négative sur } \mathbb{R}^n$$

et pour que la CN2 puisse être valide (en \bar{x} solution qui existe !)

il faut nécessairement que $\mathcal{Z}_L(\bar{x}, e) = \{0\}$

seule possibilité pour que $h^T (-I_n) h = -\|h\|^2 \geq 0$.

et il faut donc satisfaire tous les ddL au voisinage de \bar{x}
 c'ad que on a au total n contraintes d'égalité

$$\Rightarrow \text{card}(\mathcal{I}(\bar{x})) = n-1 \quad \oplus \text{ la contrainte } \sum b_i x_i = 1$$

la on les solutions sont donc nécessairement sur

un sommet du simplexe \mathcal{C} .

$$\begin{cases} \sum b_i x_i = 1 \\ \forall j \neq k \quad x_j = 0 \\ \text{et } x_k = 1 \text{ pour un } k \text{ donné} \end{cases}$$

o Pour $a = b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ - tous les sommets $\bar{x} = e_k \quad k = 1, \dots, n$
 sont solution du PB du max.

En effet, on cherche à résoudre : (par ex $x_1 = 1, x_2 = x_3 = \dots = x_n = 0$)

$$-\left(e_1 - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{pmatrix} = 0 \quad \begin{array}{l} \mu_2 \geq 0 \\ \vdots \\ \mu_n \geq 0 \end{array}$$

$$\begin{cases} -1 + 1 + \lambda = 0 & \Rightarrow \lambda = 0 \\ 1 + \cancel{\lambda} - \mu_j = 0 & j = 2, \dots, n \\ \mu_j = 1 & j = 2, \dots, n \end{cases}$$