

Etude Whorwell PJ. et al.

(Am J Gastroenterol. 2006)

Résultats : 2) Evaluation des scores de ballonnement, de sensation d'évacuation incomplète, d'émissions des gaz, de satisfaction du transit ainsi que du score composite :

Scores moyens MC ± ET (modification par rapport à la valeur de réf.)— <i>B. infantis</i> versus placebo						
	Placebo	BIFIDO 1 × 10 ⁶	<i>p</i> versus placebo	BIFIDO 1 × 10 ⁸	<i>p</i> versus placebo	BIFIDO 1 × 10 ¹⁰
Taille de la base statistique	92	90		90		90
Douleur/inconfort abdominal*	1,73 ± 0,10 (-0,58)	1,89 ± 0,10 (-0,42)	0,24	1,43 ± 0,10 (-0,89)	<0,03	1,84 ± 0,10 (-0,47)
Ballonnements/distension*	1,96 ± 0,10 (-0,44)	2,04 ± 0,10 (-0,36)	0,54	1,70 ± 0,10 (-0,71)	<0,05	2,07 ± 0,10 (-0,34)
Impériosité*	1,68 ± 0,09 (-0,34)	1,81 ± 0,09 (-0,21)	0,29	1,48 ± 0,09 (-0,54)	0,09	1,63 ± 0,09 (-0,38)
Évacuation incomplète*	1,73 ± 0,10 (-0,25)	1,67 ± 0,10 (-0,30)	0,69	1,43 ± 0,10 (-0,54)	<0,04	1,86 ± 0,10 (-0,12)
Dyschésie*	1,63 ± 0,09 (-0,07)	1,46 ± 0,09 (-0,24)	0,19	1,32 ± 0,09 (-0,38)	<0,02	1,65 ± 0,09 (-0,05)
Flatulences*	2,04 ± 0,09 (-0,30)	2,13 ± 0,09 (-0,21)	0,47	1,80 ± 0,09 (-0,54)	<0,04	2,10 ± 0,09 (-0,24)
Satisfaction du transit†	2,21 ± 0,09 (-0,26)	2,17 ± 0,09 (-0,29)	0,75	1,92 ± 0,09 (-0,55)	<0,02	2,32 ± 0,09 (-0,15)
Évaluation globale des symptômes SII *	2,09 ± 0,10 (-0,42)	2,15 ± 0,09 (-0,36)	0,63	1,76 ± 0,09 (-0,76)	<0,01	2,13 ± 0,09 (-0,38)
Score composite‡	5,91 ± 0,26 (-1,27)	6,09 ± 0,25 (-1,09)	0,59	5,06 ± 0,25 (-2,12)	<0,02	6,22 ± 0,26 (-0,96)
Évaluation globale du soulagement de la douleur §	51,6 ± 6,1	43,2 ± 6,1	0,29	58,8 ± 6,0	0,36	39,1 ± 6,0
Évaluation globale du soulagement du SII §	42,0 ± 6,4	44,0 ± 6,4	0,80	62,3 ± 6,2	<0,02	36,9 ± 6,1

Amélioration significative (vs. placebo) à S4 des scores de ballonnement, de sensation d'évacuation incomplète, d'émissions de gaz, de satisfaction du transit ainsi que du score composite uniquement avec le dosage de 1 x 10⁸ UFC/ml.

Document de formation à l'usage exclusif des délégués. Reproduction totale ou partielle interdite.

Ne doit pas être montré à un professionnel de santé