

Forelesning 7

PREDIKATLOGIKK

- Kvantorer og predikater $\forall x \exists y P(x, y)$
- Rekkefølge på kvantorer $\forall x \exists y P(x, y) \not\equiv \exists y \forall x P(x, y)$
- Kvantorer og negasjoner $\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$
- Kvantorer og konnektiver $\exists x (P(x) \vee Q(x)) \stackrel{?}{\Leftrightarrow} \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$

Predikatlogikk

Så langt

- Utsagn P, Q, R, \dots
- Konnektiver $\rightarrow, \vee, \wedge, \neg$
- Formler $(P \wedge Q) \rightarrow (R \vee \neg S)$

Husk: En relasjon R på en mengde A er en delmengde av $A \times A$.

R er refleksiv hvis $\langle x, x \rangle \in R$ for alle $x \in A$.

R er ikke symmetrisk hvis det finnes et par $\langle x, y \rangle \in R$ slik at $\langle y, x \rangle \notin R$.

I predikatlogikk utvider vi utsagnslogikk med blant annet tegnene:

\forall : "for alle"

\exists : "det eksisterer"/"det finnes"

} Disse kalles
"kvantorer"

$\forall \leftarrow$ "universalkvantoren", $\exists \leftarrow$ "eksistenskvantoren"

Litt notasjon

"For alle $x \in A$ " skriver vi nå som " $\forall x \in A$ "

"Det finnes en $x \in A$ slik at..." skriver vi som " $\exists x \in A$ ".

Eksempel

"Alle naturlige tall er større enn eller lik null"
skrives som $\forall x \in \mathbb{N} (x \geq 0)$

"Det finnes et reelt tall x slik at $x^2 = 2$ "
skrives som $\exists x \in \mathbb{R} (x^2 = 2)$

Ofte brukes symbolet $\exists!$ for "det finnes nøyaktig én"

Eksempel

$\exists! n \in \mathbb{N} (n+3=7)$

↑ "det finnes nøyaktig ett naturlig tall n
slik at $n+3=7$ "

Hvordan bruke \forall og \exists til å utvide utsagnslogikk til predikatlogikk?

Se på setningen $P = "x^2 \text{ er et heltall}"$

Er dette et utsagn?

I så fall må setningen være sann eller usann:

Ser vi på x som en ukjent, er svaret "nei".

Ser vi på en bestemt verdi for x , si $x=2$,

så er P et utsagn.

Med andre ord:

La $P(x) := "x^2 \text{ er et heltall}"$ ↖ "er definert som"

Da er $P(x)$ ikke et utsagn, men $P(2)$ er det:
" 2^2 er et heltall" (som for øvrig er sant)

Spørsmål: Er $P(x)$ sann for alle x ?

Svar: Tja. Kommer an på hvilke verdier for x
vi tillater.

Eksempel

$P(3) \leftarrow$ Sann

$P(1/4) \leftarrow$ Usann

$P(\odot) \leftarrow$ Gir ikke mening

Vi velger alltid et univers å trekke verdiene fra.

La universet være \mathbb{Z} . Da er $\forall x P(x)$ sann.
Hvis universet er \mathbb{R} , så er $\forall x P(x)$ usann.

Merk: $P(x)$ har en fri variabel, mens

$\forall x P(x)$ har ingen frie variabler

↑ Dette er et utsagn!

Definisjon

Et uttrykk som blir et utsagn så fort et gitt antall variabler er bestemt, kalles et predikat

Et predikat med k frie variabler, kalles et predikat av aritet k .

Eksempel

La $Q(x,y) := (x^2 = y)$ og la universet være \mathbb{N} .

Da er f.eks. $Q(3,9)$ sann og $Q(9,3)$ er usann.

- $\exists x Q(x,4)$ er et utsagn (som er sant, la $x=2$)
 \uparrow "det finnes en $x \in \mathbb{N}$ slik at $x^2=4$ "

- $\exists x Q(x,y)$ er et predikat av aritet 1.

- $\forall y \exists x Q(x,y)$ er et utsagn (usant, la f.eks. $y=2$)
 \uparrow "for alle y , finnes en x slik at $x^2=y$ "

Rækkefølge på kvantorer

La $P(x,y)$ være et predikat av aritet 2, over et univers U .

La oss se på utsagnene $\forall x \exists y P(x,y)$ og $\exists y \forall x P(x,y)$.
Er disse ekvivalente?

Eksempel (for å illustrere)

La $P(x,y) :=$ "student x fikk karakter y på eksamen"

$\forall x \exists y P(x,y)$: "for alle studenter x , så finnes en karakter y slik at student x fikk karakter y på eksamen"

$\exists y \forall x P(x,y)$: "det finnes en karakter y som alle fikk på eksamen"

Ikke det samme! Merk at $\exists y \forall x P(x,y) \rightarrow \forall x \exists y P(x,y)$

Kvantorer og negasjoner

La $P(x)$ være et predikat av aritet 1 over universet $U = \{1, 2, 3, 4\}$.

Da er $P(1), P(2), P(3)$ og $P(4)$ fire utsagn.

$\exists x P(x)$ betyr at (minst) ett av utsagnene er sanne, altså er $P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4)$ sann.

Hvordan tolker vi da $\neg(\exists x P(x))$?

Jo, de må:

$\neg(P(1) \vee P(2) \vee P(3) \vee P(4))$ være sann.

Det er det samme som (De Morgens lov)

$$\neg P(1) \wedge \neg P(2) \wedge \neg P(3) \wedge \neg P(4)$$

Med andre ord, for alle x er $P(x)$ usann, eller $\forall x \neg P(x)$.

Teorem

La P være et predikat av aritet 1.

Da har vi:

$$\neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \forall x \neg P(x)$$

$$\neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \exists x \neg P(x)$$

Koroller (konsekvens)

\exists kan skrives med \neg og \forall

\forall kan skrives med \neg og \exists

$$\forall x P(x) \Leftrightarrow \neg \neg \forall x P(x) \Leftrightarrow \neg (\exists \neg P(x))$$

$$\exists x P(x) \Leftrightarrow \neg \neg \exists x P(x) \Leftrightarrow \neg (\forall x \neg P(x))$$

Kvantorer og konnektivene \wedge og \vee

Vi skal se på hvordan \exists og \forall distribuerer over \wedge og \vee .

Med andre ord kan vi si noe om sammenhengen mellom f.eks.

$$\textcircled{1} \quad \exists x(P(x) \vee Q(x)) \text{ og } \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$$

$$\textcircled{2} \quad \exists x(P(x) \wedge Q(x)) \text{ og } \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

La $P(x) := (x^2 = 4)$ og $Q(x) := (x^2 = 9)$ og la $U = \mathbb{R}$.

$\exists x(P(x) \vee Q(x))$ vil si:

"det finnes $x \in \mathbb{R}$ s.e. $x^2 = 4$ eller $x^2 = 9$ " **SANT**

$\exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$ vil si:

"det finnes $x \in \mathbb{R}$ s.e. $x^2 = 4$ eller det finnes $x \in \mathbb{R}$ s.e. $x^2 = 9$ " **SANT**

$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$ vil si:

"det finnes $x \in \mathbb{R}$ s.e. $x^2 = 4$ og $x^2 = 9$ " **USANT!**

$\exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$ vil si:

"det finnes $x \in \mathbb{R}$ s.e. $x^2 = 4$ og det finnes $x \in \mathbb{R}$ s.e. $x^2 = 9$ " **SANT**

Summe summerum:

$$\exists x(P(x) \vee Q(x)) \Leftrightarrow \exists x P(x) \vee \exists x Q(x)$$

$$\exists x(P(x) \wedge Q(x)) \not\Leftrightarrow \exists x P(x) \wedge \exists x Q(x)$$

For \forall :

$$\forall x(P(x) \vee Q(x)) \not\Leftrightarrow \forall x P(x) \vee \forall x Q(x)$$

$$\forall x(P(x) \wedge Q(x)) \Leftrightarrow \forall x P(x) \wedge \forall x Q(x)$$