

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Moda para Dados Agrupados por Valor

Vimos em aula anterior que a moda é o termo que mais se repete, ou seja, aquele que apresenta maior frequência simples. Se o exercício fornecer frequências acumuladas, temos sempre que lembrar de obter as correspondentes frequências simples.

Exemplo

Considere a seguinte tabela:

Valor observado	Frequência relativa acumulada
10	0,1
15	0,2
18	0,5
20	0,7
21	1

Calcule a moda para os dados agrupados acima representados.

Resolução:

Foram fornecidas frequências acumuladas. Para calcular média e moda, sempre trabalhamos com frequências simples (relativas ou absolutas, tanto faz). Encontremos então as frequências relativas simples correspondentes.

Valor observado	Memória de cálculo	Frequência relativa simples	Frequência relativa acumulada
10	$= 0,1$	0,1	0,1
15	$= 0,2 - 0,1 = 0,1$	0,1	0,2
18	$= 0,5 - 0,2 = 0,3$	0,3	0,5
20	$= 0,7 - 0,5 = 0,2$	0,2	0,7
21	$= 1 - 0,7 = 0,3$	0,3	1

Para encontrar a moda, basta tomarmos o valor que corresponde à maior frequência simples. No caso, as maiores frequências são iguais a 0,3. Há duas modas. O conjunto é bimodal. As modas são 18 e 21.

Texto: Professor(a) Vítor Menezes Santana

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960