
Printed by: aljusti@ufpr.br. Printing is for personal, private use only. No part of this book may be reproduced or transmitted without publisher's prior permission. Violators will be prosecuted.

3º caso — Tabela de Czerny — lajes com dois lados opostos engastados — T-9



Importante
ℓ_y é a direção com dois (2) engastes

$$0{,}5 \leq \varepsilon = \frac{\ell_y}{\ell_x} \leq 2{,}0$$

ε=ℓy/ℓx	m_x	m_y	n_x	v_1	v_2	w
0,50	169,5	50,0	33,7	0,216	0,144	157,947
0,55	123,5	47,4	28,6	0,238	0,144	122,514
0,60	95,2	46,1	25,0	0,259	0,144	99,306
0,65	76,9	45,8	22,2	0,278	0,144	83,364
0,70	64,5	46,2	20,1	0,299	0,144	72,058
0,75	55,6	47,4	18,5	0,308	0,144	63,848
0,80	49,3	49,4	17,3	0,320	0,144	57,580
0,85	44,4	52,0	16,3	0,330	0,144	52,774
0,90	40,5	55,1	15,5	0,340	0,144	48,851
0,95	37,5	58,9	14,8	0,348	0,144	45,811
1,00	35,1	61,7	14,3	0,356	0,144	43,478
1,10	31,7	67,2	13,5	0,369	0,144	39,942
1,20	29,4	71,6	13,0	0,380	0,144	37,384
1,30	27,8	74,0	12,6	0,389	0,144	35,727
1,40	26,7	75,0	12,3	0,397	0,144	34,708
1,50	25,8	75,3	12,3	0,404	0,144	34,057
1,60	25,2	76,6	12,1	0,410	0,144	3,171
1,70	24,7	76,9	12,0	0,415	0,144	3,102
1,80	24,4	77,0	12,0	0,420	0,144	33,033
1,90	24,2	77,0	12,0	0,424	0,144	32,964
2,00	24,1	77,0	12,0	0,428	0,144	32,895

$$M_x = q \cdot \frac{\ell_x^2}{m_x} \qquad M_y = q \cdot \frac{\ell_x^2}{m_y}$$

DO NOT COPY aljusti@ufpr.br