
Printed by: aljusti@ufpr.br. Printing is for personal, private use only. No part of this book may be reproduced or transmitted without publisher's prior permission. Violators will be prosecuted.

6º caso — lajes com três lados engastados — T-9



Importante
ℓ_y é o lado com dois (2) engastes

$\varepsilon = \ell y/\ell x$	m_x	m_y	n_x	n_y	v_1	v_2	v_3	w
0,50	400,0	74,8	49,3	35,2	0,125	0,159	0,217	296,296
0,55	250,0	66,9	40,5	30,7	0,131	0,174	0,227	218.564
0,60	175,4	61,5	34,4	27,2	0,136	0,190	0,236	167,740
0,65	133,3	57,7	29,8	24,6	0,140	0,206	0,242	133,065
0,70	105,3	55,3	26,2	22,5	0,143	0,222	0,247	109,030
0,75	85,5	54,2	23,4	21,0	0,144	0,238	0,249	91,875
0,80	70,9	53,9	21,2	20,0	0,144	0,254	0,250	79,525
0,85	61,3	54,3	19,5	19,2	0,144	0,268	0,250	70,430
0,90	54,3	55,4	18,1	18,7	0,144	0,281	0,250	63,243
0,95	48,5	55,7	17,1	18,4	0,144	0,293	0,250	57,371
1,00	44,1	55,9	16,2	18,3	0,144	0,303	0,250	53,191
1,10	37,9	60,3	14,8	17,7	0,144	0,321	0,250	47,104
1,20	33,8	66,2	13,9	17,5	0,144	0,336	0,250	42,677
1,30	31,0	69,0	13,2	17,5	0,144	0,348	0,250	39,787
1,40	29,0	71,9	12,8	17,5	0,144	0,359	0,250	37,187
1,50	27,6	75,2	12,5	17,5	0,144	0,369	0,250	35,915
1,60	26,6	78,7	12,3	17,5	0,144	0,377	0,250	34,679
1,70	25,8	82,9	12,2	17,5	0,144	0,384	0,250	34,209
1,80	25,3	86,9	12,1	17,5	0,144	0,391	0,250	34,021
1,90	24,8	91,5	12,0	17,5	0,144	0,396	0,250	33,362
2,00	24,5	96,2	12	17,5	0,144	0,402	0,250	32,895

$$M_x = q \cdot \frac{\ell_x^2}{m_x} \qquad M_y = q \cdot \frac{\ell_x^2}{m_y}$$

DO NOT COPY aljusti@ufpr.br