

임산부 맞춤 영양 추천 결과

입력 정보

임신 주차: 9주

임신 단계: 초기

증상: 입덧

식습관: 채소·과일 섭취가 부족함

복용 정보: 엽산제를 복용하고 있습니다.

추천 영양 성분 TOP 3

1. 수분

추천 근거: 입덧 증상과 관련된 추천 영양소입니다

관련 입력: 입덧

2. 비타민 C

추천 근거: 입덧 증상과 관련된 추천 영양소입니다

관련 입력: 입덧

추천 이유

현재 임신 9주차로 입덧 증상이 있으신 상황을 고려하여 수분과 비타민 C를 추천드립니다. 입덧은 임신 초기 임산부의 70~80%가 경험하는 흔한 증상으로, 메스꺼움과 구토로 인해 수분이 부족해지기 쉬우므로 물을 충분히 마시는 것이 도움이 될 수 있습니다. 또한 입덧 증상이 있을 때는 한 번에 많은 양을 드시기보다 하루 4~6회 소량씩 자주 드시는 것이 증상 완화에 도움이 될 수 있습니다. 딸기처럼 비타민 C가 풍부한 새콤달콤한 식품은 입덧이 있는 임산부에게 도움이 될 수 있으며, 채소와 과일 섭취가 부족한 식습관을 보완하는 데에도 좋은 선택이 될 수 있습니다. 현재 복용 중이신 엽산제는 중복 섭취 방지를 위해 이번 추천에서 제외되었으며, 증상이 심하거나 영양 보충제 추가를 고려하실 때는 의사나 약사와 상담하시는 것을 권장드립니다.

주의사항

- 입덧 증상 완화를 위해 냄새가 심하거나 기름진 음식은 피하고, 한 번에 많은 양을 먹지 않고 하루 4~6번 조금씩 자주 드시며 물을 충분히 마시는 것이 도움이 될 수 있습니다.
- 현재 엽산제를 복용 중이시므로 엽산은 추가 섭취를 권장하지 않으며, 현재 복용량이 적절한지 여부는 의사 또는 약사와 상담하여 확인하시기 바랍니다.

주의사항 근거

- 입덧이 심할 경우 소량씩 자주 식사하는 것이 증상 완화에 도움이 되므로 한 번에 많은 양을 섭취하는 습관을 개선해야 합니다. 입덧은 임신 초기 임산부의 70~80%가 경험하는 흔한 증상입니다. 보통 임신 4~8주경 나타나며, 메스꺼움과 구토를 동반합니다.

- 해당 없음 딸기는 태아와 임산부에게 필요한 엽산과 비타민 C가 풍부할 뿐 아니라, 새콤달콤한 맛으로 입덧이 있는 임산부에게 도움이 됩니다.
- 초기 1 13 lifestyle_guidance 입덧과 구토를 완화하기 위해 한 번에 많은 양을 먹지 않고 하루에 4~6번 조금씩 자주 먹는 것이 권장됩니다. 입덧은 임신 초기에 흔한 메스꺼움과 구토 증상입니다. 호르몬 변화와 심리적 영향으로 임산부의 70~80%가 경험하지만, 태아에게 해를 끼치지 않습니다.
- 냄새가 심하거나 기름진 음식은 입덧 증상을 악화시킬 수 있으므로 자극적인 음식 섭취를 줄여야 합니다. 냄새가 심하거나 기름진 음식은 증상을 악화시킬 수 있습니다.
- 물을 충분히 마셔야 합니다.
- 사용자 복용 정보에 엽산이 포함되어 있어 엽산 재추천을 방지했습니다.

참고 자료

- 국가건강정보포털(질병관리청)_정상임신관리(임신의 진단과 관리)
- 국가건강정보포털(질병관리청)_식이영양(임산부)
- 공공데이터포털(MFDS)_의약품개요정보(e약은요)
- 공공데이터포털(MFDS)_의약품 제품 허가정보
- 공공데이터포털(MFDS)_건강기능식품 품목제조 신고사항 현황