

3. 順序

2023 秋期「哲学者のための数学」授業資料（大塚淳）

ver. 2023 年 10 月 4 日

1 構造

前章までで、集合論の（ほんの）基礎的なところを見た。現代数学において、集合はあらゆる理論的構造の「素材」としての役割を担っている。例えば線形代数や解析学やリー代数や確率論や・・・あらゆる数学理論は、「かくかくしかじかの性質を持った集合」と定義できるのである^{*1}。つまり語弊を恐れずにいえば、数学の理論とは、何らかの構造を持った集合である。実際、この章以下で我々は、ブール代数や群、位相などを、特定の構造を持つ集合として導入する。集合が持つそうした構造は、一般に**公理** (axioms) の形で表される。まず手始めに、一番簡単な、順序構造を集合に入れるところから考えてみよう。

2 さまざまな順序

順序とは、特殊な条件（公理）を満たす 2 項関係である。その条件の付け加え方によって、前順序／半順序／全順序という三つの順序が得られる。以下見るように、後の方ほどより要件が多く、より「厳しい」順序になってくる。

2.1 前順序

同値類とは反射的、対称的かつ推移的な関係だったことを思い出そう（2 章 3 節）。この条件から対称性を落とすと、0 章でも見た**前順序**ないし**擬順序** (preorder) が得られる。きちんと定義すると以下のようになる。

^{*1} こうした集合論に根ざした数学の統一的理解は、20 世紀のニコラ・ブルバキ (Nicolas Bourbaki) の仕事に多くを負っている。ブルバキは集合論をいわば数学の共通言語に見立て、各数学理論を集合論の枠内で再構築した。ちなみにブルバキはペンネームで、実際は複数の数学者の集まり（集合！）である。

前順序

集合 X 上の 2 項関係 \preceq が、すべての $x, y, z \in X$ について以下を満たすとき、**前順序** ないし **擬順序** といわれる。

O1 反射性: $x \preceq x$

O2 推移性: $x \preceq y$ かつ $y \preceq z$ ならば $x \preceq z$

また組 $\langle X, \preceq \rangle$ を、**前順序集合** という。

これは我々が今後多数見ていくことになる数学的構造の最初の例である。一般に数学的構造は、元となる集合（この場合 X ）と、その上に定義された関係や演算からなる。そして公理は、それがどのような関係・演算かを定めることによって、数学的構造を特徴づける。ここでは反射性 (O1) と推移性 (O2) という 2 つの公理が、関係 \preceq および前順序集合を特徴づけている。

序章でも述べたように、数学的構造が与えられたら、その例を探そう。前順序の例とはつまり、公理 O1 と O2 を満たすもののことだ。例えば $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ は前順序である。というのも、

1. すべての整数 $x \in \mathbb{N}$ について、 $x \leq x$ が当然なりたつ。
2. すべての整数 $x, y, z \in \mathbb{N}$ について、 $x \leq y$ かつ $y \leq z$ ならば $x \leq z$ なので、公理 O2 も成立する。

以上から、 $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ が前順序であることが示された。この例はあまりにも自明だが、実際にある対象を数学的構造でモデリングするためには、その公理が成立することを確認するのが第一のステップである。

練習問題 2.1

1. 冪集合と包含関係の組 $\langle \mathcal{P}(X), \subset \rangle$ が前順序集合であることを示せ。
2. 「 $=$ 」を等号とする。 $\langle \mathbb{N}, = \rangle$ は前順序だろうか。
3. 0 章で触れた関係「 y は x と同等かそれ以上に完全である」は、前順序だろうか。
4. 関係「 y は x の子孫である」は前順序だろうか。
5. 前順序であるような関係を数学以外から探し、それが前順序であることを示せ。

ちなみに問題 2 の答えは Yes である。というのも、「 $=$ 」は同値類であり、反射性・対称性・推移性を満たすので、当然 O1 と O2 を満たす。このように、一般的な順序の直感にはそぐわなくても、順序の公理を満たすようなものは多数ありえる。

事例 2.1

X を命題論理の論理式の集合とし、任意の命題 $p, q \in X$ について「 p から q が証明される」を $p \Rightarrow q$ と表すことにすると、 $\langle X, \Rightarrow \rangle$ は前順序をなす。

事例 2.2 (Supervenience)

X を個物の集合、 Y を性質の集合とし、 $f_1, f_2 : X \rightarrow Y$ を個物に性質を割り当てる 2 つの関数とする（これを「性質関数」と呼ぼう）。例えば X を（ある時点の）人の集合としたら、 f_1 はその人に心的状態を割り当て、 f_2 は身体状態を割り当てる、と考えても良いかもしれない。 f_1 が f_2 に付随 (supervene) するとは、 f_1 における差異が必ず f_2 における差異を含

意すること、つまり任意の $x, x' \in X$ について $f_1(x) \neq f_1(x')$ なら $f_2(x) \neq f_2(x')$ が成立することである。

すべての性質関数の集合を Y^X とすると、付随は Y^X 上の前順序を定める。これを示そう。 $f, g, h \in Y^X$ を任意の性質関数とすると

1. すべての $x \in X$ につき、 $f(x) \neq f(x)$ なら当然 $f(x) \neq f(x)$ 。よって任意の性質関数 f はそれ自身に付随する。
2. f は g に付随し、 g は h に付随するとする。するとすべての $x \in X$ につき、 $f(x) \neq f(x)$ なら $g(x) \neq g(x)$ 、そしてさらに $h(x) \neq h(x)$ 。よって f は h に付随する。

以上より $O1$ と $O2$ が示されたので、付随性は前順序である。

2.2 半順序

前順序はサイクルを含みうる。つまり異なる $x \neq y$ に対し、 $x \preceq y$ かつ $y \preceq x$ の双方が成り立つ、ということが可能である。しかし次で定義する半順序では、こうしたサイクルは除外される。

半順序

前順序 \preceq がさらに以下を満たす時、**半順序** (partial order) といわれる。

$O3$ 反対称性: $\forall x, y \in X, x \preceq y$ かつ $y \preceq x$ ならば $x = y$

また \preceq が X 上の半順序であるとき、組 $\langle X, \preceq \rangle$ を**半順序集合** (partially ordered set または縮めて poset) という。

実は上で前順序の例として見た $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ や $\langle \mathcal{P}(X), \subset \rangle$ などは、半順序でもある。実際、自然数 $x, y \in \mathbb{N}$ に対し $x \leq y$ かつ $y \leq x$ なら $x = y$ であるし、集合 X の部分集合 A, B に対し $A \subset B$ かつ $B \subset A$ なら $A = B$ である。

練習問題 2.2

1. 関係「 y は x と同等かそれ以上に完全である」は半順序だろうか。
2. 事例 2.2 で見た付随性は半順序だろうか。
3. 正の整数 $x, y \in \mathbb{N}^+$ において、「 x は y を割り切る」という関係は半順序であることを示せ。
4. 数学以外の半順序の例をあげよ。

事例 2.3

形式存在論で重要な関係に「 \sim は...である」という is-a relationship がある。たとえば「人間は哺乳類である」「哺乳類は動物である」を2項述語「 $-$ 」を用い、人間 $-$ 哺乳類、哺乳類 $-$ 動物、などと書くことができる。この「である関係」は半順序である（確認せよ）。こうした階層的な存在構造は、古くからポルピュリオスの樹 (Porphyrian tree) として示されてきた (図 1)。




図1 ポルピュリオスの樹

2.3 全順序

ポルピュリオスの樹に見られるように、一般に半順序はすべてが一行に並んでいるとは限らない。よって任意のペア x, y について、 $x \preceq y$ でも $y \preceq x$ ない、つまり両者は比較不可能、ということがありえる。これに対し、すべてが一行に並んでいて互いに比較可能なものを、**全順序** (total order) という。

全順序

半順序 \preceq がさらに以下を満たす時、**全順序** (total order) といわれる。

O4 完備性： $\forall x, y \in X, x \preceq y$ または $y \preceq x$ 。

簡単な例としては、 $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ は全順序である。一方、 X が2つ以上の元を持つときの $\langle \mathcal{P}(X), \subset \rangle$ はそうではない。

練習問題 2.3

1. 数学以外の全順序集合の例をあげよ。
2. 事例 2.2 の付随性は全順序だろうか。

事例 2.4 (測定理論)

我々は日々、色々なものを数字で図る（身長、値段、IQ、幸福度・・・）。しかしなぜそれが可能なのだろうか？測定理論 (Theory of measurement) は、事物の集合が数字で図られるために、その集合が満たしていなければならない条件を探る学問分野である。^{*2} その中で最も基本的な性質が、全順序性である。しかし、測りたい事物や出来事が全順序性を満たしていないことはしばしばある。そのような事例を考えてみよう。

3 順序の中の元

集合においては、すべての元は単なる元であり、いわば「皆平等」であった。しかし順序においては、ある元は他の元より小さかったり大きかったり、いわば文字通り、元の上に序列が存在する。そのうち特別な地位 (!) にあるものは、名前がついている。ここでは半順序に注

目し、それらの定義を少し見てみよう（ちなみに全順序も半順序なので、これらは全順序にも妥当することに注意）。

$\langle X, \preceq \rangle$ を半順序集合, $A \subset X$ としたとき：

- $a \in A$ が A の**最大元**であるとは, $\forall x \in A (x \preceq a)$ が成り立つこと. 逆に**最小元**であるとは, $\forall x \in A (a \preceq x)$ が成り立つこと. 最大/最小元は存在するとは限らないが, あれば一つしかない.
- $b \in X$ が A の**上界** (upper bound) であるとは, $\forall x \in A (x \preceq b)$ が成り立つこと. A に上界が存在するとき, A は**上に有界**であるという. 最大元と違い, A の上界は A に含まれている必要がないことに注意. 同様の仕方でも, A の下界 (lower bound) が定義される. A が上に有界かつ下に有界のとき, A は有界であるという.
- A の上界は複数ありえる. 例えばもし b が上界で $b \preceq c$ なら c も上界である. でもその中で一番小さい, いわば「スレスレの上界」があれば, これを**上限**ないし**最小上界** (least upper bound) という. つまり A の上限とは, A の上界の集合 B の最小元 (あれば) である. 上界が存在しても (つまり $B \neq \emptyset$ でも) 上限は存在しないこともある. 同様に, A の最大下界を**下限** (greatest lower bound) という.

練習問題 3.1

3つの元からなる集合 $X = \{x, y, z\}$ として, 集合包含関係の半順序 $\langle \mathcal{P}(X), \subset \rangle$ を考える. $A = \{\{x\}, \{y\}\}, B = \{\{x\}, \{y\}, \{x, y\}\}, C = \{\{x, y\}, \{z\}\}$ とする.

1. A, B, C の最大元をそれぞれ答えよ.
2. A, B, C の上界をそれぞれ答えよ.
3. A, B, C の上限をそれぞれ答えよ.

この問題に限らず, 順序は図で示したほうがわかりやすいことが多い. $x \preceq y$ であるときに $x \rightarrow y$ と矢印を引いた図を, **ハッセ図** (Hasse diagram) という. 通常ハッセ図では, 見やすさのため推移的な矢印は省略する (例えば $x \preceq y$ かつ $y \preceq z$ では, 単に $x \rightarrow y \rightarrow z$ と書き, $x \rightarrow z$ は省略する). 上の3元集合のハッセ図は次のようになる.




図2 問3.1のハッセ図

練習問題 3.2

正の整数 $x, y \in \mathbb{N}^+$ において, 「 x は y を割り切る」という関係を考える. 任意の正整数 a, b をとってきたとき, その最大限, 上界, 上限はそれぞれなんだろうか.

事例 3.1

順序集合の有界性についての問題は, 哲学で非常によく出くわす. 例えば神の宇宙論的証明

や存在論的証明の議論を順序の概念を用いてモデル化するとどうなるだろうか。

参考 (神の宇宙論的証明) : 存在するあらゆるものは、原因を持つ。しかし時空間は有限であるので、因果の系列は無限に遡ることはできない。よって「原因をもたない原因」ないし「不動の第一動者 (アリストテレス)」としての神が存在する。これは因果順序における最小元の存在の主張だ。ではそれはどのような証明だろうか。

4 単調写像

我々は集合のところで、異なる集合 X, Y 間を「橋渡し」するものとしての関数 $f: X \rightarrow Y$ を見た。同様に、二つの順序 $\langle X, \preceq_X \rangle, \langle Y, \preceq_Y \rangle$ が与えられたとき、前者を後者にマップさせることを考えたい。ただしここで、 \preceq_X, \preceq_Y はそれぞれ集合 X, Y 上に定義された前／半／全順序関係である。

二つの順序の対応として、もととなっている集合 X, Y の間の関数 $f: X \rightarrow Y$ を考える。しかしこの関数が X の順序をめちゃくちゃにしたら、「順序の対応」とはいえない。むしろ X の大小関係が、 Y においてもしっかりと保たれていてほしい。これを数学的には、順序の**構造を保つ写像** (structure-preserving map) という。それは具体的には次で与えられる：

単調写像

関数 $f: X \rightarrow Y$ が次の条件を満たすとき、順序 $\langle X, \preceq_X \rangle, \langle Y, \preceq_Y \rangle$ の間の**単調写像** (monotone map) といわれる

すべての $x, x' \in X$ に対して、 $x \preceq_X x'$ ならば $f(x) \preceq_Y f(x')$ 。

つまり x より x' のほうが大きいなら、それぞれを Y に飛ばした $f(x)$ より $f(x')$ のほうが大きくなっている、ということだ。ここで、左辺は X 上の順序 \preceq_X であるのに対し、右辺は Y 上の順序 \preceq_Y で比較されていることに注意。よって上の条件は、 \preceq_X で定められる X の順序構造が、 Y において \preceq_Y として保たれている、ということを定めている。

事例 4.1

1. 整数 \mathbb{N} を実数 \mathbb{R} に埋め込む関数 $f: x \mapsto x$ を考えると、これは当然 $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle, \langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ の間の単調写像になっている。
2. 整数を 2 倍する関数 $f: x \mapsto 2x$ は、 $\langle \mathbb{N}, \leq \rangle$ とそれ自身の間の単調写像である。
3. 素点 (0~100 点) を評語 (F, D, C, B, A, A+) に換算する成績評価関数は、単調写像である (でないと困る)。

以上はいずれも全順序間の写像であったが、半順序から全順序、のような単調写像も考えることができる。例えば生命の分類体系 (taxonomy) は、図 3 のような半順序をなす。これをそれぞれの分類階級 (種, 属, 科...) に対応させる関数を考えると、これは半順序から全順序への単調写像になっている。単調写像とは、このように二つの順序を横に並べて描いたとき、写像の対応を示す線 (図 3 の点線矢印) が互いにクロスしない、という条件だと理解できる。

事例 4.2 (真理値関数)

事例 2.1 の命題間の証明関係の前順序 $\langle X, \Rightarrow \rangle$ を思い出そう。それとは別に




図3 分類体系の単調写像（この例は Fong & Spivak, 『活躍する圏論』, p. 18 より拝借した）

$\mathbb{B} = \{\text{false}, \text{true}\}$ からなる二元集合上に全順序 $\text{false} \leq \text{true}$ を導入する．命題への真理値割当を関数 $f: X \rightarrow \mathbb{B}$ によって表すとする．この関数はどのようなものでなければならないか．

事例 4.3 (測定理論)

$\langle X, \preceq \rangle$ をなんらかの物の集合 X の間の何らかの全順序であるとする．実数値関数 $\phi: X \rightarrow \mathbb{R}$ が $\langle X, \preceq \rangle$ と $\langle \mathbb{R}, \leq \rangle$ の間の単調写像であるとき、 ϕ を順序尺度 (ordinal scale) という．

順序尺度は、物事の数値測定のうち最も単純なもので、 x_1, x_2, \dots の順番を数値 $\phi(x_1), \phi(x_2), \dots$ で表す．このとき、数値間の大小は X の間の順序を反映しているが、その間隔や比率などには意味がない．なので数値を足したりかけたりすることはできない．これは、ここで使われている道具立てが単に順序集合に過ぎず、足し算や掛け算などの演算を兼ね備えていない、という事実を反映している．

練習問題 4.1

順序尺度の例をあげ、それが単調性を満たしていることを確認せよ．

単調写像は極めて単純な道具立てに思える（単に順序を別の順序にうつしているだけじゃないか！）．しかしここにはすでに、複数の重要な哲学的含意がある．

まず事例 4.2 は、意味論的な含意を示す．意味論とは、統語的表現とその意味、あるいはその真偽値の間の関係である．我々はその間に、なんらかの法則的關係が成り立っていることを期待する．この事例では、命題論理の証明関係と、その真偽値の間の関係性が、単調写像によって捉えられていることに注意しよう．

次に事例 4.3 は、認識論的な含意を示す．というのも測定理論とは、形式化された認識論だからである．それは、ある事物の体系（世界）を、数的表現の体系（記述）へと写し取ることを目指している．その際、我々の記述は世界の構造を写し取ったものであってほしい．順序というのはそうした構造のうちの、単純ではあるが重要なものの一つであり、単調性はその構造が数の構造へとしっかりと写し取られている、ということを保証するものである．つまり大げさにいえば、構造を保つ写像は認識の正しさを保証しているのである（こうした見方は、例えばウィトゲンシュタインの言語の写像理論 (Picture theory of language) に強く現れている）．

我々は今後、様々な数学的構造を見ていくが、その都度、その構造を保存する写像が何かを考えていく（数学的にはこれは**準同型写像** (homomorphism) ともいわれる）。ある構造から別の構造への準同型写像を、数学では**表現** (representation), またそうした表現が存在することを証明する定理を**表現定理** (representation theorem) という。表現は非常に重要な概念であり、数学の至る所に出てくるし、また表現論 (representation theory) という分野の名前にもなっている^{*3}。上の事例は、それぞれ証明帰結関係の真理値による表現、事物の大小関係の数値による表現、ということができる。

^{*3} 表現論は、群のところで触れるが、群から線形写像（行列）への群準同型写像を考える。