

Inhoudsopgave

1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.	1
1.1 Lorem ipsum dolor sit.	1
1.2 Lorem ipsum dolor.	2
1.2.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.	2

1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguere possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere.

1.1 Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri.

Stelling 1.1 (Taylor's Formula over $\mathbb{R}$) Let $E \subseteq \mathbb{R}^n$ be open and let $\overline{B_r(a)} \subseteq E$. Suppose $f \in \mathcal{C}^k(E)$. Then

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq k} \frac{D^\alpha f(a)}{\alpha!} (x-a)^\alpha + \sum_{|\alpha|=k} h_\alpha(x) (x-a)^\alpha$$

for any $x \in B_r(a)$, where α is a multi-index, and $h_\alpha : B_r(a) \rightarrow \mathbb{R}$ such that $h_\alpha(x) \rightarrow 0$ when $x \rightarrow a$ for all $|\alpha| = k$.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aequi doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Opmerking Observe

$$|(x-a)^\alpha| = \left| \prod_{i=1}^n (x_i - a_i)^{\alpha_i} \right| = \prod_{i=1}^n |x_i - a_i|^{\alpha_i} \leq |x-a|^{|\alpha|}$$

Therefore we have that

$$\left| \sum_{|\alpha|=k} h_\alpha(x)(x-a)^\alpha \right| \leq |x-a|^k \sum_{|\alpha|=k} |h_\alpha(x)|.$$

Bewijs (van Taylor's Formula over $\mathbb{R}$) Let $x \in B_r(a)$ and define $[a, x] = \{\varphi(t) \mid t \in [0, 1]\}$, where $\varphi : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ is defined by $\varphi(t) = a + t(x-a)$. Now let $g(t) = f(\varphi(t))$ so that $g(0) = f(a)$ and $g(1) = f(x)$. Thus $g \in \mathcal{C}^k([-1, 1])$, meaning

$$g(1) = g(0) + \frac{1}{1!}g'(0) + \dots + \frac{1}{(k-1)!}g^{(k-1)}(0) + \frac{1}{k!}g^{(k)}(c)$$

for some $c \in [0, 1]$. As shown previously, we have

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq k-1} D^\alpha f(\varphi(t)) \cdot (x-a)^\alpha$$

for $m = 1, \dots, k$ by the Mixed Derivative Theorem. This implies

$$f(x) = \sum_{|\alpha| \leq k-1} \frac{D^\alpha f(a)}{\alpha!} (x-a)^\alpha + \sum_{|\alpha|=k} \frac{D^\alpha f(y)}{\alpha!} (x-a)^\alpha$$

for some $y \in [a, x]$. Now observe $D^\alpha f(y) = D^\alpha f(a) + (D^\alpha f(y) - D^\alpha f(a))$, where $D^\alpha f(y) - D^\alpha f(a) \rightarrow 0$ as $y \rightarrow a$. Lastly define $h_\alpha(x) = \frac{D^\alpha f(y) - D^\alpha f(a)}{\alpha!} \rightarrow 0$ as $x \rightarrow a$, where y is a function of x . □

1.2 Lorem ipsum dolor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua quaerat.

1.2.1 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lemma 1.2 (Archimedes) Voor elke $x \in \mathbb{R}$ bestaat er een $n \in \mathbb{N}$ zodat $x < n$.

Bewijs Veronderstel dat er een $x \in \mathbb{R}$ zou bestaan zodat $x \geq n$ voor alle $n \in \mathbb{N}$. Dan zou $\mathbb{N}$ naar boven begrensd zijn en volgens de supremumeigenschap een supremum hebben, zeg $s = \sup \mathbb{N}$. Omdat s de kleinste bovengrens is van $\mathbb{N}$, is $s-1$ geen bovengrens van $\mathbb{N}$. We kunnen dus een $k \in \mathbb{N}$ vinden zodat $s-1 < k$, maar dan $s < k+1$ en omdat $k+1 \in \mathbb{N}$ is dit strijdig met de aanname dat s een bovengrens van $\mathbb{N}$ is. □