NUTRITION

Pagbawas ng sodium sa pang-araw-araw na pagkain

Na-edit noong 14 October 2026

Para sa edukasyon ng pasyente. Sundin ang payo ng iyong healthcare team.

Saan galing ang sodium?

May sodium sa asin, packaged foods, sarsa, pampalasa, at handang pagkain. Maaaring makatulong ang pagbabawas nito sa pagkontrol ng blood pressure. Itanong sa doktor o nutrition counselor kung may limitasyon sa bawat araw, lalo na kung may heart failure, sakit sa bato, o ibang kondisyon. [1,2]

Tingnan ang madalas gamitin

Magsimula sa produktong karaniwang kasama sa pagkain. Basahin ang sodium amount at serving size. Ihambing ang magkatulad na produkto sa parehong dami. Maaaring mas maliit ang serving sa label kaysa ginagamit mo. Itago ang litrato o packaging para sa pagbisita para sa payo sa pagkain. Hindi kailangang maunawaan ang lahat ng label nang sabay-sabay. [1,4]

Isama ang sarsa at pampalasa

Banggitin ang toyo, patis, broth mixes, at ibang pampalasa kasama ng pangunahing sangkap. Madaling hindi mapansin ang sodium mula rito. Itanong kung paano babaguhin ang recipe nang katanggap-tanggap pa rin sa pamilya. Mas malinaw kung sinusukat ang idinadagdag kaysa sabihing kaunti lang. Matutulungan ka ng counselor sa angkop na adjustment.

Magdagdag ng lasa sa ibang paraan

Maaaring gumamit ng herbs, spices, bawang, at citrus para hindi lang asin ang nagbibigay ng lasa. Kung angkop, pumili ng sariwang sangkap at lower-sodium products. Maaaring makatulong ang pagbanlaw sa ilang canned foods. Dahan-dahang baguhin kung mas madali sa pamilya. Magtanong bago gumamit ng salt substitute dahil maaaring may potassium na hindi angkop sa kondisyon o gamot. [1,3]

Magplano bago mamili

Pumili muna ng isang produktong ihahambing sa halip na palitan ang lahat. Tingnan ang gastos, serving size, sodium, at kung gagamitin ang alternatibo. Hindi ibig sabihin na healthy na ang buong meal dahil mas mababa sa sodium ang isang produkto. Isaalang-alang ang buong plano sa pagkain. Kung walang lower-sodium na mabili, itanong ang paghahanda gamit ang available na sangkap.

Magtanong kapag kumakain sa labas

Kung maaari, ipahiwalay ang sarsa o dressing at alamin ang paghahanda. Ipaliwanag nang magalang ang pangangailangan, nang hindi inaasahang alam ng kusinero ang eksaktong nutrients. Pumili ng praktikal na opsiyon ayon sa payo. Kung madalas kumain sa labas dahil sa trabaho o biyahe, sabihin sa counselor para hindi puro home cooking ang plano.

Gawing kayang sundin ang pagbabago

Magdala ng pamilyar na recipe o tala ng pagkain sa susunod na pagbisita para sa payo sa pagkain. Itanong kung anong sodium source ang unang babawasan at pumili ng abot-kayang pagbabago. Ituloy ang iniresetang gamot para sa puso at blood pressure. Suporta sa paggamot ang pagbabago sa pagkain.

Mga reference

1. American Heart Association. (n.d.). How to reduce sodium. https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/sodium/how-to-reduce-sodium

2. American Heart Association. (n.d.). Shaking the salt habit. https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/changes-you-can-make-to-manage-high-blood-pressure/shaking-the-salt-habit-to-lower-high-blood-pressure

3. MedlinePlus. (n.d.). Low-salt diet. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000109.htm

4. MedlinePlus. (n.d.). Cooking without salt. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000760.htm

Cardiac Rehabilitation Unit
Cardiac Center · Bicol Medical Center
3rd Floor, 5-Storey Building · BMC Road, Concepcion Pequeña
Naga City, Camarines Sur 4400
0917-155-7163 · bmccardiaccenter@gmail.com
Magtanong tungkol sa programa at appointment.
https://jusanmisolas.github.io/bmccare/