

Deterioration of Sundarban mangrove forest ecosystem

Alfio Tomarchio

19 Giugno 2024



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Outline

- 1 Introduzione
- 2 Indici e funzioni
- 3 Risultati NDVI
- 4 Risultati classificazione
- 5 PCA E Deviazione standard
- 6 Conclusioni



Le mangrovie Sundarbans

- Le Sundarbans sono la più grande foresta di mangrovie del mondo, situate tra India e Bangladesh
- Riduzione della loro estensione a causa dell'inquinamento, sfruttamento e fattori ecologici stocastici
- Monitoraggio dell'ecosistema in Mongla

Novembre 2016



Novembre 2021



Raccolta dati



Sentinel 2 - Copernicus Open Hub r0.25

- Individuare l'area di ricerca
- Scegliere una bassa copertura nuvolosa
- Scegliere le date di confronto
- Selezionare True color come livello
- Download immagine in formato tiff 16 bit con le 4 bande (2,3,4,8)



Pacchetti utilizzati

Per la realizzazione di questo progetto sono stati utilizzati questi pacchetti:

- library(terra)
- library(imageRy)
- library(ggplot2)
- library(viridis)
- library(patchwork)



Outline

- 1 Introduzione
- 2 Indici e funzioni
- 3 Risultati NDVI
- 4 Risultati classificazione
- 5 PCA E Deviazione standard
- 6 Conclusioni

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DVI ED NDVI

I seguenti indici sono stati usati per calcolare la variazione delle mangrovie in Mongla:

- **Difference Vegetation Index:**

$$DVI = NIR - RED \quad (1)$$

- **Normalized Difference Vegetation Index:**

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED} \quad (2)$$

Confronto dati forniti dagli indici delle annate 2016 e 2021, concentrandosi sul mese di novembre data la minore copertura nuvolosa

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Applicazioni packages e R

Sono state usate le seguenti funzioni di R e dei pacchetti in esso installati:

- `setwd()`
- `rast`
- `concatenate`
- `im.plotRGB`
- `par`
- `dev.off`
- `colorRampPalette`
- `plot`
- `im.classify`
- `freq`
- R come calcolatrice
- `data.frame`
- `ggplot`
- `im.pca`
- `focal`



PlotRGB con NIR

Effettuo un primo confronto dei due anni posizionando il NIR sul verde, in modo che la vegetazione sia risaltata con quest'ultimo colore:




Figure: Plot dei due stack



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA


Outline

- 1 Introduzione
- 2 Indici e funzioni
- 3 Risultati NDVI
- 4 Risultati classificazione
- 5 PCA E Deviazione standard
- 6 Conclusioni


ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati NDVI

Plot che mostra i risultati dell'indice NDVI, utilizzando la colorazione "viridis" dove il blu scuro indica ciò che non è vegetazione, mentre ciò che va a schiarirsi è rappresentata dalle mangrovie:



NDVI 2016



NDVI 2021





Outline

- 1 Introduzione
- 2 Indici e funzioni
- 3 Risultati NDVI
- 4 Risultati classificazione
- 5 PCA E Deviazione standard
- 6 Conclusioni

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati classificazione

Quantifichiamo il cambiamento con `im.classify`:



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Frequenza e totale dei pixel

Calcolata la frequenza dei pixel per ogni classe e il totale dei pixel per ogni immagine ne otteniamo poi la percentuale osservando che:

Novembre 2016:

- Non vegetation: 37,99%
- Mangroves: 62,01%



Novembre 2021:

- Non vegetation: 39,22%
- Mangroves: 60,70%



Grafici

Visualizzazione patchwork dei due ggplot in base ai risultati della classificazione:






Outline

- 1 Introduzione
- 2 Indici e funzioni
- 3 Risultati NDVI
- 4 Risultati classificazione
- 5 PCA E Deviazione standard
- 6 Conclusioni

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

PCA 2016

Svolta l'analisi delle componenti principali e la PCA ci permette poi di poter scegliere la PC1 (più rappresentativa) per il calcolo della deviazione standard:






tot pc1= 77,1% tot pc2= 18% tot pc3= 3,1% tot pc4= 1,7%



PCA 2021

Analisi PC1 della PCA 2021:




tot pc1= 75,8% tot pc2= 20,3% tot pc3= 2,5% tot pc4= 1,4%




Moving window

Con la tecnica della moving window, in particolare una finestra 3x3 pixel, calcoliamo la deviazione standard sulla PC1:



2016



2021



Outline

- 1 Introduzione
- 2 Indici e funzioni
- 3 Risultati NDVI
- 4 Risultati classificazione
- 5 PCA E Deviazione standard
- 6 Conclusioni

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Conclusioni

- Durante la sua storia, la foresta di Sundarbans è sempre stata soggetta a gestione e sfruttamento antropico;

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Conclusioni

- Durante la sua storia, la foresta di Sundarbans è sempre stata soggetta a gestione e sfruttamento antropico;
- La combinazione di inquinamento, sfruttamento agricolo e rischi ciclonici (dovuti al cambiamento climatico) hanno costantemente reso problematica la conservazione di tale ecosistema;

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Conclusioni


- Durante la sua storia, la foresta di Sundarbans è sempre stata soggetta a gestione e sfruttamento antropico;
- La combinazione di inquinamento, sfruttamento agricolo e rischi ciclonici (dovuti al cambiamento climatico) hanno costantemente reso problematica la conservazione di tale ecosistema;
- L'obiettivo del progetto è stato quello di evidenziare la variazione nella copertura delle mangrovie in prossimità di centri urbani, Mongla in questo caso;



Conclusioni

- Durante la sua storia, la foresta di Sundarbans è sempre stata soggetta a gestione e sfruttamento antropico;
- La combinazione di inquinamento, sfruttamento agricolo e rischi ciclonici (dovuti al cambiamento climatico) hanno costantemente reso problematica la conservazione di tale ecosistema;
- L'obiettivo del progetto è stato quello di evidenziare la variazione nella copertura delle mangrovie in prossimità di centri urbani, Mongla in questo caso;
- Il risultato ottenuto dallo studio in Mongla ha rispecchiato l'andamento costante dal 2016 al 2021 della foresta di Sundarbans, ossia una riduzione annuale dell'estensione delle mangrovie dello 0,4% e di 7.7 km².





GRAZIE PER L'ATTENZIONE! <https://github.com/justalfio>



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA