

СПбГУ · МКН · СП · 1 КУРС

# Конспект лекций по Математическому анализу

Лектор: Мозоляко П. А.

Составители: ....

Санкт-Петербург, 2026

# Второй семестр


## 1. Формула Стирлинга. Неравенство Юнга. Неравенство Гёльдера

### Определение 1: Формула Стирлинга

$$n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

**Доказательство.** Пишем  $\log \equiv \ln$ . Тогда

$$\ln(n!) = \ln 1 + \ln 2 + \dots + \ln n = \sum_{k=1}^n \ln k.$$



Так как  $\ln x$  возрастает, то для любого  $n \geq 1$ :

$$\int_n^{n+1} \ln x \, dx > \ln n > \int_{n-1}^n \ln x \, dx.$$

Суммируя по  $n = 1, \dots, N$

$$\int_0^N \ln x \, dx < \ln(N!) < \int_1^{N+1} \ln x \, dx.$$

Так как

$$(x \ln x - x)' = \ln x \quad \Rightarrow \quad \int \ln x \, dx = x \ln x - x + C,$$

то

$$\int_0^n \ln x \, dx = n \ln n - n, \quad \int_1^{n+1} \ln x \, dx = ((n+1) \ln(n+1) - (n+1)) - (1 \cdot \ln 1 - 1).$$

Следовательно,

$$n \ln n - n < \ln(n!) < (n+1) \ln(n+1) - n,$$

и, возводя в экспоненту,

$$n^n e^{-n} < n! < (n+1)^{n+1} e^{-n}.$$

Определим

$$d_n := \ln(n!) - \left( \left( n + \frac{1}{2} \right) \ln n - n \right).$$

Если  $d_n \rightarrow C$ , то

$$n! = e^{d_n} n^{n+\frac{1}{2}} e^{-n} = e^C \sqrt{n} \left( \frac{n}{e} \right)^n (1 + o(1)).$$

Кроме того, оценка  $d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right)$  даст именно множитель  $1 + O\left(\frac{1}{n}\right)$ .

Вычислим разность:

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \ln(n!) - \left( n + \frac{1}{2} \right) \ln n + n - \ln((n+1)!) + \left( n + 1 + \frac{1}{2} \right) \ln(n+1) - (n+1) \\ &= -\ln(n+1) - \left( n + \frac{1}{2} \right) \ln n + \left( n + \frac{3}{2} \right) \ln(n+1) - 1 \\ &= \left( n + \frac{1}{2} \right) (\ln(n+1) - \ln n) - 1 \\ &= \left( n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) - 1. \end{aligned}$$

Положим

$$\frac{n+1}{n} = 1 + \frac{1}{n} = \frac{1 + \frac{1}{2n+1}}{1 - \frac{1}{2n+1}} = \frac{1+t}{1-t}, \quad t := \frac{1}{2n+1}.$$

(Эта форма удобна, потому что  $\ln \frac{1+t}{1-t}$  имеет красивый ряд.)

Для  $|t| < 1$  имеем сходящийся степенной ряд:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = \ln(1+t) - \ln(1-t) = 2 \left( t + \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{5} + \dots \right).$$

Обозначим остаток частичной суммы:

$$\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) = 2 \left( t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t), \quad |t| < 1,$$

где при фиксированном  $t$  выполнено  $r_{2k+1}(t) \rightarrow 0$  при  $k \rightarrow \infty$ .

Подставим это в  $d_n - d_{n+1}$  и используем  $n + \frac{1}{2} = \frac{1}{2t}$ :

$$\begin{aligned} d_n - d_{n+1} &= \left( n + \frac{1}{2} \right) \ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) - 1 \\ &= \frac{1}{2t} \left( 2 \left( t + \frac{t^3}{3} + \dots + \frac{t^{2k+1}}{2k+1} \right) + r_{2k+1}(t) \right) - 1 \\ &= \left( 1 + \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \right) + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t} - 1 \\ &= \frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} + \frac{r_{2k+1}(t)}{2t}. \end{aligned}$$

Отсюда сразу видно, что  $d_n - d_{n+1} > 0$ , то есть  $(d_n)$  убывает.

Теперь оценим сверху. Так как для  $j \geq 1$  выполнено  $\frac{1}{2j+1} \leq \frac{1}{3}$ , то

$$\frac{t^2}{3} + \frac{t^4}{5} + \dots + \frac{t^{2k}}{2k+1} \leq \frac{1}{3} (t^2 + t^4 + \dots + t^{2k}).$$

Переходя к пределу по  $k \rightarrow \infty$  и используя сходимость ряда при  $|t| < 1$ , получаем

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \sum_{j=1}^{\infty} t^{2j} = \frac{1}{3} \cdot \frac{t^2}{1-t^2}.$$

Подставим  $t = \frac{1}{2n+1}$ :

$$0 < d_n - d_{n+1} \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{\frac{1}{(2n+1)^2}}{1 - \frac{1}{(2n+1)^2}} = \frac{1}{3((2n+1)^2 - 1)} = \frac{1}{12n(n+1)} = \frac{1}{12} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

Суммируя по  $j = n, \dots, n+m-1$ , получаем для любого  $m \geq 1$ :

$$0 < d_n - d_{n+m} = \sum_{j=n}^{n+m-1} (d_j - d_{j+1}) < \frac{1}{12} \left( \frac{1}{n} - \frac{1}{n+m} \right).$$

(Значит  $d_n$  убывает и ограничена снизу, следовательно имеет предел.)

Обозначим  $C := \lim_{n \rightarrow \infty} d_n$ . Тогда, переходя в предыдущем неравенстве к пределу при  $m \rightarrow \infty$ , получаем

$$0 < d_n - C \leq \frac{1}{12n},$$

то есть

$$d_n = C + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Следовательно,

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + C + O\left(\frac{1}{n}\right),$$

и после экспоненты:

$$n! = e^C \sqrt{n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right).$$

Осталось найти  $e^C$ .

**Формула Валлиса:**

$$\left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!}\right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2}.$$

Отсюда

$$\ln \left( \left( \frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 \cdot \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Используем тождества

$$(2n)!! = 2^n n!, \quad (2n)! = (2n)!!(2n-1)!!,$$

поэтому

$$\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} = \frac{((2n)!!)^2}{(2n)!} = \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!}.$$

Тогда

$$\ln \left( \left( \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \ln \frac{\pi}{2}.$$

Теперь подставим разложения через  $d_n$ :

$$\ln(n!) = \left(n + \frac{1}{2}\right) \ln n - n + d_n, \quad \ln((2n)!) = \left(2n + \frac{1}{2}\right) \ln(2n) - 2n + d_{2n}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \ln \left( \left( \frac{2^{2n}(n!)^2}{(2n)!} \right)^2 \frac{1}{2n+1} \right) &= 4n \ln 2 + 4 \ln(n!) - 2 \ln((2n)!) - \ln(2n+1) \\ &= 4d_n - 2d_{2n} + \ln n - \ln 2 - \ln(2n+1). \end{aligned}$$

(Все главные члены порядка  $n \ln n$  и  $n$  сократились; остались только  $d_n$  и константы.)

Переходя к пределу при  $n \rightarrow \infty$  (учитывая  $d_n \rightarrow C$  и  $d_{2n} \rightarrow C$ ), получаем

$$\ln \frac{\pi}{2} = 4C - 2C + \lim_{n \rightarrow \infty} (\ln n - \ln 2 - \ln(2n+1)) = 2C - 2 \ln 2.$$

Значит

$$2C - 2 \ln 2 = \ln \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad 2C = \ln(2\pi) \quad \Rightarrow \quad C = \frac{1}{2} \ln(2\pi), \quad e^C = \sqrt{2\pi}.$$

Итак,

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + O\left(\frac{1}{n}\right)\right), \quad n \rightarrow \infty.$$

■

## 1.1. Несколько интегральных неравенств

### Утверждение 1: Неравенство Юнга

Пусть  $a, b > 0$ ,  $p, q > 0$ ,  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ ,  $p, q \neq 1$ . Тогда

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p > 1,$$

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}, \quad p < 1.$$

**Доказательство.**

**Claim.** При  $x > 0$  верно

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \leq 0, \quad 0 < \alpha < 1,$$

$$x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1 \geq 0, \quad \alpha < 0 \text{ или } \alpha > 1.$$

**Проверяем**

$$(x^\alpha - \alpha x + \alpha - 1)' = \alpha x^{\alpha-1} - \alpha = \alpha(x^{\alpha-1} - 1) = 0 \iff x = 1.$$

$$1^\alpha - \alpha \cdot 1 + \alpha - 1 = 0.$$

Отсюда: максимум при  $0 < \alpha < 1$ , минимум при  $\alpha < 0$  или  $\alpha > 1$ .

**Положим**  $x := \frac{a}{b}$ ,  $\alpha := \frac{1}{p}$ ,  $\frac{1}{q} := 1 - \frac{1}{p} = 1 - \alpha$ .

**Тогда**

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{\frac{1}{p}} - \frac{1}{p} \cdot \frac{a}{b} + \frac{1}{p} - 1 \leq 0, \quad 0 < \frac{1}{p} < 1 \quad (\Leftrightarrow p > 1).$$

Умножая на  $b > 0$ , получаем

$$a^{\frac{1}{p}} b^{1-\frac{1}{p}} \leq \frac{a}{p} + b\left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

Так как  $\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$ , то

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \leq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

А при  $\frac{1}{p} < 0$  или  $\frac{1}{p} > 1$  (то есть  $p < 1$ ) получаем обратное неравенство:

$$a^{\frac{1}{p}} b^{\frac{1}{q}} \geq \frac{a}{p} + \frac{b}{q}.$$

■

## Утверждение 2: Неравенство Гёльдера

Пусть  $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ , и  $f, g$  интегрируемы по Риману на  $[c, d] \subset (a, b)$  для любого  $[c, d]$ .

**Тогда:**

$$\int_a^b |f(x) g(x)| dx \leq \left( \int_a^b |f(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left( \int_a^b |g(x)|^q dx \right)^{\frac{1}{q}},$$

$$\forall p, q > 0, p, q < \infty : \quad \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1.$$

Если  $p = q = 2$ , то имеем неравенство КБШ:

$$\int_a^b |fg| \leq \sqrt{\int_a^b |f|^2} \cdot \sqrt{\int_a^b |g|^2}.$$