


Republic of the Philippines

Department of Agriculture

Regional Field Unit 4-A

CALABARZON





PAKINABANG NG LANSONES

- Ang bunga ay mainam na pinanggagalingan ng antioxidants--substance na pang-iwas cancer--, at Vitamin C at E.
- Ang puno ay matigas at mainam na gamiting poste o haligi ng bahay
- Ang pinatuyong balat ng bunga ay sinusunog upang gamiting pantaboy ng lamok at iba pang pesteng insekto.
- · May oleoresin kaya maaaring gamot sa diarrhea.

4 NA URI NG LANSONES SA PILIPINAS

Paete	Tuwid at	Matingkad na	Manipis ang balat
	paitaas ang	berde, pantay	
	mga sanga	ang gilid	
-		ng dahon at	
		bahagyang	
		pahaba ang	
		dulo	
Duku	Tuwid	Alon-alon	Makapal ang
	na puno;	ang gilid	balat, karaniwang
	mayabong at	ng dahon,	may isa o walang
	malapad na	pabilog ang	buto. May 4-5
	sanga	dulo ng	bunga kada
		dahon	buwig
Thai	Tuwid	Pantay ang	Malutong ang
	na puno,	gilid ng	balat, mahaba
	mayabong na	dahon	ang buwig,
	sanga		karaniwang
			walang buto
Jolo	Tuwid	Pantay ang	Makapal ang
	na puno,	gilid ng	balat, mahaba
	mayabong na	dahon	ang buwig,
	sanga		karaniwang may
			3-4 na buto;
			maasim ang
			bunga.



PARAAN NG PAGPAPARAMI

1. Sekswal o likas

Pagpupunla at pagpapatubo ng mga buto. Inililipat ang mga punla sa mga plastic bag na may lamang pinaghalong lupa at organikong pataba. Inaalagaan ang mga inilipat na punla hanggang sa lumaki na may 1 metro ang taas.

2. Asekwal o di likas (pagdudugtong)

Ang *cleft grafting* ang pangkaraniwang ginagamit sa pagpaparami. Ang mga *budsticks* ay kinukuha sa mga puno na may piling katangian. Maaring gamiting *rootstock* kahit anong uri subalit pinakamabuti ang *Jolo*.

TAMANG PAGTATANIM

Maari nang ilipat-tanim ang mga pananim kapag ito ay may taas nang

1 metro. Mas mainam magtanim ng lansones sa panahon ng tagulan.

Ihanda ng maayos ang lupang taniman at gawin ang mga sumusunod:

- 1. Pumili ng taniman na hindi tinitigilan ng tubig at may magaspang at buhaghag na lupa.
- 2. Humukay ng butas na may luwang at lalim na 30 sentimetro. Ang agwat ng bawat butas ay 5-6 metro kapag Paete var. ang itatanim, at 7-8 metro naman kapag Duko o Thai var. Lagyan ng pinaghalong organikong pataba at lupa (1:1) ang ikatlong bahagi ng hukay. Kung walang organikong pataba (inorganic) o kompost, maaring maglagay ng inorganic na pataba katulad ng urea (46-0-0). Lagyan ng lupa ang hukay na may inorganic na abono bago ilagay ang pananim.
- 3. Tiyakin na hindi malalagyan ng abono ang ugat ng pananim.
- 4. Tabunan ng lupa ang hukay pagkatanim.
- Diligan kaagad at ulitin ang pagdidilig kung mapansin na may kakulangan sa tubig katulad ng pagkalanta ng dahon.
- 6. Lagyan ng pangkanlong ang bagong tanim na lansones. Maaring gumamit ng dahon ng niyog o

madre de cacao o kamoteng kahoy na nakapalibot sa puno ng lansones sa layong 1 metro.

7. Maglagay ng abono 2 beses sa isang taon: sa Mayo o Hunyo pagsapit ng tag-ulan, at sa Oktubre o bago matapos ang tag-ulan.

PAMAMARAAN UPANG MAGING MALUSOG AT MABUNGA ANG MGA PUNO

Pag-aabono — Ipasuri ang taglay na sustansya ng lupang taniman bago maglagay ng abono. Ang rekomendadong dami ng abono ay hinahati sa dalawa: kalahati ay ilalagay sa buwan ng Mayo o Hunyo at ang kalahati ay sa Oktubre pagkatapos mag-ani. Maglagay ng abono kada taon.

Paglilinis at pagbabawas ng mga sanga (pruning)—

Alisin ang mga tuyong sanga na walang dahon at mga suloy na di kailangan pagkatapos mag-ani. (Ang mga tuyong sanga ay pinagbabahayan ng mga peste katulad ng insekto at amag. Samantalang ang mga sobrang dahon at suloy ay nakikibahagi sa sustansya na mahalaga upang ang puno ay mamunga.)

Pagpapatubig o irigasyon

Ang pagpapatubig ay nakakapagpa-aga ng pamumulaklak lalo na kung may 2-4 na linggong tagtuyot na nangyari. Dapat ay tuloy-tuloy ang patubig hanggang sa sumapit ang tag-ulan upang maiwasan ang pagkaluoy ng mga butong o flower buds. Diligan o patubigan ang mga punong lansones hanggang lupa ay magkaroon ng tamang halumigmig.

Wastong pagsugpo sa pesteng insekto, sakit at dapo

MGA SAKIT AT PESTE NG LANSONES AT PARAAN UPANG MAIWASAN/MASUGPO ANG MGA TO

Bark Borer

Ang bark borer ay uod ng paruparo na makikita sa mga puno at sanga ng lansones. Mapapansin ito sa ilalim ng bitakbitak at umbok na balat ng kahoy o bark. Kapag natuklap ang balat, mapapansin ang mga butas sa katawan ng puno na likha nito. Ang pagkakalis (scraping) ay ginagawa pagkatapos magani upang masugpo ang bark borer. Kapag masyadong marami ang mga uod, maaring magbomba ng angkop na pamatay-peste,