DKi

Bioidentical Hormone Replacement Therapy (BHRT)
Prescription Form / 生物同源性荷尔蒙处方

【草案——须经执业医师审核签字后方可生效】

Patient Information / 患者资料

Patient Name / 患者姓名	王女士(示例)	Date / 日期	2026-11-10
Doctor / 医师	张医生(示例)	Address / 住址	上海市示例路 1 号
Patient ID / 病历号	DKi-0001	Tel / 电话	138-0000-0000

Hormone Selection / 荷尔蒙选择

Hormone 激素	Strength (mg/mL)	Equivalent (%)	Tick ✓
Testosterone 睾酮	10 mg/mL	1%	☐
	40 mg/mL	4%	☐
	80 mg/mL	8%	☐
	100 mg/mL	10%	☐
	200 mg/mL	20%	☐
Progesterone 黄体酮	**50 mg/mL**	**5%**	☑
	100 mg/mL	10%	☐
Biest (1:9)	E2 0.25 + E3 2.25 mg/mL	0.25% Total Estrogens	☐
	E2 0.50 + E3 4.50 mg/mL	0.50% Total Estrogens	☐
Biest (2:8)	E2 0.50 + E3 2.00 mg/mL	0.25% Total Estrogens	☐
	E2 1.00 + E3 4.00 mg/mL	**0.50% Total Estrogens**	☑
Estradiol 雌二醇	0.1 mg/mL	0.01%	☐
Estriol 雌三醇	0.1 mg/mL	0.01%	☐
DHEA	50 mg/mL	5%	☐
	100 mg/mL	10%	☐
Chrysin 白杨素	50 mg/mL	5%	☐
	100 mg/mL	10%	☐

Prescription Details / 处方资料

Biest (2:8) 双雌 (2:8) · 0.50% Total Estrogens（E2 1.00 + E3 4.00 mg/mL）

Quantity / 数量：☑ 30 mL　☐ Other：_____
Dose / 剂量：1 转（0.25 mL）（E2 0.25 mg + E3 1 mg）
Directions / 用法：每日早晨 1 次；6–8 周后按症状 ±1 转滴定
Application Site / 涂抹部位：前臂内侧 / 大腿内侧，轮换部位
目的：血管舒缩症状 / 雌激素缺乏

Progesterone 黄体酮 · 5%（50 mg/mL）

Quantity / 数量：☐ 30 mL　☑ Other：30 mL × 2
Dose / 剂量：2 转（0.5 mL）（25 mg）
Directions / 用法：每日早晨 1 次；不替代内膜保护
Application Site / 涂抹部位：前臂内侧 / 大腿内侧，轮换部位
目的：补充：日间情绪 / 焦虑支持

Other / 其他（非乳膏）

药品	规格	剂量	用法 / 部位	频次	数量
口服微粒化黄体酮胶囊	100 mg/粒	1 粒（100 mg）	口服	每晚睡前，连续	90 粒

General Instructions / 使用说明

Apply at approximately the same time each day. / 每天尽量于相同时间使用。

Massage until fully absorbed. / 轻轻按摩至完全吸收。

Wash hands after application. / 使用后请洗手。

1 g cream = 1 mL cream. / 1 克乳膏 = 1 毫升乳膏。

1 转 = 250 mg = 0.25 mL（Topi-Click）

Doctor Signature / 医师签名：_____ Date / 日期：_____

DKi

BHRT 临床评估与随访计划

患者：王女士(示例)　病历号：DKi-0001　日期：2026-11-10

一、客户信息

性别：女　年龄：53　BMI：22.7　血压：122/78

分期：☐围绝经期　☑绝经早期(<10年)　☐绝经晚期(≥10年/≥60岁)　☐手术绝经/POI　☐男性性腺功能减退

获益/风险最有利窗口；乳膏或 Pellet

二、安全闸门结果

结论：☑可进行　☐暂缓　☐禁忌

三、主要症状与评分

MRS 总分：18（重度）　躯体 9 / 心理 7 / 泌尿生殖 2
主要诉求：睡眠差、潮热

四、给药途径及子宫内膜保护

☑经皮乳膏　☐Pellet 皮下植入

- 经皮乳膏优先：可当日停用、便于滴定

子宫内膜保护：口服微粒化黄体酮 100 mg，每晚睡前，连续

五、客户注意事项

- 涂抹乳膏前后洗手；部位轮换；涂抹处数小时内避免与儿童、宠物皮肤接触
- 每日记录症状日记（潮热次数、睡眠、情绪、出血）
- 请勿自行加量或停药，调整需经医生评估
- 出现以下情况立即联系医生：任何阴道出血、单侧腿肿痛、胸痛气短、剧烈头痛或视物异常、乳房新发肿块、声音变粗

六、复诊与检测计划

2026-11-10	开始治疗	基线检测与影像已存档
2026-11-24	2 周电话随访	耐受性；有无阴道出血
2026-12-29	6–8 周	MRS 复评；症状持续则查 E2 后再滴定（每次 ±1 转）
2027-02-08	3 个月	复评并稳定剂量
2027-05-11	6 个月	性激素、血常规、血压、体重；TVUS（如使用乳膏黄体酮或肌瘤）
2027-11-10	每年	乳腺影像；TVUS（按需）；血脂；血常规

七、预期变化（仅供参考）

- 睡眠：一般 1–2 周 起（记录：睡眠日记）
- 潮热：一般 2–4 周 起（记录：频率/严重度记录、MRS）
- 情绪：一般 4–8 周 起（记录：MRS 心理子量表）
- 骨骼：一般 12 个月以上 起（记录：DEXA）

注：个体反应差异显著，以上时间为一般观察，不构成疗效承诺。

八、医师审核

审核意见 / 修改：

执业医师签名：_____　执业证号：_____　日期：_____

临床备注（内部）

假设：

- 部分检测未填写采样日期，已假设在有效期内

引擎版本 bhrt-0.2.0　生成日期 2026-11-10