VIRALES

Nom	Symptômes	Description	traitement
La maladie de Newcastle (peste aviaire)	-Perte d'appétit -fièvre -soif intense -problèmes respiratoires -diarrhée -troubles de l'équilibre -paralysie	Cette maladie très grave, provoquée par un paramyxovirus est mortelle dans presque 100% des cas. Elle était autrefois appelée peste aviaire. Elle est contagieuse et se transmet par les sécrétions des sujets atteints. Il n'existe aucun traitement spécifique, cependant la vaccination est possible. Cette maladie fait l'objet d'une déclaration obligatoire auprès des autorités.	Aucun, sauf vaccination préventive Traitement naturel : Liste des HE (huiles essentielles) avec des propriétés antivirales -HE origan -HE thym -HE cannelle -HE Eucalyptus radiata -HE Eucalyptus globulus -HE citron
La maladie de Mareck	-mouvements saccadés -paralysie -tombe Peut y avoir aussi : -difficultés respiratoires -troubles digestifs (constipation ou diarrhée)	Elle est provoquée par un herpès virus. Elle touche surtout les sujets jeunes, âgés de 8 à 10 semaines. Le taux de mortalité est de l'ordre de 10% à 15%. Il n'existe aucun traitement spécifique, le vaccin est possible, mais pas efficace à 100%	Aucun, possibilité de vaccination mais efficacité pas à 100% Traitement naturel : Liste des HE (huiles essentielles) avec des propriétés antivirales -HE origan -HE thym -HE cannelle -HE Eucalyptus radiata -HE Eucalyptus globulus -HE citron
La bronchite infectieuse	-conjonctivite -difficultés à respirer -toux -aire abattue -perte d'appétit -soif intense	Elle est provoquée par un coronavirus et est très dangereuse pour les poussins. Le décès survient très rapidement (2 à 3 jours) dans presque 100% des cas. Aucun traitement spécifique, vaccination possible	Aucun, possibilité de vaccination préventive Traitement naturel : Liste des HE (huiles essentielles) avec des propriétés antivirales -HE origan -HE thym -HE cannelle -HE Eucalyptus radiata -HE Eucalyptus globulus -HE citron
La variole aviaire	Forme cutanée : -pustules -vésicules aux coins du bec, barbillons et crête Forme diphtérique :	Elle est provoquée par un poxvirus et peut se présenter sous deux formes : cutanée et diphtérique (infection	Aucun, possibilité de vaccination préventive Traitement naturel :

	-apparition de fausses	respiratoire amygdales,	Liste des HE (huiles
	membranes adhérentes à	gorge, larynx, pharynx).	essentielles) avec des
	l'intérieur du bec		propriétés antivirales
	entrainant des difficultés		-HE origan
	respiratoires		-HE thym
			-HE cannelle
			-HE Eucalyptus radiata
			-HE Eucalyptus globulus
			-HE citron
L'encphalomyélite aviaire	-déprime	Elle est provoquée par un	Aucun, possibilité de
	-tremblements de la tête et	picornavirus qui se localise	vaccination préventive
	du cou	dans le cerveau. L'autre	
	-paralysie	nom de cette maladie est la	Traitement naturel :
		tremblote épidémique. Elle	Liste des HE (huiles
		touche surtout les jeunes	essentielles) avec des
		sujets de moins de 6	propriétés antivirales
		semaines. Aucun	-HE origan
		traitement spécifique, mais	-HE thym
		la vaccination est possible.	-HE cannelle
		L'issue de cette maladie est	-HE Eucalyptus radiata
		la mort	-HE Eucalyptus globulus
			-HE citron
La laryngo-trachéite	-difficultés respiratoires	Elle est provoquée par un	Aucun, possibilité de
infectieuse	-toux	herpès virus. Il en existe	traitement aux
	-expectorations de mucus	deux formes : la forme	antibiotiques qui minimises
	sanguinolents	aiguë (dans 20% des cas la	les symptômes et les
		mort survient par	conséquences de la maladie
		étouffement) et la forme	
		subaiguë (mortelle dans	Traitement naturel :
		seulement 5% des cas). Il	Liste des HE (huiles
		n'y a aucun traitement	essentielles) avec des
		spécifique, mais	propriétés antivirales
		l'administration	-HE origan
		d'Antibiotiques permet de	-HE thym
		minimiser les symptômes et	-HE cannelle
		les conséquences de la	-HE Eucalyptus radiata
		maladie	-HE Eucalyptus globulus
			-HE citron

BACTÉRIENNES

Nom	Symptômes	Description	traitement
La mycoplasmose	Ils sont assez proches de	C'est la maladie qui peut	Traitement à base
	ceux du Coryza : -toux	être causée par des courants d'air, un	d'antibiotiques
	-éternuements -difficultés respiratoires	refroidissement. Elle peut aussi apparaitre après une maladie infectieuse. Certains sujets peuvent des porteurs sains sans déclarer	Traitement naturel : HE de thym directement au bec ou sur une mie de pain. Cette huile essentielle est
		la maladie, mais peuvent la transmettre. Elle est également appelée MRC (maladie respiratoire chronique). Le traitement est à base d'antibiotiques	irritante pour la bouche les poules ne l'apprécient pas. 1 à 2 gouttes par jours et quelques gouttes (3-4) dans la buvette en prévention pour les autres sujets sans symptômes.
		·	Prévention : vinaigre de cidre de pomme biologique avec la mère dans l'eau (1 bouchon)
La pasteurellose	Surtout des symptômes respiratoires -toux -râle -éternuements -écoulements nasals abondants Les symptômes peuvent évolués vers une pneumonie	Cette maladie est encore appelée choléra aviaire. Elle peut prendre différentes formes. La plus dangereuse et redoutable est la forme suraiguë: les sujets meurent subitement sans présenter aucun symptômes. La forme chronique est plus fréquente et peut se soigner par antibiotiques	Traitement à base d'antibiotiques Traitement naturel : HE de thym directement au bec ou sur une mie de pain. Cette huile essentielle est irritante pour la bouche les poules ne l'apprécient pas. 1 à 2 gouttes par jours et quelques gouttes (3-4) dans la buvette en prévention pour les autres sujets sans symptômes. Prévention : vinaigre de cidre de pomme biologique avec la mère dans l'eau (1
La colibacillose	-abattement -diarrhée -anorexie Peuvent aussi se manifester : -troubles respiratoires	C'est une maladie assez rare provoquée par la bactérie Escherichia Coli. Elle atteint surtout les jeunes sujets. Traitement à base d'antibiotiques	bouchon) Traitement à base d'antibiotiques Traitement naturel: HE de thym directement au bec ou sur une mie de pain. Cette huile essentielle est irritante pour la bouche les poules ne l'apprécient pas. 1 à 2 gouttes par jours et quelques gouttes (3-4)

_			
			dans la buvette en prévention pour les autres sujets sans symptômes. Prévention : vinaigre de cidre de pomme biologique avec la mère dans l'eau (1
La pullorose	-les poussins sont abattus -refusent de s'alimenter	Également appelée diarrhée blanche, elle	bouchon) Traitement à base d'antibiotiques
	-gémissent -abdomen gonflé -expulsent une espèce de diarrhée blanche Peut y avoir : -gonflement des articulations -boiterie -peuvent mourir rapidement	affecte surtout les très jeunes sujets, les poussins. Traitement à base d'antibiotiques	Traitement naturel: HE de thym directement au bec ou sur une mie de pain. Cette huile essentielle est irritante pour la bouche les poules ne l'apprécient pas. 1 à 2 gouttes par jours et quelques gouttes (3-4) dans la buvette en prévention pour les autres sujets sans symptômes.
			Prévention : vinaigre de cidre de pomme biologique avec la mère dans l'eau (1 bouchon)
La typhose	La forme chronique se manifeste par : -perte d'appétit -soif intense -anémie -diarrhée jaune et fétide (qui pue)	Elle affecte les jeunes de plus de 3 mois et les adultes. La forme aiguë est le plus souvent mortelle. Un traitement aux antibiotiques existe, mais les sujets restent porteurs du germe contaminant.	Traitement à base d'antibiotiques, mais les sujets restent contaminants. Traitement naturel: HE de thym directement au bec ou sur une mie de pain. Cette huile essentielle est irritante pour la bouche les poules ne l'apprécient pas. 1 à 2 gouttes par jours et quelques gouttes (3-4) dans la buvette en prévention pour les autres sujets sans symptômes. Prévention: vinaigre de cidre de pomme biologique avec la mère dans l'eau (1 bouchon)
Le coryza infectieux	-difficultés respiratoires -toux	Cette maladie atteint généralement les adultes.	Traitement à base d'antibiotiques
	-éternuements -écoulements abondants	L'issue en est souvent fatale. Traitement à base d'antibiotiques	Traitement naturel :

Les symptômes évoluent	HE de thym directement au
vers :	bec ou sur une mie de pain.
-conjonctivite	Cette huile essentielle est
-larmoiements	irritante pour la bouche
-enflure de la face	les poules ne l'apprécient
-perte d'appétit et mort	pas. 1 à 2 gouttes par jours
	et quelques gouttes (3-4)
	dans la buvette en
	prévention pour les autres
	sujets sans symptômes.
	Prévention : vinaigre de
	cidre de pomme biologique
	avec la mère dans l'eau (1
	bouchon)

PARASITAIRES INTERNES

Nom	Symptômes	Description	traitement
Les vers		Plusieurs sorte de vers peuvent affectés vos poules. Les ascaris, vers long se logent dans l'intestin. Traitement au vermifuge	Vermifuge Décoction de tanaisie (genre tisane)
Les vers Capillaires	-abattement -soif intense -amaigrissement -diarrhée abondante et verdâtre	Ce sont des vers ronds qui se fixent à la paroi du jabot, de l'œsophage et de l'intestin	Vermifuge Décoction de tanaisie (genre tisane)
Le ténia (vers)	-amaigrissement malgré une bonne alimentation -anémie	Vers plat qui se localise dans l'intestin grêle.	Vermifuge Décoction de tanaisie (genre tisane)
Le syngame (vers)	-difficultés respiratoires -toux -bâillements	Ce vers parasite habituellement les faisans, mais peut également toucher la poule. Il se fixe dans la trachée.	Vermifuge Décoction de tanaisie (genre tisane)
Les coccidioses	-perte d'appétit -bougent peu -plumage peut être hérissé -peut y avoir de la diarrhée	Provoquée par un parasite, le Eimeria, cette maladie touche surtout les jeunes sujets et le taux de mortalité est de 5% à 10%. Le parasite peut se fixer à différents endroits de l'intestin. Les traitements sont efficaces, mais doivent être administrés le plus tôt possible.	Traitement naturel: HE de thym directement au bec ou sur une mie de pain. Cette huile essentielle est irritante pour la bouche les poules ne l'apprécient pas. 1 à 2 gouttes par jours et quelques gouttes (3-4) dans la buvette en prévention pour les autres sujets sans symptômes. Prévention: vinaigre de cidre de pomme biologique avec la mère dans l'eau (1 bouchon)
L'aspergillose	Chez les poussins: -somnolence -soif intense -difficulté respiratoire qui les oblige à garder le bec ouvert en permanenceMort rapide, entre 24 et 48 heures. Chez les adultes: -affaiblissement -difficulté respiratoire -mort par asphyxie	Elle est provoquée par un champignon et se repend sous deux formes : aiguë chez les sujets de moins de 4 semaines (elle est alors appelée pneumonie des poussins) et chronique pour les adultes. Le traitement est assez lourd, mais nécessaire. Attention, la maladie se transmet à l'homme.	HE antifongiques: géranium, menthe, cannelle. Dans un vaporisateur et pulvériser l'Environnement des poules. Traitement par voies aériennes.

PARASITAIRES EXTERNES

Nom	Symptômes	Description	traitement
Les poux communs	Aucun, mais peuvent	Les poux peuvent parasiter	Bain de sable + terre de
(poux blancs, poux	transmettre des maladies	nos poules. Le pou	diatomée + cendre. Tenir la
broyeurs, poux	infectieuses d'une poule à	commun est le moins	litière propre
mallophages)	une autre	grave. Vous pouvez les	
		éviter en permettant à vos	Mélange d'HE de lavande
		poules de se rouler dans	vraie + HE d'eucalyptus
		des nids de sable, de	Gobulus + huile de table.
		cendre et de terre de	Vaporiser les sujet tous les
		diatomée.	jours durant au moins une
		Les poux communs ne se	semaines puisque les
		nourrissent pas de sang,	œufs ne seront pas atteints
		mais de cellules mortes, de	et leur cycle est d'environ 1
		plumes et de peau	semaine.
Les acariens (poux rouges)	Anémie, croûte de sang sur	Plus dangereux est le pou	Désinfection du poulailler
	la peau	rouge. (petit acarien,	dans ses moindres recoins
		Dermanyssus Gallinae). S'il	et de tous les outils et
		est présent dans le	matériel
		poulailler en grand nombre,	
		il peut très rapidement	Mélange d'HE de lavande
		sucer tout le sang de la	vraie + HE d'eucalyptus
		poule. La mort peut alors	Gobulus + huile de table.
		survenir en quelques jours.	Vaporiser les sujet tous les
		Ces acariens ne vivent pas à	jours durant au moins une
		la lumière. Ils s'infiltrent	semaine puisque les
		dans les fentes et les	œufs ne seront pas atteints
		recoins sombres, d'où	et leur cycle est d'environ 1
		l'importance de nettoyer et	semaine
		aérer votre poulailler	
		régulièrement.	
		Ils ne vivent pas sur la	
		poule, mais viennent sur	
		elle durant leur sommeil	
		pour sucer leur sang.	
		La présence de poux rouge	
		peut être suspectée par des	
		trainées de poudre qui	
		ressemblent à du poivre	
		gris. On peut aussi trouver des traces de leurs	
		excréments dans les fientes	
		de poule. En cas de	
		présence de poux rouge il faut désinfecter	
		entièrement le poulailler dans les moindres recoins	
		et tous les accessoires.	
La gala dánlumanta	dánôte blanchôtra cur la		Traitement non tactá : LIF
La gale déplumante	-dépôts blanchâtre sur la	Elle est provoquée par un	Traitement non testé : HE
	face du poulet	acarien : Cnemidocoptes	(huile essentielle)
		laevis.	d'eucalyptus globulus

	I		,, , ,
	-le conduit auditif est hypertrophié -l'orifice du conduit est gonflé -la base des plumes du cou peut être érodée et la peau se retrouve à vif -il y a risque de picossage des autres poules		mélangée à de l'huile de table ordinaire (colza ou tournesol), à raison de 1/3 d'HE d'eucalyptus pour 2/3 d'huile de table. Vaporiser les sujets tous les jours. Les acariens meurent dans le 1er jour de traitement, mais pas les œufs. Ces œufs vont éclore dans 5 à 6 jours. Il est conseillé de traiter les sujets sur une période de minimum une semaine.
La gale des pattes	-croute jaunâtre sur les pattes -les écailles se redressent sur les pattes -les pattes finissent par se déformer Si l'affection est trop importante : -gangrène -perte des doigts -mort	Elle est provoquée par un acarien, qui redresse les écailles des pattes. Il pond ses œufs sous la peau. Au fil des semaines les pattes des poules sont recouvertes d'une croute jaunâtre qui augmente en volume avec le temps et finissent par être déformées. Quand l'invasion devient trop importante, la gangrène s'installe et la poule perd ses doigts un par un avant de mourir. Plus le traitement sera commencé rapidement, plus votre poule aura des chances de guérir, la gangrène sera évitée, ainsi que la contamination des autres poules.	-Savon noir liquide (boutique de produits naturels) -Vaseline -BAG BALM (ou tout autre produit désinfectant, anti germe) Méthode: Étape 1 Tous les jours, durant 7 jours -tremper les pattes de la poule dans l'eau chaude contenant le savon noir liquide environ 10 minutes (1 bouchon pour 5 litres d'eau). Cela ramollira les croutes. Si vous enveloppez votre poule dans un grand drap, elle ne se débattra pas. Séchez les pattes avec un torchon et appliquez le désinfectant (BAG BALM) avec un pinceau sur les pattes et dans tous les replis des doigts. Appliquez ensuite la vaseline sur les pattes et les doigts Étape 2 Continuez ensuite les traitements sans les bains pendants encore une 10aine de jours, aux deux jours.

	Portez des gants vaisselle
	durant l'opération
	Si jamais des doigts
	tombent, pas
	d'inquiétudes. Avec une
	bonne désinfection, cela
	devrait cicatriser. Au bout
	d'une 15aine de jours, vos
	poules devraient déjà avoir
	retrouvé un aspect presque
	normal.

Traité sur les produits naturels pour les poules :

ABCES DE LA PATTE OU DU DOIGT

Laisser tremper la patte dans l'eau tiède pour "ramollir" la peau, retirer la nécrose et curer le pus.

- cataplasmes d'argile verte : mélanger dans un récipient en verre avec une cuillère en bois de l'argile verte sans de l'eau de source ou en bouteille ou mettre du romarin en poudre.

AFFECTION VIRALE

- Thym: le plus efficace et rapide en huile essentielle.
- Oignon : antiviral pour éviter la contagion Recette contre l'affection virale : ingrédients
- : 5 litrés d'eau
- : 1 kilo d'oignons
- :3-4 tête d'ail

Couper les oignons et l'ail sans les éplucher

Laisser macérer dans un seau avec un couvercle, jusqu'à ce que vous n'entendez plus de pétillement (ce processus est une fermentation, vous pouvez d'ailleurs y ajouter un peu de sucre) Cette fermentation dure environ une quinzaine de jours.

Après cette prériode de fermentation, vous pouvez vous en servir. : Ajouter 2 à 3 cuillère à soupe de cette préparation par Litre d'eau donné aux volailles.

ANEMIE

Suite à une infestation de poux à cause des piqûres la poule peut souffrir d'un manque de fer : donner du boudin avec un peu de persil haché ou des légumes riches en fer :

les choux verts,

le cresson,

le pissenlit de printemps,

les feuilles de navets,

les feuilles d'orties fraîches - à faire en velouté avec des pommes de terre -

les salades chicorées frisées et scaroles,

les fanes de radis,

les poireaux,

les cébettes - petits oignons tendres de printemps -

les bettes, etc ...

la salade verte n'est qu'un apport en fibre

(le boudin est un aliment riche en souffre. Cet aliment soigne aussi les voies respiratoires.)

ANTIBIOTIQUES NATURELS DES VOIES RESPIRATOIRES

- Pour lutter contre le Coryza, eucalyptus et thym en infusion ou en huile essentielle+ vitamines dans l'eau

CANNIBALISME OU PICAGE:

une carence alimentaire en protéines

un manque de nourriture et / ou d'eau

selon certaines sources, le fait que la poule n'ait pas les moyens de prendre des bains de poussière

CROISSANCE DES POUSSINS

- levure de bière
- Huile de foie de morue
- graines d'Amarante
- feuilles d'orties hachés
- Caillé : Préparation :

Chauffer le lait de 30-32 degrés, le faire cailler avec de la présure et le laisser reposer jusqu'au lendemain.

Le caillé se trouve pris en bloc et facile à séparer du sérum qui est employé pour les poules et cog .

Pour le premier mois, il faut le caillé d'un litre de lait pour 12 à 15 poussins.

Le deuxième mois, un litre pour 8 à 10 poussins.

Donner aux poussins le caillé avec du remoulage, farine d'orge blutée - et farine de maïs en quantité égale, verdure (salade, oscille, chicorée, choux) le tout finement hache humecté au lait écrémé.

J'ajoute les œufs clairs , cuits durs, blanc et jaune , a raison d'un œuf pour 25 poussins pendant les 15 premiers jours. Cette pâtée est à donner 2 fois par jour.

COCCIDIOSE

- Curcuma et Origan frais ou en poudre dans la pâtée ou dans l'eau
- l'absorption d'Aïl en association de Thym et Romarin crée un contexte gênant l'implantation des coccidies
- Vinaigre de cidre crée dans l'intestin et l'estomac un milieu acide non apprécié des coccidies verser 1c. à soupe dans 2.5 litres environ d'eau de boisson une fois par mois, et un peu plus (toutes les 3 semaines environ) lors des périodes chaudes et humides.

CONSTIPATION:

Augmenter la ration quotidienne de verdure : chou, cresson, épinard, ricin

COUVAISON

Pour encourager:

- graines de Tournesol
- graines de chanvre

DIARRHEE

Infusion de camomille romaine : 15 grammes de sommités fleuries dans 1 litre d'eau bouillante et donner 2-3 cuillères à soupe par jour dans un peu de vin.

ENTRETIEN DU POULAILLER

- Eloigner les bêtes et fermer le local. Faire brûler des tiges d'aïl séchées et du poivre de cayenne.
- Pour éloigner les mouches : suspendre un bouquet d'armoise sur lequel les mouches vont s'agglutiner puis le brûler; ou suspendre un bouquet de tanaisie ou une branche d'aulne.

GALE DES PATTES

Badigeonner, au moins 2 fois à trois jours d'intervalle, avec:

- Huile de Cade
- mélange 1/2 souffre et 1/2 huile végétale
- vaseline pour enduire les pattes après un des traitements ci-dessus pour éviter la réinfection;

INFECTIONS BACTERIENNES

en infusion ou huile essentielle ou les plantes fraîches et coupées en morceaux, le tout ajouté à la pâté ou dans le grain.

- Aïl
- Mélisse
- Thym

INFECTIONS INTERNES

- Ortie, plutôt préventif que curatif, donner graines ou feuilles, fraîches ou séchées

MANQUE DE CALCIUM

- donner, en complément des grains habituels des coquilles d'huîtres broyées, coquillages broyés (ou petits), escargots, coquilles d'oeufs bien écrasées et mélangées à de la pâtée
- Donner de l'eau pétillante.

MUE

- Huile de foie de morue, 1 c. à soupe par kilo de graines (attention à sa conservation)
- Levure de bière : contribue à la formation et à la qualité de la peau et des plumes régénérant "d'un peu tout" (métabolisme)

PLAIES

Pour nettoyer:

- lotion au Thym
- lotion à la Mélisse -
- pour arrêter une hémorragie ; laver la plaie dans une infusion de cupules de glands puis la soupoudrer de poivre noir ou de romarin en poudre.

POUSSINS

- pour les faire accepter par une poule, lui donner à boire d'abord pendant 3 jours du vin rouge (dilué avec un peu d'eau)

Ponte

- activer la ponte des poules avec du chou vert

RHUMATISMES

- Romarin, intégré à la nourriture ou en infusion dans l'eau de boisson

TONIQUE

-Tisane vermifuge et tonique pour les poules.

Quelques feuilles ou sommités fleuries de tanaisie

3 branches de romarin

3 branches de thym

2 grosses gousses d'ail

1 litre d'eau

Effeuiller le romarin et le thym dans l'eau froide, ajouter la tanaisie, puis les gousses d'ail épluchées et coupées en deux.

Porter à ébullition et laisser bouillir 10 minutes environ.

Laisser refroidir, filtrer et verser le liquide dans l'eau de boisson des volailles (1 litre de tisane pour 10 litres d'eau).

Pour une bonne santé des poules, ce traitement est à renouveler tous les mois.

VERS

- Aïl en gousse en préventif mais en l'association avec du Thym, pour éviter l'implantation et le développement des oeufs.
- Basilic : donner feuilles et fleurs fraîches à volonté
- graines de courges : contre Ténias et Ascaris.
- Menthe (menthe poivrée) donner feuilles et fleurs fraîches à volonté
- Tanaisie

Les plantes ou produits naturels et leurs bienfaits

Αïl

C'est, avec le thym, l'aliment préventif et curatif par excellence pour nos poulettes!!

Il devrait leur être donné au minimum une fois par mois, et sous toutes ses formes.

Antiseptique, antiviral, antispasmodique, bactéricide, vermifuge...

L'aïl renforce les défenses immunitaires, améliore la circulation du sang (fortifie le coeur, réduit la tension artérielle) et prévient des infestations par les parasites.

Le proposer en infusion dans l'eau de boisson permet d'être sûr que toutes les volailles en consomment à dose satisfaisante (voir la recette pour l'infusion dans le premier poste).

L'aïl peut être conservé dans l'huile : pour 1/2 litre d'huile, écraser les gousses d'une tête d'aïl, laisser macérer 5 jours, filtrer -donner aux poulettes 1 c. à soupe pour 2.5kg de graines 2 à 3 fois par semaine.

Par contre, il est possible que l'ail contienne une bactérie responsable du botulisme. Ainsi conservé dans l'huile (sans oxygène), les conditions sont optimales pour le développement de toxines. La consommation d'un produit détérioré peut mener à une intoxication alimentaire grave qui se manifeste par des symptômes tels des étourdissements, de la difficulté à respirer, à avaler. L'apparence, l'odeur et le goût d'une huile détériorée ne seront pas nécessairement modifiés, d'où l'importance de respecter les consignes suivantes :

- toujours garder au réfrigérateur l'ail conservé dans l'huile
- pour une conservation de plus d'une semaine, ajouter au mélange une pincée de sel ou 5 gouttes de vinaigre et bien mélanger.

Amarante

C'est THE plante à donner pour un bon développement des poussins et une grande forme des adultes!! Elle possède pour nos volailles (et pour nous-mêmes également) des tas de bienfaits détaillés ici : http://pronaturafrance.free.fr/amarante.html
Elle est riche en protéines, minéraux, vitamines, oligoéléments...

Les amarant(h)es se déclinent en plusieurs espèces (et présentes plusieurs couleurs du vert au pourpre), cultivées comme plantes ornementales ou potagères. Il s'agit de plantes peu exigeantes, qui pourront vivre dans une terre pauvre avec très peu d'eau (mais qui seront bien sûr plus vigoureuses et colorées dans une terre enrichie). La plante se reproduit seule, par semis.

Pour les humains, l'amarante est anti-inflammatoire, antiprurigineuse, astringente, diurétique, emménagogue... Elle est traditionnellement utilisée pour lutter contre les démangeaisons, la diarrhée, l'eczéma, les règles abondantes et les saignements du rectum. Elle serait également utilisée en cosmétologie pour les soins de la peau.

Germes de blé

- intéressant de donner en même temps que la levure de bière car agissent en synergie

Naturellement riche en vitamines B, E, magnésium, zinc, phosphore, fer, protéines et fibres.

Complète très bien l'alimentation céréalière des volailles, mais son prix le réserve plutôt à la fabrication de pâtées d'excellente qualité pour les poussins.

Huile de foie de morue

Source importante de vitamies A et D.

Cette huile est particulièrement indiquée en période de mue, en période de froid (hiver : administrer une fois par mois) ou en cas de faiblesse (après identification de la cause éventuelle et traitement).

Elle doit ête conservée au frais, dans un récipient étanche, à l'abri de l'air et de la lumière car sinon elle risque de s'oxyder et perd ses bienfaits.

Levure de bière

La levure de bière est l'appellation courante d'un champignon unicellulaire microscopique. Il s'agit principalement du Saccharomyces cerevisiae ou du Candida utilis.

Elle se distingue de la levure de boulanger par le procédé de déshydratation de la crème de levure. De plus, la levure de bière est inactive si les cellules ont été chauffées à plus de 40°C (mais elle conserve ses vitamines et ses minéraux). (Wikipédia)

Complément alimentaire très apprécié pour la vitamine B1 qu'elle contient, mais aussi autres du groupe B, des protéines et des polysaccharides. Elle a donc des bienfaits sur le peau, les plumes (et les poils), sur l'immunité; elle stimule l'appétit.

Existe aussi sous forme "enrichie"... en minéraux et/ou "vitaminée" (souvent au rayon "pigeons" du magasin).

Peu chère et facile d'utilisation (saupoudrer simplement sur la nourriture).

Thym

Antibactérien, antiseptique respiratoire, intestinal et urinaire, antispasmodique, stimulant la sécrétion de la bile, favorisant la digestion, diurétique, emménagogue, expectorant pectoral, stimulant général... Le thym possède autant de bienfaits pour nos poulettes que pour nous-mêmes!! Il peut être donné à manger aux volailles sous toutes ses formes, au moins une fois par mois à titre préventif (il dérange par exemple l'installation des coccidies), et plus en cas de symptômes (d'infection bactérienne, respiratoire, manque de tonus, etc).

En lotion, il peut être utilisé pour nettoyer les plaies et blessures (recette dans le premier message).

Infusion dans de l'eau : jeter 1 grosse poignée de thym frais dans 250ml d'eau froide et porter à ébullition; couvrir et laisser reposer hors du feu une vingtaine de minutes. A intégrer aux restes de pâtes, par exemple, ou de semoule ou encore dans du pain (en les laissant bien gonfler dans l'infusion) à raison de 2c. à soupe par poule par jour, pendant 4/5 jours.

Dans de l'huile : jeter une petite poignée de thym frais dans 200ml d'huile, laissé reposer 5 jours minimum, filtrer... A mélanger, aux graines des volailles par exemple, à raison d'une c. à soupe par kilo de graines. Conserver à l'abri de la lumière.

Huile essentielle de Thym (thym à linalol) - en curatif - une goutte par ration "normale" de nourriture pour deux/trois volailles, à diluer dans une cuillère d'huile végétale, donner pendant 5 jours, puis faire une pause de 2 jours avant de recommencer pour 5 jours; éventuellement, on peut mettre à disposition de toutes les volailles deux bacs d'aliments : l'un avec l'huile essentielle de thym et l'autre pas...en théorie, les poules iront d'elles-mêmes manger dans le bac qui leur convient...