

Preguntas de final
Lógica y computabilidad

Juan Vanecek

Actualizado a Abril 2017

1. Computabilidad

1. Probar que la clase de funciones computables es una clase PRC.

Tomado el: 2013-08-05

Solution:

Idea: una clase de función es PRC si están las iniciales y el resto se forma por composición o recursión. Lo que hay que demostrar es que las computables cumplen esto.

Demostración: Las funciones iniciales son computables, porque

- $n(x) = 0$ se computa con el programa vacío.
- $s(x) = x + 1$ se computa con el programa $\{Y \leftarrow X + 1\}$.
- $u_i(x_1, \dots, x_n) = x_i$ se computa con el programa $\{Y \leftarrow X_i\}$.

Falta ver que la clase de funciones computables está cerrada por (a) composición; y (b) recursión primitiva.

- (a) Si h se obtiene a partir de las funciones (parciales) computables f, g_1, \dots, g_k por composición, entonces h es computable.

$$h(x_1, \dots, x_n) = f(g_1(x_1, \dots, x_n), \dots, g_k(x_1, \dots, x_n))$$

Y esto es cierto porque el siguiente programa computa h :

```
Z1 ← g1(X1, ..., Xn)
⋮
Zk ← gk(X1, ..., Xn)
Y ← f(Z1, ..., Zk)
```

Y si f, g_1, \dots, g_k son computables, entonces h es computable.

- (b) Si h se obtiene a partir de f y g por recursión primitiva y ambas son computable entonces h es computable.

$$\begin{aligned} h(x_1, \dots, x_n, 0) &= f(x_1, \dots, x_n) \\ h(x_1, \dots, x_n, t+1) &= g(h(x_1, \dots, x_n, t), x_1, \dots, x_n, t) \end{aligned}$$

En efecto, el siguiente programa computa h :

```
Y ← f(X1, ..., Xn)
T ← 0
[A] IF T = Xn+1 GOTO E
Y ← h(Y, X1, ..., XN, T)
T ← T + 1
GOTO A
```

Y por lo tanto, si f y g son computable, h también.

2. Probar que una función es primitiva recursiva sii pertenece a toda clase PRC.

Tomado el: 2015-12-21, 2015-04-13, 2012-12-26

Solution:

Demostración: Una función es p.r. si se puede obtener a partir de las funciones iniciales por un número finito de aplicaciones de composición y recursión primitiva. Es la clase de funciones PRC más chica.

\Leftarrow) Como la clase de funciones p.r. es una clase PRC, luego si f pertenece a toda clase PRC, en particular f es p.r.

\Rightarrow) Supongamos que existe f p.r. y una clase C PRC.

Por definición de p.r., f se puede obtener a partir de funciones iniciales y por un número finito de aplicaciones de composición y recursión primitiva. Es decir, que existe una lista de funciones f_1, f_2, \dots, f_n tal que:

- f_i o bien es una función inicial (y por lo tanto está en C) o bien se obtiene por composición o recursión primitiva a partir de funciones f_j , con $j < i$ (y por lo tanto está en C).
- $f_n = f$

Por inducción, todas las funciones de la lista están en C . En particular $f_n = f \in C$.

3. Probar que la clase de funciones p.r. es la clase PRC más chica.

Solution: Se deduce de demostrar que una función es p.r. si pertenece a toda clase PRC.

4. Sean A y B dos conjuntos c.e. Demostrar que $A \cup B$ y $A \cap B$ son c.e. ¿Es $A \setminus B$ c.e.?

Tomado el: 2010-12-28

Solution:

Definición: Un conjunto A es c.e. cuando existe una función parcial computable $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que:

$$A = \{x : g(x) \downarrow\} = \text{dom}(g)$$

(En otras palabras, podemos decidir algorítmicamente si un elemento sí pertenece a A , aunque para elementos que no pertenecen a A el algoritmo se indefina)

Demostración: $A \cap B$

Sean p y q los números de los programas tales que

$$A = \{x : \Phi_p(x)\} \quad B = \{x : \Phi_q(x)\}$$

Si podemos encontrar un programa que se defina con las mismas entradas que definen a A y B , entonces estamos.

Sea R el siguiente programa:

$Y \leftarrow \Phi_p(x)$
 $Y \leftarrow \Phi_q(x)$

Notemos que $\Psi_R(x) \downarrow$ si y solo si $\Phi_p(x) \downarrow$ y $\Phi_q(x) \downarrow$.

En efecto, $A \cap B$ es c.e. porque

$$A \cap B = \{x : \Psi_R(x) \downarrow\}$$

Demostración: $A \cup B$

Tengo que encontrar un programa que me permita decidir si un elemento pertenece a A o a B .

Para ello vamos a usar la función $STP^{(n)}(x_1, \dots, x_n, e, t)$ que es $TRUE$ si y solo si el programa con número e termina en t o menos pasos con las entradas x_1, \dots, x_n .

Definimos R como:

```
[C]  IF  $STP^{(1)}(X, p, T)$  GOTO  $E$ 
      IF  $STP^{(1)}(X, q, T)$  GOTO  $E$ 
       $T \leftarrow T + 1$ 
      GOTO  $C$ 
```

Notemos que este programa chequea *al mismo tiempo* si un elemento pertenece al dominio de Φ_p o de Φ_q , ejecutando paso a paso los programas p y q .

En efecto $\Psi_R(x) \downarrow$ si y solo si $\Phi_p(x) \downarrow$ o $\Phi_q(x) \downarrow$:

$$A \cup B = \{x : \Psi_R(x) \downarrow\}$$

Demostración: $A \setminus B$

Supongamos que $A \setminus B$ fuera c.e. Sea A el conjunto de todos los programas, y B sólo de aquellos que paran cuando se les da como entrada su número de programa. $A \setminus B$ es entonces el conjunto de programas que no se detienen cuando se les da su número de programa como entrada.

Por definición, un conjunto es c.e. si podemos decidir algorítmicamente si un elemento pertenece o no. Es decir que $\text{HALT}(X, X)$ sería computable. Absurdo! Y esto vino de suponer que $A \setminus B$ era c.e.

5. Seas A y B conjuntos de una clase PRC C . Entonces $A \cup B$, $A \cap B$, y \bar{A} están en C .

6. Definir conjunto de índices. Enunciar y demostrar el Teorema de Rice.

Tomado el: 2017-03-17, 2016-05-09, 2015-04-13, 2014-12-11, 2014-03-07, 2014-02-14, 2013-08-05, 2012-12-26, 2010-12-28, 2010-03-16

Solution:

Definición: un conjunto de naturales A es un conjunto de índices si existe una clase de funciones $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ parciales computables C tal que $A = \{x : \Phi_x \in C\}$.

Teorema de Rice: Si A es un conjunto de índices tal que $\emptyset \neq A \neq \mathbb{N}$, A no es computable.

Demostración: Supongamos la clase de funciones C tal que $A = \{x : \Phi_x \in C\}$ computable. Sea $f \in C$ y $g \notin C$ funciones parciales computables. Sea $h : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ la siguiente función parcial computable:

$$h(t, x) = \begin{cases} g(x) & \text{si } t \in A \\ f(x) & \text{si no} \end{cases}$$

Por el teorema de la Recursión, existe e tal que $\Phi_e(x) = h(e, x)$. Luego,

- Si $e \notin A \Rightarrow h(e, x) = f(x) \Rightarrow \Phi_e = h = f \Rightarrow$ como $f \in C$, $\Phi_e \in C \Rightarrow e \in A$. Absurdo!
- Si $e \in A \Rightarrow h(e, x) = g(x) \Rightarrow \Phi_e = h = g \Rightarrow$ como $g \notin C$, $\Phi_e \notin C \Rightarrow e \notin A$. Absurdo!

7. Enunciar y demostrar el Teorema de la Recursión.

Tomado el: 2014-12-22

Solution:

Teorema de la Recursión: Si $g : \mathbb{N}^{n+1} \rightarrow \mathbb{N}$ es parcial computable, existe un e tal que

$$\Phi_e^{(n)}(x_1, \dots, x_n) = g(e, x_1, \dots, x_n)$$

Demostración: Sea S_n^1 la función del teorema del Parámetro, tal que:

$$\Phi_y^{(n+1)}(x_1, \dots, x_n, u) = \Phi_{S_n^1(u, y)}^{(n)}(x_1, \dots, x_n) \quad (1)$$

La función $(x_1, \dots, x_n, v) \mapsto g(S_n^1(v, v), x_1, \dots, x_n)$ es parcial computable, de modo que existe d tal que:

$$\Phi_d^{(n+1)}(x_1, \dots, x_n, v) = g(S_n^1(v, v), x_1, \dots, x_n)$$

Por 1 vale

$$\Phi_d^{(n+1)}(x_1, \dots, x_n, v) = \Phi_{S_n^1(v, d)}^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$$

Luego

$$g(S_n^1(v, v), x_1, \dots, x_n) = \Phi_{S_n^1(v, d)}^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$$

Como d está fijo, y v es variable, elegimos $v \leftarrow d$ y $S_n^1(d, d) \leftarrow e$, llegamos a lo que queríamos

$$g(e, x_1, \dots, x_n) = \Phi_e(x_1, \dots, x_n)$$

8. Enunciar y demostrar el Teorema de Punto Fijo.

Tomado el: 2014-03-07

Solution:

Teorema del Punto Fijo: Si $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es computable, existe e tal que $\Phi_{f(e)} = \Phi_e$.

Demostración: Considerar la función $g : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$, $g(z, x) = \Phi_{f(z)}(x)$.

Aplicando el Teorema de la Recursión, existe un e tal que para todo x ,

$$\Phi_e(x) = g(e, x) = \Phi_{f(e)}(x)$$

9. Enunciar Halt y demostrar que no es computable (con cualquiera de las demostraciones vistas).

Tomado el: 2014-12-11, 2010-02-23

Solution:

El problema Halt consiste en tratar de determinar si un programa P con número de programa y , y con entrada x termina.

Y ello se define con la función:

$$HALT(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } \Phi_y^{(1)}(x) \downarrow \\ 0 & \text{si } \Phi_y^{(1)}(x) \uparrow \end{cases}$$

Supongamos que HALT es computable. Construimos el siguiente programa Q :

[A] IF $\text{HALT}(X, X) = 1$ GOTO A

Supongamos que $\#Q = e$. Entonces

$$\Phi_e(x) = \begin{cases} \uparrow & \text{si } \text{HALT}(x, x) = 1 \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Entonces

$$\text{HALT}(x, e) = 1 \Leftrightarrow \Phi_e(x) \downarrow \Leftrightarrow \text{HALT}(x, x) \neq 1$$

Si bien e está fijo, x es variable. Llegamos a un absurdo con $x = e$.

10. Exhibir una función computable que no sea p.r. y demostrarlo.

Tomado el: 2010-02-23

Solution:

Sea la función $\tilde{\Phi}_e^{(n)}(x_1, \dots, x_n)$ computable que simula a la e -ésima función p.r. con entrada x_1, \dots, x_n .

Sea $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, definida como $g(x) = \tilde{\Phi}_x^{(1)}(x)$. Demostremos que g es computable pero no p.r.

Demostración: Claramente g es computable porque $\tilde{\Phi}$ lo es.

Supongamos que es p.r. $\Rightarrow f(x) = g(x) + 1$ es p.r. por composición $\Rightarrow \exists e$ tal que $\tilde{\Phi}_e = f$ por ser f p.r. $\Rightarrow \tilde{\Phi}_e(x) = \tilde{\Phi}_x(x) + 1$.

e está fijo pero x es variable. Así que instanciando $x = e$, llegamos a que $\tilde{\Phi}_e(e) = \tilde{\Phi}_e(e) + 1$. Absurdo!

11. Probar que la función $\tau : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que asigna a cada número natural positivo n el número de divisores positivos n y $\tau(0) = 0$, es una función recursiva primitiva.

Tomado el: 2014-10-21 (por Matemática)

Solution:

Una función es primitiva recursiva si se obtiene a través de las funciones iniciales por composición y/o recursión en finitos pasos.

Sea $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $f(a, b)$ devuelve la cantidad de divisores positivos desde 0 hasta b . Con a y b naturales.

Queremos que $\tau(n) = f(n, n) \forall n \in \mathbb{N}$ definiendo a f de la siguiente forma:

$$\begin{aligned} f(n, 0) &= n(n) \\ f(n, m+1) &= g(n, m, f(n, m)) \end{aligned}$$

Con

$$g(a, b, c) = \begin{cases} \text{suc}(u_3^3(a, b, c)) & \text{si } P \\ u_3^3(a, b, c) & \text{si } \neg P \end{cases}$$

Donde

$$P = u_1^3(a, b, c) \mid \text{suc}(u_2^3(a, b, c))$$

Veamos que:

- A) f cumple con el esquema de recursión primitivo.
- B) $n(n)$ es la función inicial nula aplicada a n .
- C) El predicado P usa la función proyección y la función “divide a” ($|$) que es primitiva recursiva.
- D) La función g es una división de casos disjuntos y usa las funciones iniciales de proyección y sucesor.

Por todo lo anterior, la función $f(n, m)$ es primitiva recursiva (con n y m naturales).

Falta ver que $\tau(n) = f(n, n)$. Probamos por inducción en el segundo parámetro.

- Caso base:

$$\tau(0) = 0$$

$$f(0, 0) = n(0) = 0$$

- Paso inductivo:

Se cumple la hipótesis inductiva $f(n, m)$ devuelve los divisores de n desde 0 hasta m . Ahora queremos ver para $m + 1$: $f(n, m + 1) = g(n, m, f(n, m))$. Abrimos los dos casos según el dominio de g :

1. Caso $n \mid (m + 1)$: $g(n, m, f(n, m)) = f(n, m) + 1$.

Entonces por H.I. al dividir $m + 1$ incremento en 1 a lo ya calculado en el paso recursivo anterior y éste calculo correctamente hasta m . Queda $f(n, m + 1) = f(n, m) + 1$.

2. Caso $\neg(n \mid (m + 1))$: $g(n, m, f(n, m)) = f(n, m)$.

Entonces por H.I. al no dividir $m + 1$ no sumo nada a lo ya calculado en el paso recursivo anterior y éste calcula correctamente hasta m . Queda $f(n, m + 1) = f(n, m)$.

Por lo tanto, $\tau(n) = f(n, n) \forall n \in \mathbb{N}$.

12. Dar un ejemplo de una función no computable de una variable tal que la imagen tenga tres elementos.

Tomado el: 2014-10-21 (por Matemática)

Solution: Sea f :

$$f(x) = \begin{cases} \text{Halt}(x, x) & \text{si } x \neq 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

La $\text{Img}(f) = \{0, 1, 2\}$. Tiene exactamente 3 elementos.

Supongamos que f es computable, entonces $\exists P$ programa que computa f .

Si $f(x) = 2$, entonces $x = 0$.

Si $f(x) = 0(\text{Halt}(x, x))$ o $f(x) = 1(\neg \text{Halt}(x, x))$, si y sólo si $\varphi_P(x) \downarrow$.

Sea $e = \#P$. Tomemos el caso particular: $x = e$. $H(e, e)$ determina si el programa e con entrada e termina o no.

Como vimos en las teóricas, f está resolviendo *halting problem*. Absurdo! pues Halt no es computable. Vino de suponer que $f(x)$ es computable.

Entonces $f(x)$ no es computable.

13. Probar que TOT no es c.e. ni co-c.e.

Tomado el: 2014-12-22, 2014-02-14

Solution:

Def. $TOT = \{e : \Phi_e(x) \text{ es total}\}$, y Φ_e es total sii $(\forall x)\Phi_e(x) \downarrow$.

Def. Un conjunto A es computablemente enumerable si y sólo si existe una función g parcialmente computable, $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $A = \{x : g(x) \downarrow\} = \text{Dom}(g)$.

Def. Un conjunto A es co-c.e. sii \bar{A} es c.e.

Demostración: TOT no c.e.

Supongamos que es c.e. $\Rightarrow \exists g$ parcial computable tal que $TOT = \text{Dom}(g)$.

Entonces existe e , tal que $\Phi_e(x) = \Phi_{g(x)}(x) + 1$. Notar que esto se define para todo x .

Como Φ_e es total, $e \in TOT$. Por lo tanto existe u tal que $g(u) = e$.

Luego, $\Phi_{g(u)}(x) = \Phi_{g(u)}(x) + 1$. Absurdo si $x = u$, y esto vino de suponer que TOT es c.e.

Demostración: TOT no co-c.e. (equivale a probar \overline{TOT} no c.e.).

Supongamos que \overline{TOT} c.e., existe entonces d tal que $\overline{TOT} = \text{Dom}(\Phi_d)$.

Definimos el siguiente programa P :

```
[C]  IF STP(1)(X, d, T) = 1 GOTO E
      T ← T + 1
      GOTO C
```

Tenemos

$$\Psi_P(d, x) = g(d, x) = \begin{cases} \uparrow & \text{si } \Phi_d \text{ es total} \\ 0 & \text{si no} \end{cases}$$

Por el Teorema de la Recursión: sea e tal que $\Phi_e(x) = g(e, x)$.

- Φ_e es total $\Rightarrow \forall x : g(e, x) \uparrow \Rightarrow \forall x : \Phi_e(x) \uparrow \Rightarrow \Phi_e$ no es total.
- Φ_e no es total $\Rightarrow \forall x : g(e, x) = 0 \Rightarrow \forall x : \Phi_e(x) = 0 \Rightarrow \Phi_e$ es total.

14. Probar que todo conjunto r.e. infinito contiene un conjunto recursivo infinito.

Tomado el: 2010-03-16

Solution:

Def. Un conjunto A es recursivamente enumerable si y sólo si existe una función f computable, $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $A = \{x : f(x) \downarrow\} = \text{Dom}(f)$.

Demostración: Primero probamos que si $B = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\}$, con f una función estrictamente creciente, parcialmente computable y total, entonces B es recursivo. Para verlo, basta ver el siguiente programa:

```
[A]  IF f(Z) = X GOTO B
      IF f(Z) > X GOTO E
      Z ← Z + 1
      GOTO A
[B]  Y ← 1
      GOTO E
```

computa Ψ_B . Este programa termina siempre, así que B es recursivo.

Ahora, sea A r.e. e infinito. Tenemos una función p.r. g que nos va dando los elementos de A . Definimos $f(0) = g(0)$ y suponiendo definida $f(k)$ para todo $k < n$, definimos $f(n) = g(\min_z (g(z) > f(n-1)))$.

Esta minimización es propia, pues A es infinito. Entonces, siempre podemos encontrar un elemento A mayor que todos los que tengamos. Esto nos da una f parcialmente computable, total, y estrictamente creciente. Si tomamos $B = \{f(n) : n \in \mathbb{N}\}$, tenemos que B es recursivo y que $B \subseteq A$.

15. Probar que si A es computable entonces es c.e. ¿Vale la vuelta? Justificar.

Solution: Sea P_A un programa para [la función característica de] A . Consideremos el siguiente programa P :

[C] IF $P_A(X) = 0$ GOTO C

Tenemos que:

$$\Psi_P(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in A \\ \uparrow & \text{si no} \end{cases}$$

Y por lo tanto $A = \{x : \Psi_P(X) \downarrow\}$.

La vuelta no es cierta. Lo demostramos con un contraejemplo.

Definimos $W_n = \{x : \Phi_n(x) \downarrow\}$ = el dominio del n -ésimo programa, y a $K = \{n : n \in W_n\}$. Observemos que $n \in W_n$ sii $\Phi_n(n) \downarrow$ sii $\text{HALT}(n, n)$. K es (a) c.e. pero (b) no computable.

(a) K es c.e. porque $K = \{n : \Phi_n(n) \downarrow\}$

(b) Supongamos que K fuera computable. Entonces \overline{K} también lo sería. Luego existe un e tal que $\overline{K} = W_e$. Por lo tanto

$$e \in K \Leftrightarrow e \in W_e \Leftrightarrow e \in \overline{K}$$

16. Probar que un conjunto $A \subseteq \mathbb{N}$ es computable sii A y \overline{A} son c.e.

Tomado el: 2015-12-21

Solution:

\Rightarrow) Si A es computable entonces \overline{A} es computable.

\Leftarrow) Supongamos que A y \overline{A} son c.e.

$$A = \{x : \Phi_p(x) \downarrow\} \quad \overline{A} = \{x : \Phi_q(x) \downarrow\}$$

Consideremos el programa P :

[C] IF $\text{STP}^{(1)}(X, p, T) = 1$ GOTO F
 IF $\text{STP}^{(1)}(X, q, T) = 1$ GOTO E
 $T \leftarrow T + 1$
 GOTO C
 [F] $Y \leftarrow 1$

Para cada x , vale que $x \in A$ o bien $x \in \overline{A}$. Entonces Ψ_P computa A .

17. Demostrar que A es computable sii A y \overline{A} son r.e.

Tomado el: 2017-03-07

18. Probar que $A \subseteq \mathbb{N}$ es c.e. sii es imagen de una función p.r.

Tomado el: 2016-05-09

2. Logica proposicional

1. Definir conjunto maximal consistente y probar que si Γ es m.c. entonces:

- a) $\varphi \in \Gamma$ o (exclusivo) $\neg\varphi \in \Gamma$
- b) $\varphi \in \Gamma$ sii $\Gamma \vdash \varphi$

Tomado el: 2016-05-09, 2015-12-21, 2014-03-07

Solution:

Def. Un conjunto $\Gamma \subseteq \text{FORM}$ es consistente si no existe $\varphi \in \text{FORM}$ tal que $\Gamma \vdash \varphi$ y $\Gamma \not\vdash \varphi$.

Def. Un conjunto $\Gamma \subseteq \text{FORM}$ es maximal consistente en SP si es consistente y para toda fórmula φ : o bien $\varphi \in \Gamma$, o existe ψ tal que $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ y $\Gamma \cup \{\varphi\} \not\vdash \psi$.

a) No puede ser que φ y $\neg\varphi$ estén en Γ porque sería inconsistente.

Supongamos que ninguna está. Como Γ es maximal y por proposición ($\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente sii $\Gamma \vdash \varphi$):

- $\Gamma \cup \{\varphi\}$ es inconsistente $\Rightarrow \Gamma \vdash \neg\varphi$
- $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente $\Rightarrow \Gamma \vdash \varphi$

Luego Γ es inconsistente.

b) Probar $\varphi \in \Gamma$ sii $\Gamma \vdash \varphi$.

\Rightarrow) Trivial porque o bien φ es axioma o consecuencia inmediata de Γ y por lo tanto $\forall v, v \models \varphi$.

\Leftarrow) Por el absurdo, asumimos que $\Gamma \vdash \varphi$ y $\varphi \notin \Gamma$. (Me corrigieron que era una hipótesis absurda)

2. Definir consistente, maximal consistente y demostrar el Lema de Lindenbaum.

Tomado el: 2014-12-11

3. Enunciar y demostrar el Lema de Lindenbaum para la lógica proposicional.

Tomado el: 2010-12-28, 2010-03-16

Solution:

Lema de Lindenbaum: Si $\Gamma \subseteq \text{FORM}$ es consistente, existe Δ maximal consistente tal que $\Gamma \subseteq \Delta$

Demostración:

Hay que encontrar el Δ tal que es m.c. y contiene a Γ .

Enumeremos todas las fórmulas $\varphi_1, \varphi_2, \dots$ y definimos:

$$\Gamma_i = \begin{cases} \Gamma & \text{si } i = 0 \\ \Gamma_{i-1} \cup \{\varphi_i\} & \text{si } \Gamma_{i-1} \cup \{\varphi_i\} \text{ es consistente} \\ \Gamma_{i-1} & \text{si no} \end{cases}$$

Luego definimos $\Delta = \bigcup_{i \geq 0} \Gamma_i$. Y terminamos. Δ es (a) consistente, (b) maximal y (c) contiene a Γ como queríamos.

(a) Si no fuera consistente, existiría ψ tal que: $\Delta \vdash \psi$ y $\Delta \not\vdash \psi$. En ambas derivaciones aparece únicamente $\{\gamma_1, \dots, \gamma_k\} \subseteq \Delta$. Sea j el mínimo índice tal que $\{\gamma_1, \dots, \gamma_k\} \subseteq \Gamma_j$. Entonces Γ_j es inconsistente, y esto es absurdo porque se construye de Γ_i consistentes.

(b) Es maximal. Supongamos que no: existe $\varphi \notin \Delta$, tal que $\Delta \cup \{\varphi\}$ es consistente. Debe existir un n tal que $\varphi_n = \varphi$. Y como $\varphi_n \notin \Gamma_n$ (porque sino estaría en Δ), entonces $\Gamma_{n-1} \cup \{\varphi_n\}$ es inconsistente. Luego $\Delta \cup \{\varphi_n\}$ es inconsistente. Absurdo!

(c) $\Gamma = \Gamma_0 \subseteq \Delta$.

4. Enunciar y demostrar el teorema de la Deducción.

Tomado el: 2014-02-14

Solution:

Teorema de la Deducción: Si $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$ entonces $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Demostración: Por inducción en la demostración de $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \psi$.

Supongamos que $\varphi_1, \dots, \varphi_n (= \psi)$ es una derivación de ψ a partir de $\Gamma \cup \{\varphi\}$.

Caso base ($n = 1$): la derivación es una sola fórmula ($\varphi_1 = \psi$). Queremos ver que $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Hay 3 posibilidades:

a) ψ es un axioma de SP.

$\Rightarrow \vdash \psi$ (Por ser axioma)
 $\Rightarrow \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ (por SP1)
 $\Rightarrow \vdash \varphi \rightarrow \psi$ (por MP 1,2)

b) $\psi \in \Gamma$

$\Rightarrow \Gamma \vdash \psi$ (por $\psi \in \Gamma$)
 $\Rightarrow \Gamma \vdash \psi \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)$ (por SP1)
 $\Rightarrow \Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$ (por MP 1,2)

c) $\psi = \varphi$. Vale porque $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$ (visto en clase)

Paso inductivo: HI: “para toda derivación ψ' a partir de $\Gamma \cup \{\varphi\}$ de longitud menor a n vale $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi'$ ”. Queremos ver que $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Hay 4 posibilidades:

a) ψ es un axioma de SP: igual que caso base.

b) $\psi \in \Gamma$: igual que en caso base.

c) $\psi = \varphi$: igual que en caso base.

d) ψ se infiere por MP de φ_i y φ_j ($i, j < n$). Sin pérdida de generalidad: $\varphi_j = \varphi_i \rightarrow \psi$.

Por HI “ $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi_i$ y la derivación tiene longitud menor a n ” vale: $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \varphi_i$

Por HI “ $\Gamma \cup \{\varphi\} \vdash \varphi_j$ y la derivación tiene longitud menor a n ” vale: $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \varphi_j \Rightarrow$
 $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow (\varphi_i \rightarrow \psi)$.

Por SP2 vale: $\vdash (\varphi \rightarrow (\varphi_i \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi_i) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi))$.

Por MP 2 veces: $\Gamma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

5. Usando (el teorema de) correctitud de la lógica proposicional probar que si (un conjunto de fórmulas) Γ es satisfacible entonces Γ es consistente.

Tomado el: 2015-04-13, 2013-08-05, 2012-12-26

Solution:

Supongamos que Γ es satisfacible, y sin embargo es inconsistente.

Por lo tanto, por satisfacibilidad existe v tal que $v \models \Gamma$.

Por inconsistencia, existe φ tal que $\Gamma \vdash \varphi$ y $\Gamma \not\vdash \varphi$.
 Por correctitud de SP, $\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$ y $\Gamma \not\vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \not\models \varphi$.
 Luego $\Gamma \models \varphi$ y $\Gamma \not\models \varphi$, y por último $v \models \varphi$ y $v \not\models \varphi$. Absurdo!

6. Sea Γ un conjunto de fórmulas de la lógica proposicional. Demostrar que si Γ es consistente entonces es satisfacible.

Tomado el: 2017-03-17

Solution:

Dado Γ consistente, construimos $\Gamma' \supseteq \Gamma$ m.c. (Por Lindenbaum).

Definimos la interpretación v tal que:

$$v(p) = 1 \text{ sii } p \in \Gamma'$$

Demostremos que $v \models \varphi$ sii $\varphi \in \Gamma'$ por inducción en la complejidad de φ (es decir, cantidad de \neg y \rightarrow que aparecen en φ).

Caso base ($\varphi = p$): Trivial por definición de v .

Paso inductivo: HI: $v \models \varphi$ sii $\varphi \in \Gamma'$ para toda φ de complejidad $< m$.

Sea φ de complejidad m . Hay 2 casos:

a) $\varphi = \neg\psi$ tiene complejidad m .

$$(\Rightarrow) v \models \varphi \Rightarrow v \not\models \psi \Rightarrow (\text{x HI}) \psi \notin \Gamma' \Rightarrow \neg\psi \in \Gamma' \Rightarrow \varphi \in \Gamma'$$

$$(\Leftarrow) \varphi \in \Gamma' \Rightarrow \psi \notin \Gamma' \Rightarrow (\text{x HI}) v \not\models \psi \Rightarrow v \models \neg\psi \Rightarrow v \models \varphi$$

b) $\varphi = \psi \rightarrow \rho$ tiene complejidad m .

$$(\Rightarrow) v \models \varphi \Rightarrow v \models (\psi \rightarrow \rho) \Rightarrow v \not\models \psi \text{ o } v \models \rho$$

$$- v \not\models \psi \Rightarrow (\text{x HI}) \psi \notin \Gamma' \Rightarrow \neg\psi \in \Gamma' \Rightarrow \Gamma' \vdash \neg\psi$$

Sabemos que $\vdash \neg\psi \rightarrow (\psi \rightarrow \rho)$. Por MP, $\Gamma' \vdash \psi \rightarrow \rho$.

Entonces $\psi \rightarrow \rho \in \Gamma'$.

$$- v \models \rho \Rightarrow (\text{x HI}) \rho \in \Gamma' \Rightarrow \Gamma' \vdash \rho$$

Sabemos por SP1 que $\vdash \rho \rightarrow (\psi \rightarrow \rho)$. Por MP, $\Gamma' \vdash \psi \rightarrow \rho$.

Entonces $\psi \rightarrow \rho \in \Gamma'$.

$$(\Leftarrow) v \not\models \varphi \Rightarrow v \models \psi \text{ y } v \not\models \rho \Rightarrow (\text{x HI}) \psi \in \Gamma' \text{ y } \rho \notin \Gamma' \Rightarrow \psi \in \Gamma' \text{ y } \neg\rho \in \Gamma' \Rightarrow \Gamma' \vdash \psi \text{ y } \Gamma' \vdash \neg\rho.$$

Sabemos que $\vdash \psi \rightarrow (\neg\rho \rightarrow \neg(\psi \rightarrow \rho))$. Aplicando MP 2 veces, $\Gamma' \vdash \neg(\psi \rightarrow \rho)$.

Por lo tanto, $\neg(\psi \rightarrow \rho) \in \Gamma'$. Entonces $\psi \rightarrow \rho \notin \Gamma'$.

7. Demostrar que $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente si y sólo si φ es consecuencia sintáctica de Γ .

Tomado el: 2014-12-22

Solution:

$$(\Leftarrow) \text{ Por propiedad: si } \Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi.$$

Por Teorema de la Deducción: $\Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$.

Por lo tanto, $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ es inconsistente.

$$(\Rightarrow) \text{ Por hipótesis: existe } \psi \text{ tal que } \Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \psi \text{ y } \Gamma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\psi.$$

Por Teorema de la Deducción: $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \psi$ y $\Gamma \vdash \neg\varphi \rightarrow \neg\psi$.

Se puede ver que: $\vdash (\neg\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow ((\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow \varphi)$.

Por MP 2 veces: $\Gamma \vdash \varphi$.

8. Demostrar la correctitud de SP: Si φ es teorema de la teoría Γ , es válido en toda interpretación de Γ ($\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$).

Solution:

Queremos ver que $\Gamma \vdash \varphi \Rightarrow \Gamma \models \varphi$. Supongamos que vale el antecedente. Es decir, existe una derivación $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ tal que $\varphi_n = \varphi$ y (a) φ_i es un axioma o (b) $\varphi_i \in \Gamma$ o (c) φ_i es una consecuencia inmediata de $\varphi_k, \varphi_l, k, l < i$.

Demostramos que $\Gamma \models \varphi$ por inducción en n (la longitud de la derivación):

$P(n) = \text{"si } \varphi_1, \dots, \varphi_n = \varphi \text{ es una derivación de } \varphi \text{ a partir de } \Gamma \text{ entonces } v \models \Gamma \Rightarrow v \models \varphi\text{"}$

Caso base ($n = 1$): Supongamos v tal que $v \models \Gamma$. Queremos ver que $v \models \Gamma \Rightarrow v \models \varphi$. Hay 2 posibilidades: o bien φ es axioma de SP, o pertenece a Γ . En ambos casos $v \models \varphi$.

Paso inductivo: Supongamos v tal que $v \models \Gamma$. Supongamos que vale $P(m)$ para todo $m \leq n$. Qvq vale $P(n+1)$. Supongamos $\varphi_1, \dots, \varphi_n, \varphi_{n+1} = \varphi$ es una derivación de φ a partir de Γ . Hay 3 posibilidades:

- φ es axioma de SP: igual que en caso base.
- $\varphi \in \Gamma$: igual que en caso base.
- φ es consecuencia inmediata de φ_i y $\varphi_j = \varphi_i \rightarrow \varphi$ ($i, j \leq n$). Por HI ($P(i)$ y $P(j)$), sabemos que $v \models \varphi_i$ y $v \models \varphi_i \rightarrow \varphi$. Entonces necesariamente $v \models \varphi$.

9. Sea Var el conjunto de variables proposicionales de la lógica proposicional. Probar que si $f : Var \rightarrow \{0, 1\}$ es una función entonces existe una valuación $v : F \rightarrow \{0, 1\}$ que extiende a f , donde F es el conjunto de las fórmulas de la lógica proposicional.

Tomado el: 2014-10-21 (por Matemática)

Solution:

Hay que probar a) la existencia y b) la unicidad de que existe una única valuación v que extiende a la función f .

- a) La existencia se prueba por inducción en la complejidad de la fórmula definiendo en cada caso cómo se evalúa.

Caso base: sea a tal que $comp(a) = 0$, entonces a es una variable proposicional, y por lo tanto $f(a)$ está definida. Vale entonces $v(a) = f(a)$.

Paso inductivo: supongamos válido $comp(a) = n$, siendo n la complejidad de a . Veamos si $comp(a) = n + 1$.

- Si $a = \neg b$, entonces $comp(b) = n$. Por H.I., $v(b)$ está definido. Queda que $v(a) = 1 - v(b)$.
- Si $a = b * c$, con $*$ $\in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$. Entonces $comp(b)$ y $comp(c)$ son menores a $n + 1$. Por H.I. $v(b)$ y $v(c)$ están definidos. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} v(a) &= \min(v(b), v(c)) & \text{si } a &= b \wedge c \\ v(a) &= \max(v(b), v(c)) & \text{si } a &= b \vee c \\ v(a) &= \max(1 - v(b), v(c)) & \text{si } a &= b \rightarrow c \end{aligned}$$

La función v queda definido para toda fórmula de cualquier complejidad.

- b) La unicidad se prueba suponiendo que existiese otra función de valuación w que extiende a f .

Consideremos el conjunto $I = \{a \in FORM \mid v(a) = w(a)\}$.

Como w también extiende a f , I contiene a todas las variables proposicionales. Como v y w son ambas valuaciones, I es cerrado por los conectivos por los que $FORM \subseteq I$. Es decir, $v(P) = w(P)$ para toda fórmula P .

Usando el teorema de que si un subconjunto S de A es cerrado por los conectivos y S contiene a todas las variables proposicionales entonces S contiene a todas las fórmulas.

(Unicidad basado en el apunte de lógica de Roberto Cignoli y Guillermo Martínez.)

3. Lógica de primer orden

1. Demostrar que si Γ (teoría de primer orden) tiene modelos arbitrariamente grandes, tiene un modelo infinito.

Tomado el: 2015-12-21, 2014-12-22

Solution: Definimos (en el lenguaje con sólo la igualdad):

$$\varphi_i = \text{"hay al menos } i \text{ elementos"} \quad \forall i \geq 2$$

Por hipótesis, todo subconjunto finito $\Gamma \cup \{\varphi_i | i \geq 2\}$ tiene modelo.

Por Compacidad -si todo subconjunto finito de Γ es satisfacible, entonces Γ es satisfacible-, $\Gamma \cup \{\varphi_i | i \geq 2\}$ tiene algún modelo \mathcal{M} . \mathcal{M} tiene que ser infinito.

Conclusión:

- \mathcal{A} es infinito sii $\mathcal{A} \models \{\varphi_i | i \geq 2\}$.
- No existe Γ tal que \mathcal{A} es finito sii $\mathcal{A} \models \Gamma$

2. Dado L un lenguaje de primer orden con igualdad. Decidir si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- a) Existe un conjunto Γ tal que $\Gamma \models A$ sii A tiene universo infinito. [Otra version: Existe Γ tal que A es modelo de Γ sii A es un modelo infinito.]
- b) Existe un conjunto Γ tal que $\Gamma \models A$ sii A tiene universo finito. [Otra version: Existe Γ tal que A es modelo de Γ sii A es un modelo finito.]
- c) El conjunto Γ del ítem 1 necesariamente es infinito.

Tomado el: 2013-08-05

3. Dar un conjunto de fórmulas Γ tal que Γ es válida si y sólo si el modelo que la satisface es infinito. ¿Existe una fórmula φ tal que φ es válida si y sólo si el modelo que la satisface es finito? ¿Por qué?

Tomado el: 2014-12-11

4. Demostrar que $\neg \exists \varphi$ tq es verdadera sii tiene modelo finito.

Tomado el: 2010-02-23

5. Sea $\mathcal{L} = \{0, S, <, +, \cdot\}$ con igualdad y sea $\mathcal{N} = \langle \mathbb{N}; 0, S, <, +, \cdot \rangle$ una \mathcal{L} -estructura de primer orden con la interpretación usual. Mostrar que existe un modelo de \mathcal{N} en donde valen todas las verdades de \mathcal{N} pero en donde existe un elemento inalcanzable (desde el 0, usando la función sucesor S).

Tomado el: 2015-04-13, 2012-12-26, 2010-12-28

Solution:

Sea:

$$\begin{aligned} \text{el lenguaje } \mathcal{L} &= \{0, S, <, +, \cdot\} \text{ con igualdad} \\ \text{la estructura } \mathcal{N} &= \langle \mathbb{N}; 0, S, <, +, \cdot \rangle \text{ con la interpretación usual} \\ \text{Teo}(\mathcal{L}) &= \{\varphi \in \text{FORM}(\mathcal{L}) : \varphi \text{ es sentencia y } \mathcal{L} \models \varphi\} \end{aligned}$$

Expandimos el lenguaje con una nueva constante c y definimos:

$$\Gamma = \{0 < c, S(0) < c, S(S(0)) < c, S(S(S(0))) < c, \dots\}$$

Para $\Gamma \cup \text{Teo}(\mathcal{N})$, cada subconjunto finito tiene modelo; por compacidad tiene modelo; y por Lowenheim-Skolem tiene un modelo numerable:

$$\mathcal{M} = \langle M; 0^{\mathcal{M}}, S^{\mathcal{M}}, <^{\mathcal{M}}, +^{\mathcal{M}}, \cdot^{\mathcal{M}}, c^{\mathcal{M}} \rangle$$

Sea \mathcal{M}' la restricción de \mathcal{M} al lenguaje original \mathcal{L} . Veamos que $\mathcal{N} \models \varphi$ sii $\mathcal{M}' \models \varphi$ para toda sentencia $\varphi \in \text{FORM}(\mathcal{L})$:

- $\mathcal{N} \models \varphi \Rightarrow \varphi \in \text{Teo}(\mathcal{N}) \Rightarrow \mathcal{M} \models \varphi \Rightarrow \mathcal{M}' \models \varphi$.
- $\mathcal{N} \not\models \varphi \Rightarrow \neg\varphi \in \text{Teo}(\mathcal{N}) \Rightarrow \mathcal{M} \models \neg\varphi \Rightarrow \mathcal{M}' \not\models \varphi$.

\mathcal{N} y \mathcal{M}' no son isomorfos: $c^{\mathcal{M}}$ es inalcanzable en \mathcal{M}' .

6. Probar que existen modelos no estándar de la aritmética en los que hay un elemento inalcanzable.

Tomado el: 2014-02-14

Solution: Vale la respuesta de la pregunta 5.

7. Mostrar un modelo no estándar de los naturales.

8. Mostrar que existe un modelo no estándar de la aritmética

Tomado el: 2016-05-09

Solution: Vale la respuesta de la pregunta 5.

9. Verdadero o Falso (Justificar):

$$\exists M \models \varphi \Leftrightarrow M \text{ es infinito.}$$

Tomado el: 2010-03-16

10. Enumerar (y explicar muy brevemente) los pasos de la demostración de completitud en Primer Orden y mostrar el modelo canónico utilizado en la demostración.

Tomado el: 2014-03-07

Solution:

Teorema de Completitud: Si $\Gamma \models \varphi$ entonces $\Gamma \vdash \varphi$.

Demostración: Sea \mathcal{L} un lenguaje fijo. Sea $\Gamma \subseteq \text{FORM}(\mathcal{L})$ consistente. Queremos construir un modelo canónico \mathcal{B} y una valuación v de \mathcal{B} tal que:

$$\mathcal{B} \models \varphi[v] \quad \forall \varphi \in \Gamma$$

Para ello:

1. Se expande \mathcal{L} a \mathcal{L}' con nuevas constantes \mathcal{C} que no aparecen en \mathcal{L} . Γ sigue siendo consistente bajo \mathcal{L}' .
2. Se agrega un conjunto $\Theta \subseteq \text{FORM}(\mathcal{L}')$ de testigos a Γ . $\Gamma \cup \Theta$ sigue siendo consistente.
3. Se aplica Lindenbaum para $\Gamma \cup \Theta$ y se obtiene $\Delta \supseteq \Gamma \cup \Theta$ maximal consistente.
4. Se construye el modelo canónico \mathcal{A} y valuación v (para el lenguaje \mathcal{L}') tal que $\mathcal{A} \models \varphi[v]$ sii $\varphi \in \Delta$, para toda $\varphi \in \text{FORM}(\mathcal{L}')$.
5. Se define \mathcal{B} como la restricción de \mathcal{A} a \mathcal{L} , concluyendo que Γ es satisfacible.

11. Sea $\mathcal{L} = \{c, f\}$ un lenguaje de primer orden con igualdad donde c es un símbolo de constante y f un símbolo de función unaria.

1. Definir $\varphi, \psi \in \text{FORM}(\mathcal{L})$ tal que:
 - φ sea verdadera sii c no pertenece al rango de f .
 - ψ sea verdadera sii f es inyectiva.
2. Para $\theta = (\varphi \wedge \psi)$, probar que si $A \models \theta$ entonces A es infinito.
3. Definir $\theta' \in \text{FORM}(\mathcal{L})$ tal que si A es infinito entonces $A \models \theta'$.
4. ¿Existe $\theta'' \in \text{FORM}(\mathcal{L})$ tal que A es infinito sii $A \models \theta''$? Justificar.

Tomado el: 2017-03-17

12. a) Definir el concepto de interpretación de un lenguaje de primer orden.
 b) Sea \mathcal{L} un lenguaje de igualdad y un símbolo de función binario f^2 . Encontrar un enunciado en este lenguaje que exprese que una operación binaria es conmutativa y asociativa.

Tomado el: 2014-10-21 (por Matemática)

Solution:

- a) La interpretación de un lenguaje de primer orden es una extensión del lenguaje que mapea cada símbolo constante, función k -aria y predicado k -ario a algún elemento del universo de interpretación.

Sea un lenguaje $L = \langle C, F, P \rangle$ para una interpretación se define:

- Un universo de interpretación, conjunto no nulo U_I . Ejemplo: Naturales.
- Para cada símbolo constante $c \in C$, mapea con un elemento $c_I \in C_I$.
- Para cada símbolo de función k -aria $\in F$, mapea con una función f_I de k variables sobre el universo U_I , $f_I : U_I^k \rightarrow U_I$.
- Para cada símbolo de predicado k -ario $\in P$, mapea a una relación k -aria P_I sobre el universo U_I .

- b) Conmutativo: $a = \forall x \forall y (f^2(x, y) = f^2(y, x))$

Asociativo: $b = \forall x \forall y \forall z (f^2(x, f^2(y, z)) = f^2(f^2(x, y), z))$.

La solución es $a \wedge b$.