ALGÈBRE LINÉAIRE II -

Exercices complémentaires – Feuille 2

Exercice 1. Soit
$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{-1+\sqrt{3}i}{2} \\ \frac{1-\sqrt{3}i}{2} & \frac{-1-\sqrt{3}i}{2} \end{pmatrix}$$
 et prenons $\zeta = \frac{-1+\sqrt{3}i}{2}$.

- 1. Est-ce que ζ est-elle une racine de l'unité ? Si oui, quel est l'ordre de ζ ? Réécrire A en fonction de ζ .
- 2. Prouver que $A^2 + \zeta A + 2\overline{\zeta}I_2 = O_2$.
- 3. En utilisant la formule précédente, justifier que A est inversible et calculer l'inverse de A.
- 4. Calculer A^{-1} via la méthode du pivot de Gauss et comparer avec le résultat précédent.

Exercice 2. Soit
$$A = \begin{pmatrix} \frac{-1+3i}{2} & 0 & \frac{-1-3i}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{-1+3i}{2} & \frac{1-3i}{2} & \frac{-1-3i}{2} \end{pmatrix}$$
.

- Soit $a = \frac{-1+3i}{2}$.
- 1. Exprimer A en fonction de a.
 - 2. Vérifier que $A^2 I_3 \neq O_3$ et prouver que $A^3 A = O_3$.
 - 3. À partir des arguments précédentes démontrer que A n'est pas inversible. Vérifier que A n'est pas inversible en calculant le déterminant.

<u>IMPORTANT</u>: Dans la suite, justifier que les matrices sont inversibles en calculant leurs déterminants.

Exercice 3. Trouver l'inverse de la matrice réelle $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ par la méthode du pivot de Gauss. Comparer le résultat obtenu avec celui de l'exercice 14 de la feuille 1.

Exercice 4. Calculer A^{-1} et B^{-1} en utilisant la méthode du pivot de Gauss où

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \\ -6 & -1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 1 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

et comparer le résultat avec l'exercice 13 de la feuille 1.

Exercice 5. Calculer A^{-1} en utilisant la méthode du pivot de Gauss où $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{pmatrix}$ et comparer le résultat obtenu avec celui de l'exercice 15 de la feuille 1.

Exercice 6. Soient les matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 4 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

- 1. Calculer A^{-1} et B^{-1} en utilisant la méthode du pivot de Gauss.
- 2. Vérifier les résultats avec un produit.

Exercice 7. Soient les matrices $P = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ et $Q = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ dans $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$. Calculer :

- 1. La matrice P^{-1} .
- 2. La matrice $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1}XP = Q$. [Remarque : utiliser calcul littéral]
- 3. La matrice $(PQP^{-1})^2$.

Exercice 8. Soit la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & a & 3 \\ 4 & 1 & -a \end{pmatrix}$$

- 1. Trouver les valeurs de a telles que A soit inversible.
- 2. Pour a=2, calculer A^{-1} en utilisant la méthode du pivot de Gauss.

Exercice 9. Résoudre par la méthode du pivot de Gauss les systèmes suivantes :

a)
$$\begin{cases} x + 2y + z &= 1 \\ 2x + y + 2z &= 2 \\ x + y + z &= 1 \end{cases}$$
 b)
$$\begin{cases} x + 2y + 3z &= 1 \\ y + 2z &= 0 \\ x + 3y &= 1 \end{cases}$$

c)
$$\begin{cases} x+y-z &= 1\\ x-y+z &= 1\\ -x+y+z &= 1 \end{cases}$$
 d)
$$\begin{cases} 3x-2y+4z &= 8\\ 2x+3y-3z &= 4\\ x-3y-5z &= -6\\ 4x+4y+6z &= 18 \end{cases}$$

Exercice 10. Résoudre par la méthode du pivot de Gauss le systèmes suivante, en posant comme paramètres libres les inconnues de subindice plus grande :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - x_5 &= 0 \\ x_1 + x_3 - x_5 &= 0 \\ 3x_1 + x_2 + x_4 - 2x_5 &= 0 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 + x_4 &= 0 \end{cases}$$

Exercice 11. Étudier l'existence et déterminer les solutions pour $a \in \mathbb{R}$ du système :

$$\begin{cases} x - ay = 2 \\ ax - y = a + 1 \end{cases}$$

Exercice 12. Étudier l'existence et déterminer les solutions pour $a \in \mathbb{R}$ du système :

$$\begin{cases} x + y + az &= 1\\ 2x + z &= 2 \end{cases}$$

Exercice 13 (Extra ball). Étudier l'existence et déterminer les solutions pour $m \in \mathbb{R}$ du système :

$$\begin{cases} x - my + m^2z &= m \\ mx - m^2y + mz &= 1 \\ mx + y - m^3z &= -1 \end{cases}$$