

문자와 식 모의고사 A — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

유형 1~7 에서 기본·보통 난이도로 14 문항 · 단원 전체 점검

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X 가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

| 번호 | 정답                      | 이렇게 써도 맞아요                                        | X 일 때 볼 오개념 카드 |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| 1  | 6a 원                    | 6a 원 / a × 6 을 정리한 6a                             | 1번             |
| 2  | ab <sup>2</sup>         | ab <sup>2</sup> / ab <sup>2</sup>                 | 1번, 4번         |
| 3  | 5                       | 5                                                 | 6번             |
| 4  | (1) 2 / (2) 4 / (3) -7  | (1) 2개 (2) 4 (3) -7 / 항 2개, 계수 4, 상수항 -7          | 8번, 9번         |
| 5  | 2x + 4                  | 4 + 2x                                            | 12번            |
| 6  | 4x + 2                  | 2 + 4x                                            | 12번            |
| 7  | 12x - 8                 | -8 + 12x                                          | 14번            |
| 8  | (5000 - 2a) 원           | 5000 - 2a (원) / (5000 - 2a) 원                     | 1번             |
| 9  | $\frac{ab}{3}$          | ab/3 / (1/3)ab / ba/3                             | 3번, 5번         |
| 10 | 22                      | 22                                                | 7번             |
| 11 | ②, ④                    | 2, 4 / ②④                                         | 11번            |
| 12 | x <sup>2</sup> + 7x - 5 | x <sup>2</sup> + 7x - 5 / x <sup>2</sup> + 7x - 5 | 4번, 12번        |
| 13 | 4x + 7                  | 7 + 4x                                            | 13번, 14번       |
| 14 | -5                      | -5 (x 항이 모두 없어져요)                                 | 13번, 14번       |

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 1  | ○ △ X |                   |           |
| 2  | ○ △ X |                   |           |
| 3  | ○ △ X |                   |           |

| 번호 | ○ △ X | X 였다면 · 오개념 카드 번호 | 다시 풀어 본 날 |
|----|-------|-------------------|-----------|
| 4  | ○ △ X |                   |           |
| 5  | ○ △ X |                   |           |
| 6  | ○ △ X |                   |           |
| 7  | ○ △ X |                   |           |
| 8  | ○ △ X |                   |           |
| 9  | ○ △ X |                   |           |
| 10 | ○ △ X |                   |           |
| 11 | ○ △ X |                   |           |
| 12 | ○ △ X |                   |           |
| 13 | ○ △ X |                   |           |
| 14 | ○ △ X |                   |           |

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

| 번호 | 무엇을 헛갈렸나                                                 | 몇 번 나왔나                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀     | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 3  | 나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀                       | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 4  | 거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 계수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌 | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 5  | 곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 왼쪽부터 차례로 처리하지 않고 편한 곳부터 계산함               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 6  | 대입할 때 생략된 곱셈 기호를 되살리지 않고 숫자를 문자 자리에 그대로 이어 붙임            | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 7  | 음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 8  | 항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 9  | 계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 - 를 빼놓고 씀)                      | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 11 | 문자가 없는 상수식도 일차식이라고 보거나, 최고차항의 계수가 0 이 되는 경우를 놓침          | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 12 | 동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)                  | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 13 | 괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠               | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| 14 | 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

### ③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

#### 1 곱셈 기호를 생략하는 순서를 거꾸로 씀 — 숫자를 문자 뒤에 붙이거나 문자 순서를 마음대로 씀

**괜찮아요** 쓰인 순서대로 그대로 옮겨 적는 건 아주 자연스러운 일이에요. 순서를 바꿔 써도 된다는 약속을 아직 안 써 봤을 뿐이에요.

**이렇게 볼까요**  $p \times 3$  과  $3 \times p$  에  $p$  대신 같은 수를 넣어 각각 계산해 보세요. 두 값이 다르게 나오나요?

**스스로 답해 봐요** 곱셈은 순서를 바꿔도 값이 같아요. 그렇다면 우리가 '쓰는 순서'로 정해 둔 약속은 무엇이 먼저였나요?

**확인 문제**  $\cdot m \times 7$  을 곱셈 기호 없이 쓰면 어떻게 될까요? \_\_\_\_\_

#### 3 나눗셈을 분수 꼴로 바꾸지 못하거나, 분자와 분모를 뒤바꿔 씀

**괜찮아요** 나눗셈 기호를 지우고 위아래로 옮겨 쓰라는 건 처음엔 낯설어요. 어느 쪽이 위로 가는지 헷갈리는 게 당연해요.

**이렇게 볼까요**  $p \div q$  와  $q \div p$  를 각각 분수로 써 보세요. 두 분수가 같은 수인가요?

**스스로 답해 봐요** 나눗셈에서 '나뉘는 수'는 기호의 앞에 있었나요, 뒤에 있었나요? 그 수는 분수에서 어디로 가야 할까요?

**확인 문제**  $\cdot m \div 9$  를 분수 꼴로 쓰면 어떻게 될까요? \_\_\_\_\_

#### 4 거듭제곱과 곱셈의 반복을 섞어 봄 — 제곱을 제수처럼 읽거나, 합의 제곱을 각 항의 제곱으로 나눠 줌

**괜찮아요** 지수는 작게 위에 쓰여서 눈에 잘 안 들어와요. 놓치기 쉬운 자리에 있는 게 사실이에요.

**이렇게 볼까요**  $m$  에 어떤 수를 넣어서 ' $m$  을 두 번 곱한 값' 과 ' $m$  을 두 배 한 값' 을 각각 구해 보세요. 두 값이 같나요?

**스스로 답해 봐요** '두 번 곱한다' 와 '두 배 한다' 는 서로 다른 말이에요. 지수는 둘 중 어느 쪽을 나타내나요?

**확인 문제**  $\cdot p$  를 세 번 곱한 것과  $p$  의 세 배 중,  $p$  의 세 제곱은 어느 쪽일까요? \_\_\_\_\_

#### 5 곱셈과 나눗셈이 섞인 식을 왼쪽부터 차례로 처리하지 않고 편한 곳부터 계산함

**괜찮아요** 곱셈은 순서를 바꿔도 되니까 나눗셈도 그럴 것 같죠. 아주 흔하고 이해할 만한 착각이에요.

**이렇게 볼까요**  $p \div q \times m$  을 왼쪽부터 계산한 것과, 뒤의 곱셈을 먼저 한 것을 나란히 써 보세요. 두 결과가 같은 식인가요?

**스스로 답해 봐요** 덧셈과 곱셈은 순서를 바꿔도 값이 같았어요. 뺄셈과 나눗셈도 그랬나요?

**확인 문제**  $\cdot m \div p \div q$  를 분수로 바꾸면  $p$  와  $q$  는 어디로 갈까요? \_\_\_\_\_

#### 6 대입할 때 생략된 곱셈 기호를 되살리지 않고 숫자를 문자 자리에 그대로 이어 붙임

**괜찮아요** 식에 곱셈 기호가 안 보이니까 자리만 바꾸면 될 것 같아요. 보이는 대로 읽은 거예요.

**이렇게 볼까요**  $9m$  의  $m$  자리에 어떤 수를 넣을 때 두 수를 나란히 붙여 쓰면 자릿수가 늘어난 다른 수가 돼요. 그게 우리가 하려던 계산인가요?

**스스로 답해 봐요** 숫자와 문자 사이에는 원래 어떤 기호가 숨어 있었나요? 대입할 때 그 기호는 어떻게 해야 할까요?

**확인 문제**  $\cdot 7t$  에서  $t$  에 3 을 넣으면 값이 얼마일까요? \_\_\_\_\_

#### 7 음수를 대입할 때 괄호를 쓰지 않아 부호가 섞이거나 제곱의 밑이 달라짐

**괜찮아요** 괄호 하나 빠뜨렸을 뿐인데 답이 완전히 달라지니 억울하죠. 그만큼 괄호의 힘이 세다는 뜻이에요.

**이렇게 볼까요** 밑이 음수인 제곱과, 음수 부호를 제곱 밖에 둔 것을 나란히 써 보세요. 두 값의 부호가 같나요?

**스스로 답해 봐요** 괄호는 '여기까지가 한 덩어리'라는 표시예요. 음수를 넣을 때 그 덩어리 안에 부호도 들어 가야 할까요?

**확인 문제**  $\cdot t$  에 음수를 넣어  $t$  를 제곱하면 결과의 부호는 어떻게 될까요? \_\_\_\_\_

**8** 항·계수·차수·상수항을 서로 바꿔 부름 (항의 개수를 묻는데 차수를 답하는 식)

**괜찮아요** 네 낱말이 한꺼번에 쏟아져 나와요. 뜻이 비슷해 보여서 섞이는 게 당연해요.

**이렇게 볼까요** 식 하나를 골라 + 와 - 에서 끊어 보세요. 끊어진 조각의 개수와, 한 조각 안에서 문자가 곱해진 횟수는 같은 수인가요?

**스스로 답해 봐요** 하나는 조각의 개수를 세고, 하나는 문자가 곱해진 횟수를 세요. 각각을 무엇이라고 부르기로 했나요?

**확인 문제**  $5t + 2$  에서 항은 몇 개이고 차수는 얼마일까요? \_\_\_\_\_

**9** 계수와 상수항을 부호 없이 읽음 (앞에 붙은 - 를 빼놓고 씀)

**괜찮아요** 부호는 항 앞에 살짝 떨어져 보여서 항의 일부라는 느낌이 잘 안 들어요.

**이렇게 볼까요** 식을 + 로만 이어진 모양으로 바꿔 써 보세요. 뺄셈이 있던 자리의 항은 어떤 부호를 달고 나타나나요?

**스스로 답해 봐요** 부호는 그 항의 주인일까요, 아니면 앞뒤 항을 잇는 연결 기호일 뿐일까요?

**확인 문제**  $3t - 8$  의 상수항은 무엇일까요? \_\_\_\_\_

**11** 문자가 없는 상수식도 일차식이라고 보거나, 최고차항의 계수가 0 이 되는 경우를 놓침

**괜찮아요** 숫자만 있어도 어엿한 식이니 일차식일 것 같아요. 차수가 0 이라는 말이 낯설 뿐이에요.

**이렇게 볼까요** 문자가 하나도 없는 식을 보세요. 그 식에서 문자가 곱해진 횟수를 세면 몇 번인가요?

**스스로 답해 봐요** 일차식이 되려면 가장 높은 차수가 몇이어야 했나요? 그보다 높은 차수의 항이 남아 있으면 어떻게 될까요?

**확인 문제**  $6$  은 일차식일까요? \_\_\_\_\_

**12** 동류항이 아닌 것을 합침 (문자가 다르거나 차수가 다른데 계수를 더함)

**괜찮아요** 정리하고 싶은 마음이 크면 눈에 보이는 것끼리 다 묶고 싶어져요. 좋은 감각이 살짝 앞서간 거예요.

**이렇게 볼까요** 사과 두 개와 연필 세 개를 한데 넣는다고 생각해 보세요. 합쳐서 '다섯 개' 라고 한 이름으로 부를 수 있나요?

**스스로 답해 봐요** 묶을 수 있으려면 문자만 같으면 될까요, 차수까지 같아야 할까요?

**확인 문제**  $4t$  와,  $4t$  의  $t$  를 제공한 항은 서로 묶을 수 있을까요? \_\_\_\_\_

**13** 괄호 앞의 - 를 괄호 안 첫 항에만 적용하고 나머지 항의 부호를 그대로 둠

**괜찮아요** 부호를 한 번 바꾸고 나면 할 일을 다 한 기분이 들어요. 앞의 - 가 어디까지 미치는지 눈에 안 보이니까요.

**이렇게 볼까요** 괄호 안에 항이 두 개인 뺄셈을 골라, 괄호를 풀기 전과 풀 뒤에  $t$  에 같은 수를 넣어 값을 비교해 보세요. 값이 달라졌다면 어딘가에서 부호를 놓친 거예요.

**스스로 답해 봐요** 괄호 앞의 - 는 괄호 전체에 붙은 것이었나요, 아니면 첫 항에만 붙은 것이었나요?

**확인 문제**  $-(t - 4)$  를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요? \_\_\_\_\_

**14** 괄호 앞의 수를 괄호 안 첫 항에만 곱하고 나머지 항에는 곱하지 않음

**괜찮아요** 한 번 곱하고 나면 일이 끝난 것처럼 느껴져요. 괄호 안이 길수록 더 그렇죠.

**이렇게 볼까요** 가로가 두 부분으로 나뉜 직사각형을 그려 보세요. 전체 넓이를 구할 때 높이를 한쪽 부분에만 곱해도 될까요?

**스스로 답해 봐요** 괄호 밖의 수는 괄호 안의 항 중 몇 개와 짝을 지어야 하나요?

**확인 문제**  $3(t + 2)$  를 괄호 없이 쓰면 어떻게 될까요? \_\_\_\_\_

**확인 문제 정답** — 1번  $7m$  — 숫자를 문자 앞에 써요 · 3번 분자가  $m$ , 분모가 9 인 분수예요 · 4번 세 번 곱한 쪽이에요 · 5번 둘 다 분모로 가요.  $m$  만 분자에 남아요 · 6번  $7 \times 3 = 21$  이에요 · 7번 양수가 돼요. 같은 음수를 두 번 곱하니깐요 · 8번 항은 2개, 차수는 1 이에요 · 9번  $-8$  이에요. 앞의 부호까지 포함해서 읽어요 · 11번 아니에요. 문자가 없어 차수가 0 인 상수식이에요 · 12번 묶을 수 없어요. 문자는 같지만 차수가 달라요 · 13번  $-t + 4$  예요. 두 항의 부호가 모두 바뀌어요 · 14번  $3t + 6$  이에요. 두 항 모두에 곱해요

## ④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

### 1. $6a$ 원

한 자루에  $a$  원인 볼펜 6자루의 값을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 단가  $\times$  개수 로 식을 세워 보세요. 곱셈 기호는 지우고 숫자를 문자 앞에 써요.

볼펜 한 자루가  $a$  원이므로 6자루의 값은  $a \times 6$  이에요. 곱셈 기호를 생략하고 숫자를 문자 앞으로 옮기면  $6a$  원이에요.

### 2. $ab^2$

$b \times a \times b$  를 곱셈 기호를 생략하여 간단히 나타내시오.

힌트 · 곱하는 순서를 바꿔도 결과는 같아요. 문자를 알파벳 순서로 모은 뒤 같은 문자를 거듭제곱으로 줄여요.

$b \times a \times b = a \times b \times b$  예요. 같은 문자  $b$  가 두 번 곱해졌으므로  $b^2$  으로 줄이고, 문자를 알파벳 순서로 쓰면  $ab^2$  이에요.

### 3. 5

$x = 3$  일 때,  $4x - 7$  의 값을 구하시오.

힌트 ·  $4x$  는 4 와  $x$  의 곱이에요.  $x$  자리에 수를 넣을 때 곱셈 기호를 다시 살려서 써 보세요.

$4x - 7$  에  $x = 3$  을 넣으면  $4 \times 3 - 7$  이에요. 곱셈을 먼저 하면  $12 - 7$  이므로 값은 5 예요.

### 4. (1) 2 / (2) 4 / (3) -7

다항식  $4x - 7$  에 대하여 다음을 각각 구하시오.

- (1) 항의 개수
- (2)  $x$  의 계수
- (3) 상수항

힌트 · 식을 + 와 - 에서 끊어 보세요. 상수항은 앞에 붙은 부호까지 함께 읽어야 해요.

$4x - 7$  은  $4x$  와  $-7$  두 개의 항으로 이루어져 있어요.  $x$  앞에 붙은 수가 계수이므로  $x$  의 계수는 4 예요. 문자가 없는 항이 상수항이고, 앞의 부호까지 포함해서  $-7$  이에요.

### 5. $2x + 4$

$4x + 3 - 2x + 1$  을 간단히 하시오.

힌트 · 문자가 붙은 항끼리, 문자가 없는 항끼리 따로 모아 보세요.

문자가 붙은 항은  $4x$  와  $-2x$  이고 계수끼리 계산하면  $(4 - 2)x = 2x$  예요. 문자가 없는 항은 3 과 1 이고 더하면 4 예요. 그래서  $2x + 4$  예요.

### 6. $4x + 2$

$(3x + 4) + (x - 2)$  를 계산하시오.

힌트 · 괄호 앞이 + 이면 괄호를 그냥 지워도 부호가 바뀌지 않아요.

괄호를 지우면  $3x + 4 + x - 2$  예요.  $x$  항은  $3x$  와  $x$  로  $4x$ , 문자가 없는 항은 4 와  $-2$  로 2 예요. 그래서  $4x + 2$  예요.

### 7. $12x - 8$

$4(3x - 2)$  를 전개하시오.

힌트 · 괄호 밖의 수는 안에 있는 항 하나하나에 모두 곱해요. 몇 번 곱해야 하는지 세어 보세요.

4 를 두 항 모두에 곱해요.  $4 \times 3x = 12x$  이고  $4 \times (-2) = -8$  이므로  $12x - 8$  이에요.

### 8. $(5000 - 2a)$ 원

5000 원을 내고 한 개에  $a$  원인 아이스크림 2개를 샀다. 거스름돈을 문자를 사용한 식으로 나타내시오.

힌트 · 거스름돈은 낸 돈에서 산 물건의 값을 뺀 것이에요. 아이스크림 값부터 식으로 써 보세요.

아이스크림 2개의 값은  $a \times 2 = 2a$  원이에요. 거스름돈은  $5000 - 2a$  원이고, 뒤에 단위를 붙일 때는  $(5000 - 2a)$  원 처럼 괄호로 묶어요.

### 9. $\frac{ab}{3}$

$a \div 3 \times b$  를 곱셈·나눗셈 기호를 생략하여 간단히 나타내시오.

힌트 · 왼쪽부터 차례로 하세요. 먼저  $a \div 3$  을 분수로 바꾼 다음  $b$  를 곱해요.

$a \div 3 = \frac{a}{3}$  이고, 여기에  $b$  를 곱하면 분자에  $b$  가 붙어요. 그래서  $\frac{ab}{3}$  이에요.

### 10. 22

$a = -3$  일 때,  $a^2 - 4a + 1$  의 값을 구하시오.

힌트 · 음수를 제공할 때는 괄호를 씌워야 밑이 음수 전체가 돼요. 괄호가 없으면 밑이 달라져요.

$a^2$  은  $(-3)^2 = 9$  예요.  $-4a$  는  $-4 \times (-3) = 12$  예요. 따라서  $9 + 12 + 1 = 22$  예요.

### 11. ②, ④

다음 ① ~ ④ 중 일차식인 것을 모두 고르시오.

- ①  $x^2 + 1$
- ②  $3x - 2$
- ③ 5
- ④  $-x + 4$

힌트 · 일차식은 가장 높은 차수가 꼭 1 이어야 해요. 문자가 아예 없는 식의 차수는 몇일까요?

① 은 가장 높은 차수가 2 라 이차식이에요. ③ 은 문자가 없어 차수가 0 인 상수식이라 일차식이 아니에요. ② 와 ④ 는 가장 높은 차수가 1 이므로 일차식이에요.

### 12. $x^2 + 7x - 5$

$2x^2 + 3x - x^2 + 4x - 5$  를 간단히 하시오.

힌트 · 문자가 같아도 차수가 다르면 묶을 수 없어요. 차수별로 줄을 나눠 정리해 보세요.

이차항은  $2x^2$  과  $-x^2$  이고  $(2 - 1)x^2 = x^2$  이에요. 일차항은  $3x$  와  $4x$  로  $7x$  예요. 문자가 없는 항은  $-5$  예요. 그래서  $x^2 + 7x - 5$  예요.

### 13. $4x + 7$

$(3x - 1) - (x - 4) + 2(x + 2)$  를 계산하시오.

힌트 · 괄호를 하나씩 처리해요. 앞의 - 괄호를 풀고, 뒤의 2 는 괄호 안 두 항 모두에 곱해요.

$-(x - 4) = -x + 4$  이고,  $2(x + 2) = 2x + 4$  예요. 모두 이어 쓰면  $3x - 1 - x + 4 + 2x + 4$  이고,  $x$  항은  $(3 - 1 + 2)x = 4x$ , 문자가 없는 항은  $-1 + 4 + 4 = 7$  이므로  $4x + 7$  이에요.

### 14. $-5$

$\frac{1}{2}(6x - 4) - 3(x + 1)$  을 계산하시오.

힌트 · 두 괄호를 각각 먼저 풀어요. 두 번째 괄호 앞의 - 도 잊지 말고 함께 곱해 주세요.

앞의 괄호를 풀면  $3x - 2$  예요. 뒤는  $3(x + 1) = 3x + 3$  이고 앞에 - 가 붙어  $-3x - 3$  이 돼요. 모두 이어 쓰면  $3x - 2 - 3x - 3$  이고,  $x$  항이 서로 없어져  $-5$  만 남아요.