

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Canespro kenőcs bifonazol, karbamid

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei 2 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Canespro kenőcs és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Canespro kenőcs alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Canespro kenőcsöt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Canespro kenőcsöt tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CANESPRO KENŐCS ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A kéz- és lábkörmök gombás fertőzéseinek körömtávolító kezelésére szolgáló készítmény, amely egyidejűleg gombaellenes hatással is rendelkezik.

2. TUDNIVALÓK A CANESPRO KENŐCS ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a Canespro kenőcsöt

- ha allergiás (túlérzékeny) a bifonazolra vagy karbamidra, vagy a Canespro kenőcs egyéb összetevőjére.

A Canespro kenőcs fokozott elővigyázatossággal alkalmazható

A készítmény ne kerüljön a szembe!

Naponta cserélni kell a törölközőt, és a kezelt bőrterülettel érintkező ruházatot!

Azoknál a betegeknél, akiknek korábban más gombaellenes készítmény (pl. ekonazol, klotrimazol, mikonazol) iránti túlérzékenység szerepel, óvatosság javasolt a Canespro kenőcs alkalmazásakor.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

Kölcsönhatások nem ismertek.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával.

Terhesség és szoptatás időszakában kerülni kell a Canespro kenőcs alkalmazását.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nem észlelték a készítménynek a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket befolyásoló hatását.

Fontos információk a Canespro kenőcs egyes összetevőiről

A készítmény gypjűviaszt (lanolin) tartalmaz, amely helyi bőrreakciókat okozhat (pl.: kontakt dermatitisz).

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CANESPRO KENŐCSÖT?

A köröm teljes gyógyulásához először a Canespro kenőcsöt, majd a Canesten Plus krémet kell használnia!

Szokásos adag

Amennyiben az orvos másképpen nem rendel, a Canespro kenőcsöt **naponta egyszer, lehetőleg este** kell a fertőzött körömre felvinni vékony rétegben.

Az kezelés ideje

1. Canespro kenőcs kezelés:

A Canespro kezelést addig kell folytatni, **amíg nem lehet már további megpuhult gombás körömananyagot eltávolítani** a körömkaparóval. Ez a fertőzés kiterjedésétől és a köröm vastagságától függően kb. 7-14 nap. Ezt követően Canesten Plus krémmel kell a kezelést folytatni.

Amennyiben nem biztos abban, hogy a körömelávolítást megfelelően elvégezte, kérjük, keresse fel kezelőorvosát.


2. Canesten Plus krém kezelés:

A beteg körömrész eltávolítása után a köröm kezelését Canesten Plus bifonazol krémmel kell folytatni naponta egyszer **kb. 4 héten keresztül**.


A köröm fertőzött részének Canespro kezeléssel elért óvatos eltávolítása, és az ezt követő Canesten Plus bifonazol krémmel történő kezelés döntő szerepet játszik a hosszútávú eredményességben.

Az alkalmazás módja








Az alábbi ábrán látható módon kell a kenőcsöt, a körömrészelőt és a vízálló tapaszt használni:



1. A lábat, illetve adott esetben a kezet kb. 10 percig meleg vízben kell áztatni, majd alaposan meg kell szárítani.



2. Ezután **egy csík** kenőcsöt kell az érintett körömre felvinni. Mivel a kenőcs - állagának köszönhetően - nem folyik, pontosan felvihető a célterületre. A kenőcsöt nem szabad bemasszírozni a körömbe!



3. A tapasz egyik felét az ujj felső részére kell tenni.

A kép a lábujj alsó részét ábrázolja.

FONTOS!

A nagylábujj kivételével minden ujra fél tapaszt kell használni.

4. Ezután a tapasz oldalán található fülecskéket rá kell hajtani és erősen rá kell nyomni az ujra.

5. Majd a tapasz másik felét rá kell hajtani az ujra és az oldalsó fülecskével rögzíteni kell.

6. A tapasz így megvédi a beteg körmöt, amelyet 24 órán át kell a védőkötésben hagyni.

7. 24 óra elteltével a védőkötsést el kell távolítani és a lábat, illetve kezét ismét meleg vízben kell áztatni 10 percig, majd alaposan meg kell szárítani.

8. Ezután a felpuhult beteg körömréteget a körömkaparóval el kell távolítani.

További fontos információk a Canespro alkalmazásával kapcsolatban

- A körmöt körülvevő bőrt általában nem kell letakarni a kenőccsel történő kezelés előtt. Kivételes esetben azonban előfordulhat irritáció, és ilyenkor a körmöt határoló bőrt ajánlatos cinkpasztával bekenni.
- A Canespro kenőcs csak a fertőzött körömanyagra hat, a köröm egészséges részei érintetlenek maradnak.
- A dobozban lévő tapasz mennyisége egy nagylábujj, vagy két másik ujj kezelésére elegendő. Amennyiben a dobozban lévő tapasz mennyisége nem elegendő a kezeléshez, úgy bármilyen vízálló ragtapasz felhasználható.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Canespro kenőcs is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Előfordulhatnak a körömszél, vagy körömágy helyi reakciói: irritáció, bőrvörösség, hámlás, bőrgyulladás, a bőr felázása, viszketés, bőrkiütés, körömbetegségek, a köröm elszíneződése.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A CANESPRO KENŐCSÖT TÁROLNI?

Legfeljebb 30°C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon, tubuson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható) után ne alkalmazza a Canespro kenőcsöt.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Canespro kenőcs?

A készítmény hatóanyagai: 1 g kenőcs 0,01 g bifonazolt és 0,40 g karbamidot (urea) tartalmaz.

Egyéb összetevők: gyapjúviasz (lanolin), fehér vazelin, fehér viasz.

Milyen a Canespro kenőcs külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Sárgás színű homogén kenőcs PE csavaros kupakkal lezárt alumínium tubusba töltve. A dobozban 1 db tubus (10g kenőcs) + 15 db vízhatlan tapasz + 1 db műanyag körömrészelő található.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Bayer Hungária Kft.

1123 Budapest, Alkotás u. 50.

Gyártó:

Bayer Pharma AG,
51368 Leverkusen,
Németország

és

Kern Pharma S.L.
Poligono Industrial Colón II
Venus, 72
08228 Terrassa (Barcelona)
Spanyolország

OGYI-T-6804/01

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2011. december