

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Canesten Plus bifonazol krém

bifonazol

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az optimális hatás érdekében elengedhetetlen a gyógyszer körültekintő alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen forduljon orvosához, ha tünetei néhány napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Canesten Plus bifonazol krém és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók Canesten Plus bifonazol krém alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Canesten Plus bifonazol krémet?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Canesten Plus bifonazol krémet tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A CANESTEN PLUS BIFONAZOL KRÉM ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Canesten Plus bifonazol krém hatóanyaga egy széles spektrumú gombaellenes szer.

Bőrfertőzést okozó gombák, úgynevezett dermatofiták, élesztőgombák, penészgombák és egyéb gombák (pl. *Malassezia furfur*) által okozott gombás bőrfertőzések, és *Corinebacterium minutissimum* fertőzések kezelésére alkalmas.

Gombás fertőzések gyakorlatilag a test minden részén előfordulhatnak. Gombás fertőzés tünete lehet a bőr kivörösödése vagy a környező bőrterületnél halványabb folt megjelenése, bőrgyulladás, viszketés, égő érzés, a bőr berepedezése vagy fehéres felázása, hólyag- vagy korpaképződés és hámlás.

A Canesten Plus bifonazol krém alkalmazható a láb, kéz, test és testhajlatok gombás fertőzéseinek és az ezzel járó tüneteinek kezelésére.

2. TUDNIVALÓK A CANESTEN PLUS BIFONAZOL KRÉM ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a készítményt:

- ha allergiás (túlérzékeny) a bifonazolra vagy a készítmény bármely egyéb összetevőjére.

A Canesten Plus bifonazol készítmény fokozott elővigyázatossággal alkalmazható:

- csecsemőknél csak orvosi felügyelet mellett szabad alkalmazni.

A Canesten Plus bifonazol krém nem kerülhet a szembe!

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

Nem végeztek olyan vizsgálatokat, amelyek a Canesten Plus bifonazol krém és más készítmények között fellépő kölcsönhatásokról nyújtanának információt.
Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

Terhesség és szoptatás

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene alkalmazni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Terhesség és szoptatás időszakában kerülni kell a Canesten Plus bifonazol krém alkalmazását, ilyen esetben kérje ki orvosa tanácsát.

Amennyiben szoptatás időszakában elkerülhetetlen a készítmény használata, a mell területén nem szabad alkalmazni.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Nem ismert ilyen hatás.

Fontos információk a Canesten Plus bifonazol krém egyes összetevőiről

A készítmény cetil-sztearil-alkoholt tartalmaz segédanyagként, ami helyi bőrreakciókat okozhat (pl. kontakt dermatitisz). Cetil-sztearil alkohol érzékenység esetén a Canesten Plus bifonazol spray alkalmazása javasolt.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CANESTEN PLUS BIFONAZOL KRÉMET?

A Canesten Plus bifonazol krémet **naponta egyszer** kell alkalmazni, lehetőleg este, lefekvés előtt. A készítményt vékony rétegben kell felvinni az érintett bőrterületre és bedörzsölni.

Az érintett bőrterületet minden kezelés előtt gondosan le kell mosni és utána alaposan meg kell szárítani.

Naponta cserélni kell a törülközőt és a kezelt bőrterülettel érintkező ruházatot.

A krém kis mennyisége (kb. 1 cm krémcsík) általában elegendő egy tenyérnyi nagyságú terület kezelésére.

Kezelés időtartama:

Ha az orvos másképp nem rendeli, a szokásos kezelési időtartamok a fertőzés típusától függően:

- | | |
|--|---------|
| - láb és lábujjak közötti gombásodás | 3 hét |
| - törzs, kéz és bőrredők gombásodása | 2-3 hét |
| - színes hámló bőrfelület (eritrazma) | 2 hét |
| - bőr felszíni gombás fertőzés (kandidiázis) | 2-4 hét |

A tartós gyógyulás érdekében a kezelést a tünetek megszűnése után célszerű még két hétig folytatni.

Értesítse kezelőorvosát, amennyiben:

- tünetei 1 héten belül nem javulnak, vagy éppen rosszabbodnak,
- a kezelés hatását túl erősnek, vagy túl gyengének tartja.

Ha elfelejtette alkalmazni a Canesten Plus bifonazol krémet:

Amennyiben este elmaradna a krém alkalmazása, akkor a következő reggel kell alkalmazni a folyamatosság biztosítása érdekében. Ne használjon kétszeres adagot, a kihagyott adag pótlására.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így a Canesten Plus bifonazol krém is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Felléphetnek múltó bőrreakciók, pl. hólyagképződés, kivörösödés, égő, viszkető érzés, hámlás, kontakt bőrgyulladás, bőrszárazság, ekcéma, csalánkiütés, bőrirritáció, felázás, valamint helyi túlérzékenységi (allergiás) reakciók is.

Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A CANESTEN PLUS BIFONAZOL KRÉMET TÁROLNI?

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon, tubuson feltüntetett lejárati idő (EXP) után ne alkalmazza a Canesten Plus bifonazol krémet. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy sürgőssé vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Canesten Plus bifonazol krém?

- A készítmény *hatóanyaga*: 1 g Canesten Plus bifonazol krém 0,01 g bifonazolt tartalmaz.
- *Egyéb összetevők*: benzil-alkohol, cetil-sztearil-alkohol, cetil-palmitát, oktil-dodekanol, poliszorbát 60, tisztított víz, szorbitán-sztearát.

Milyen a Canesten Plus bifonazol krém készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás
20 g krém membránykasztyóval ellátott, csavarmentes műanyag kupakkal lezárt, lakkbevonatú alumínium tubusba töltve. 1 db tubus (20 g) dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

Bayer Hungária Kft.

H-1123 Budapest, Alkotás u. 50., Magyarország

Gyártó:

Kern Pharma S.L.,

E-08228 Terrassa, Poligon Industrial Colon II, Spanyolország

OGYI-T-9767/02

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2011. október