

Uniwersytet Warszawski
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Filip Binkiewicz

Nr albumu: 332069

Własność A dla kompleksów kostkowych $CAT(0)$

**Praca licencjacka
na kierunku MATEMATYKA**

Praca wykonana pod kierunkiem
prof. dr hab. Sławomira Nowaka
Instytut Matematyki

Czerwiec 2015

Oświadczenie kierującego pracą

Potwierdzam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i kwalifikuje się do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego.

Data

Podpis kierującego pracą

Oświadczenie autora (autorów) pracy

Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną.

Data

Podpis autora (autorów) pracy

Streszczenie

Praca ta skupia się na dowodzie, iż kompleksy kostkowe $CAT(0)$ mają własność A.

Słowa kluczowe

Kompleks kostkowy $CAT(0)$, własność A

Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus)

11.0 Matematyka, Informatyka:

11.1 Matematyka

Klasyfikacja tematyczna

14 Algebraic Geometry

Tytuł pracy w języku angielskim

Property A for $CAT(0)$ cube complexes

Spis treści

| | |
|--|---|
| Motywacja | 5 |
| 1. Wprowadzenie | 7 |
| 1.1. Przestrzenie CAT(0) | 7 |
| 1.2. Kompleksy kostkowe CAT(0) | 8 |

Motywacja

Motywacja bpeaasdgdagafg

Rozdział 1

Wprowadzenie

Pierwszy rozdział tej pracy poświęcę przypomnieniu podstawowych definicji, twierdzeń i przykładów dotyczących jej tematu. Aby zachować ciągłość pracy, postaram się uniknąć przytaczania rozległych dowodów. Dla zainteresowanych w odpowiednich miejscach znajdą się odsyłacze do literatury.

1.1. Przestrzeń CAT(0)

Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną. Odcinkiem geodezyjnym nazywamy przekształcenie izometryczne $\mathbb{R} \supset I \xrightarrow{\rho} X$, gdzie $I = [a, b]$ jest odcinkiem. Przestrzeń X nazwiemy (jednoznacznie) geodezyjną, jeśli każde dwa punkty można połączyć (jednoznacznie wyznaczonym) odcinkiem geodezyjnym.

Przykład 1.1.1. Każda przestrzeń euklidesowa \mathbb{R}^n jest jednoznacznie geodezyjna, jak również każdy jej wypukły podzbiór. Sfera S^2 jest geodezyjna, ale nie jednoznacznie - dwa bieguny można połączyć ścieżką geodezyjną na nieskończenie wiele sposobów. Każdy spójny graf metryczny jest przestrzenią geodezyjną.

Dalej będziemy rozważać przestrzenie geodezyjne. Dla wygody przez $[x, y]$ będziemy oznaczać (dowolny) odcinek geodezyjny łączący $x \in X$ z $y \in X$ (a dokładniej obraz tego odcinka).

Zwróćmy uwagę, że jeśli X jest przestrzenią geodezyjną, to dla każdej trójki $(x, y, z) \in X^3$ istnieje trójka $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in (\mathbb{R}^2)^3$ taka, że $d(x, y) = d_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \bar{y})$, $d(x, z) = d_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \bar{z})$, $d(y, z) = d_{\mathbb{R}^2}(\bar{y}, \bar{z})$. Innymi słowy, każdemu trójkątowi z X można przypisać trójkąt z przestrzeni euklidesowej \mathbb{R}^2 o bokach takiej samej długości. Taki trójkąt jest wyznaczony jednoznacznie z dokładnością do izometrii przestrzeni \mathbb{R}^2 i nazwiemy go trójkątem porównania (x, y, z) .

Definicja 1.1.1. Powiemy, że przestrzeń geodezyjna X jest **CAT(0)**, jeśli dla każdej trójki $(x, y, z) \in X^3$ oraz punktu $p \in [y, z]$ oraz odpowiadającym im trójkątowi porównania $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) \in (\mathbb{R}^2)^3$ i punktowi $\bar{p} \in [\bar{y}, \bar{z}]$ zachodzi nierówność:

$$d(x, p) \leq d_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \bar{p})$$

Innymi słowy, w przestrzeniach CAT(0) trójkąty są „szczuplejsze” niż w przestrzeni euklidesowej. O takich przestrzeniach powiemy, że mają niedodatnią krzywiznę.

Przykład 1.1.2. Nietrudno jest o kilka przykładów takich przestrzeni:

- Każda przestrzeń euklidesowa \mathbb{R}^n jest CAT(0). Wówczas wymieniona nierówność jest po prostu równością.

- Graf metryczny jest przestrzenią CAT(0) wtedy i tylko wtedy, gdy jest drzewem.

Uwaga 1.1.1. Każda przestrzeń CAT(0) jest jednoznacznie geodezyjna.

Dowód. Przypuśćmy przeciwnie i niech $x, y \in X$ łączą dwa różne odcinki geodezyjne, powiedzmy $[x, y], [\bar{x}, \bar{y}]$. Wówczas istnieją $[x, y] \ni p \neq \bar{p} \in [\bar{x}, \bar{y}]$ takie, że $d(x, p) = d(x, \bar{p})$ oraz $d(y, p) = d(y, \bar{p})$. Wówczas trójkątowi (x, y, \bar{p}) w \mathbb{R}^2 odpowiada trójkąt zdegenerowany, zaś $d(p, \bar{p}) > 0$, co przeczy nierówności CAT(0) \square

Wniosek 1.1.1. Sfera S^2 nie jest przestrzenią CAT(0). Płaszczyzna \mathbb{R}^2 wyposażona w metrykę pochodzącą od normy ℓ_1 nie jest przestrzenią CAT(0)

1.2. Kompleksy kostkowe CAT(0)

Niech $K = [0, 1]^n$ będzie n -wymiarową kostką. Będzie to podstawowy „budulec” interesujących nas przestrzeni. Przez ścianę o kowymiarze równym 1 będziemy rozumieć zbiór

$$F_{i,\varepsilon} = \{x \in K : x_i = \varepsilon\}, \text{ dla } i = 1 \dots n \text{ oraz } \varepsilon \in \{0, 1\}$$

Wszystkie ściany o niższym kowymiarze (o wyższym wymiarze) można otrzymać jako przecięcie ścian o wyższym kowymiarze.

Definicja 1.2.1. Niech K, K' będą dwiema kostkami oraz $F \subset K, F' \subset K'$ będą ich ścianami. **Sklejeniem** (lub **przyłączeniem**) K z K' nazwiemy izometrię $\varphi : F \rightarrow F'$.

Definicja 1.2.2. Przypuśćmy, że \mathcal{K} jest zbiorem kostek (dla każdego $K \in \mathcal{K}$ istnieje $n(K) \in \mathbb{N}$ takie, że $K \simeq [0, 1]^{n(K)}$), zaś \mathcal{S} - zbiorem sklejeń elementów \mathcal{K} (każdemu $\varphi \in \mathcal{S}$ odpowiadają kostki $K = K(\varphi), K' = K'(\varphi) \in \mathcal{K}$ oraz ściany $F \subset K, F' \subset K'$. Załóżmy wreszcie, że taka para $(\mathcal{K}, \mathcal{S})$ spełnia następujące warunki:

1. Żadna kostka nie jest sklejona sama ze sobą.
2. Dla każdych dwóch kostek $K \neq K'$ istnieje co najwyżej jedno sklejenie K z K' .

Wówczas w następujący sposób można zdefiniować **kompleks kostkowy**:

$$X = \left(\bigsqcup_{K \in \mathcal{K}} C \right) / \sim$$

gdzie \sim dla każdego $\varphi \in \mathcal{S}$ utożsamia dziedzinę φ z jego obrazem, to znaczy:

$$\{x \sim \varphi(x) \mid \varphi \in \mathcal{S}, x \in \text{dom}(\varphi)\}$$

Uwaga 1.2.1. W ten sposób zdefiniowany kompleks kostkowy jest przestrzenią metryczną, przy czym metryka długości¹ indukowana jest z metryki euklidesowej na $[0, 1]^n \subset \mathbb{R}^n$. Odległość punktów x, y mierzona w metryce długości jest to infimum długości krzywych $\gamma : [a, b] \rightarrow X$ łączących x z y . Długość krzywej definiujemy następująco:

$$l(\gamma) = \sup_{a=t_0 \leq \dots \leq t_n=b} \sum_{i=0}^{n-1} d(\gamma(t_i), \gamma(t_{i+1}))$$

¹length metric