

高等热力学与统计物理第六次作业

董建宇

1 计算 Maxwell 分布下的最可几速度, 平均速度和速度分布的宽度, 即

$$\Delta v \equiv \sqrt{\langle (v - \langle v \rangle)^2 \rangle}$$

将结果用绝对温度和分子质量表达。并算出氢气和氧气以上各量在室温下的数值。

Maxwell 速度分布为:

$$f(\vec{v}) = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}.$$

求导可得:

$$\frac{df}{dv} = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} 4\pi v e^{-\frac{mv^2}{2kT}} \left(2 - \frac{mv^2}{kT}\right).$$

令 $\frac{df}{dv} = 0$, 可以解得最可几速度为:

$$v_1 = \sqrt{\frac{2kT}{m}}.$$

平均速度为:

$$\langle v \rangle = \int_0^\infty v f(\vec{v}) dv = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} 4\pi \int_0^\infty v^3 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} 2 \left(\frac{kT}{m}\right)^2 = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}.$$

速度平方的平均值为:

$$\langle v^2 \rangle = \int_0^\infty v^2 f(v) dv = \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} 4\pi \int_0^\infty v^4 e^{-\frac{mv^2}{2kT}} dv = \frac{3kT}{m}.$$

则速度分布的宽度为:

$$\Delta v = \sqrt{\langle v^2 \rangle - \langle v \rangle^2} = \sqrt{\left(3 - \frac{8}{\pi}\right) \frac{kT}{m}}.$$

在室温下 $T = 300K$, 氢气分子质量为: $m_{H_2} = 3.32 \times 10^{-24}g$, 氧气分子质量为: $m_{O_2} = 5.32 \times 10^{-23}g$, 代入数据可得, 对于氢气有:

$$v_1 = 1.58 \times 10^3 m/s; \langle v \rangle = 1.782 \times 10^3 m/s; \Delta v = 752 m/s.$$

对于氧气有:

$$v_1 = 395 m/s; \langle v \rangle = 445 m/s; \Delta v = 188 m/s.$$

- 2 由同一种分子组成的理想气体被隔膜分成两部分。每部分的体积，粒子数和温度如图所示。假设隔膜左右温度相同但密度不同，且系统与外界热绝缘。证明隔膜撤掉后气体的熵增加。

隔膜	
理想气体 A	理想气体 B
V_A, N_A, T_A	V_B, N_B, T_B

由于气体为理想气体，则初态的熵为：

$$S_A = \frac{3}{2}N_A k \ln \frac{2\pi m k T}{h^2} + N_A k \ln \frac{V_A}{N_A} + \frac{5}{2}N_A k,$$

$$S_B = \frac{3}{2}N_B k \ln \frac{2\pi m k T}{h^2} + N_B k \ln \frac{V_B}{N_B} + \frac{5}{2}N_B k.$$

则初态系统的熵为：

$$S_0 = S_A + S_B = \frac{3}{2}(N_A + N_B)k \ln \frac{2\pi m k T}{h^2} + \frac{5}{2}(N_A + N_B)k + N_A k \ln \frac{V_A}{N_A} + N_B k \ln \frac{V_B}{N_B}.$$

隔膜撤掉后，气体分子总数为： $N = N_A + N_B$ ，温度为： T ，体积为： $V = V_A + V_B$ 则气体的熵为：

$$S_1 = \frac{3}{2}(N_A + N_B)k \ln \frac{2\pi m k T}{h^2} + \frac{5}{2}(N_A + N_B)k + (N_A + N_B)k \ln \frac{V_A + V_B}{N_A + N_B}.$$

则熵变化量为：

$$\Delta S = S_1 - S_0 = (N_A + N_B)k \ln \frac{V_A + V_B}{N_A + N_B} - \left(N_A k \ln \frac{V_A}{N_A} + N_B k \ln \frac{V_B}{N_B} \right)$$

令 $x_1 = \frac{V_A}{N_A}$ ， $x_2 = \frac{V_B}{N_B}$ ， $\alpha = \frac{N_A}{N_A + N_B}$ ， $f(x) = \ln x$ ， 则可以计算：

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

即 $f(x)$ 为凹函数（上凸）。则有对于任意的 $\alpha \in (0, 1)$ ， 满足

$$f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) > \alpha f(x_1) + (1 - \alpha)f(x_2).$$

注意到熵的变化量为：

$$\Delta S = (N_A + N_B)k(f(\alpha x_1 + (1 - \alpha)x_2) - \alpha f(x_1) - (1 - \alpha)f(x_2)) > 0.$$

则隔膜撤掉后气体的熵增加。

- 3 在高温条件下， 即

$$\epsilon \equiv \frac{h^2}{2IkT} \ll 1$$

证明双原子气体的转动配分函数

$$q_r = \omega \left[\frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15}\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right]$$

和每个分子平均转动动能

$$u_r = kT \left[1 - \frac{1}{3}\epsilon - \frac{1}{45}\epsilon^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3) \right]$$

其中 ω 为核自旋的简并度

$$\omega = \begin{cases} (2s_A + 1)(2s_B + 1), & AB \\ \frac{1}{2}(2s_A + 1)^2, & AA \end{cases}$$

提示：可用 Euler-Maclaurin 公式计算修正项

令 $f(j) = (2j + 1)e^{-\epsilon(j^2+j)}$ ，则有：

$$\int_0^\infty f(j) dj = -\frac{1}{\epsilon} e^{-\epsilon(j^2+j)} \Big|_0^\infty = \frac{1}{\epsilon}.$$

$$f(0) = 1, \quad f(\infty) = 0.$$

$$\frac{df}{dj} = 2e^{-\epsilon(j^2+j)} - \epsilon(2j + 1)^2 e^{-\epsilon(j^2+j)}$$

$$f^{(1)}(0) = 2 - \epsilon, \quad f^{(1)}(\infty) = 0.$$

$$f^{(2)}(j) = \epsilon^2(2j + 1)^3 e^{-\epsilon(j^2+j)} - 6\epsilon(2j + 1) e^{-\epsilon(j^2+j)}.$$

$$f^{(3)}(j) = (-\epsilon^3(2j + 1)^4 + 12\epsilon^2(2j + 1)^2 - 12\epsilon) e^{-\epsilon(j^2+j)}.$$

$$f^{(3)}(0) = (-\epsilon^3 + 12\epsilon^2 - 12\epsilon), \quad f^{(3)}(\infty) = 0.$$

则有：

$$\begin{aligned} \sum_0^\infty f(j) &= \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{2} - \frac{1}{12}(2 - \epsilon) + \frac{1}{720}(-\epsilon^3 + 12\epsilon^2 - 12\epsilon) \\ &= \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15}\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2). \end{aligned}$$

对于 AB 型分子， $\Delta j = 1$ ，则有：

$$\begin{aligned} q_r &= (2s_A + 1)(2s_B + 1) \sum_{j=0}^\infty (2j + 1) e^{-\epsilon j(j+1)} \Delta j \\ &= (2s_A + 1)(2s_B + 1) \left[\frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15}\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right]. \end{aligned}$$

对于 AA 型分子， $\Delta j = 2$ ，当 j 为偶数时则有：

$$\begin{aligned} q_r &= (2s_A + 1)^2 \sum_{j, \Delta j=2}^\infty (2j + 1) e^{-\epsilon j(j+1)} \frac{\Delta j}{2} \\ &= \frac{1}{2} (2s_A + 1)^2 \sum_{i=0}^\infty (8i + 2) e^{-\epsilon(4i^2+2i)} \end{aligned}$$

其中 $i = j/2$ 。令 $g(i) = (8i + 2)e^{-\epsilon(4i^2 + 2i)}$ ，则可以计算：

$$\int_0^\infty g(i) di = -\frac{1}{\epsilon} e^{-\epsilon(4i^2 + 2i)} \Big|_0^\infty = \frac{1}{\epsilon}.$$

$$g(0) = 2, \quad g(\infty) = 0.$$

$$g^{(1)} = (8 - \epsilon(8i + 2)^2)e^{-\epsilon(4i^2 + 2i)}.$$

$$g^{(1)}(0) = 8 - 4\epsilon, \quad g^{(1)}(\infty) = 0.$$

$$g^{(3)} = (-\epsilon^3(8i + 2)^4 + 24\epsilon^2(8i + 2)^2 - 192\epsilon)e^{-\epsilon(4i^2 + 2i)}$$

$$g^{(3)}(0) = -\epsilon^3 + 24\epsilon^2 - 192\epsilon, \quad g^{(3)}(\infty) = 0.$$

则有：

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^\infty g(i) &= \frac{1}{\epsilon} + 1 - \frac{1}{12}(8 - 4\epsilon) + \frac{1}{720}(-\epsilon^3 + 24\epsilon^2 - 192\epsilon) \\ &= \frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15}\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2). \end{aligned}$$

同理可知，当 j 为奇数时，令 $k = (j - 1)/2$ ，可以计算得相同结果。则有双原子气体的转动配分函数为：

$$q_r = \omega \left[\frac{1}{\epsilon} + \frac{1}{3} + \frac{1}{15}\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right].$$

其中核自旋简并度为：

$$\omega = \begin{cases} (2s_A + 1)(2s_B + 1), & AB \\ \frac{1}{2}(2s_A + 1)^2, & AA \end{cases}$$

则每个分子的平均转动动能为：

$$u_r = -\frac{\partial \ln q_r}{\partial \beta} = -\frac{\hbar^2}{2I} \frac{\partial \ln q_r}{\partial \epsilon}$$

可以计算：

$$\ln q_r = \ln \omega - \ln \epsilon + \ln \left(1 + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon^2}{15} + \mathcal{O}(\epsilon^3) \right) = \ln \omega - \ln \epsilon + \frac{\epsilon}{3} + \frac{\epsilon^2}{90} + \mathcal{O}(\epsilon^3).$$

则平均转动动能为：

$$u_r = \epsilon kT \left(\frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{3} - \frac{1}{45}\epsilon + \mathcal{O}(\epsilon^2) \right) = kT \left(1 - \frac{1}{3}\epsilon - \frac{1}{45}\epsilon^2 + \mathcal{O}(\epsilon^3) \right).$$