Fundamentos Matemáticos

Conjuntos, Números Reales, Complejos, Matrices y Geometría Analítica

---

Dr. José Juan Zacarías

22 de octubre de 2026

UPEMOR

Contenido General

1. Definición de Matriz y Notación General

2. Operaciones básicas de matrices

Definición de Matriz y Notación General

Definition

Una matriz es un arreglo de números de la forma

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- los números a_{ij} se le llaman las entradas de la matriz.
- a_{ij} se encuentra ubicado en la fila i y en la columna j.
- A se dice que es una matriz de tamaño o dimensión $m \times n$.
- El conjunto de todas las matrices de dimensión $m \times n$ se denota por $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$.
- Para una matriz A, también se suele denotar A_{ij} la entrada $ij-$ésima.

Example (Elementos de una matriz)

Identificar las entradas, número de filas y columnas y tamaño de la siguiente matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Ejercicio. Identificar los elementos de la siguiente matriz

$$A = \begin{pmatrix} 7 & -1 & 7 \\ 4 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 9 \end{pmatrix}$$

Notación abreviada de una matriz:

$$A = (a_{ij}).$$

Esta notación es útil para cálculos algebraicos.

Definition (Vectores Fila y Columna)

Vector fila de dimensión n:

$$u = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \end{pmatrix}$$

Vector columna de dimensión m:

$$v = \begin{pmatrix} a_{11} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}$$

Example (Vector Fila y Vector Columna)

Consideremos dos ejemplos de matrices con una sola fila o columna:

1. **Vector Fila:** La matriz

$$u = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

   es un vector fila de dimensión 4.

2. **Vector Columna:** La matriz

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix}$$

   es un vector columna de dimensión 3.

Ejercicio. Construir dos vectores filas y dos vectores columnas, identificar su dimensión.

Definition (Vectores Fila y Columna de una Matriz)

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz de $m \times n$

1. Para cada $i \in \{1, \ldots, m\}$, la i-**ésima fila de** A, denotada por A_i, es el vector fila en $\mathbb{M}_{1\times n}(\mathbb{R})$ formado por sus elementos:

$$A_i = \begin{pmatrix} a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \end{pmatrix}$$

2. Para cada $j \in \{1, \ldots, n\}$, la j-**ésima columna de** A, denotada por A^j, es el vector columna en $\mathbb{M}_{m\times 1}(\mathbb{R})$ formado por sus elementos:

$$A^j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

Nota

Así, la matriz A se puede representar en bloques de vectores fila o de vectores columna:

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^1 & A^2 & \cdots & A^n \end{pmatrix}$$

Example (Vectores fila y columna de una matriz)

Identificar los vectores columnas y vectores columnas de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \\ 2 & 5 & 8 \\ -3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Sus vectores fila son:

$$A_1 = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 8 \end{pmatrix}, \quad A_3 = \begin{pmatrix} -3 & 7 & 1 \end{pmatrix}$$

Example

Sus vectores columna son:

$$A^1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Ejercicio

Identificar los vectores columnas y vectores columnas de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 & 9 \\ 1 & 7 & 6 & 5 \\ -4 & 0 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

Algunas matrices especiales

Definition

Una matriz A de dimensión mxn se dice una *matriz cuadrada* si $m = n$.

La diagonal de una matriz cuadradas son las entradas $a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn}$.

Definition

La matriz nula de dimensión $m \times n$, $O_3 = (a_{ij})$ se define como

$$a_{ij} = 0$$

.

La matriz identidad de dimensión $n \times n$, $I_n = (a_{ij})$ se define como:

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Example (Matriz identidad y matriz nula)

$$I_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad O_{4\times 3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Otras matrices especiales

Definition

Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada,

1. A es una **matriz diagonal** si $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$.
2. A es **triangular superior** si $a_{ij} = 0$ para $i > j$.
3. A es **triangular inferior** si $a_{ij} = 0$ para $i < j$.
4. A es **simétrica** si $a_{ij} = a_{ji}$.
5. A es **antisimétrica** si $a_{ij} = -a_{ji}$.

Example

$$D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

$$U = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -3 \\ 0 & 4 & 7 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad L = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 4 & 8 & -5 \end{pmatrix}$$

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -2 \\ 4 & 0 & 5 \\ -2 & 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad K = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -3 \\ -2 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

D es diagonal, U es triangular superior, L es triangular inferior, S es simétrica y K antsimétrica.

Ejercicio

Dar un ejemplo matriz triangular superior, triangular inferior, simétrica, antisimétrica de dimensión 5×5.

Operaciones básicas de matrices

Definition (Suma de Matrices y Producto por Escalar)

Sean (a_{ij}) y (b_{ij}) dos matrices de la misma dimensión $m \times n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$ un número real. Definimos

1. La **suma**
$$(a_{ij}) + (b_{ij}) = (a_{ij} + b_{ij})$$
2. El **producto por un escalar**
$$\alpha(a_{ij}) = (\alpha a_{ij})$$

Ejemplo de Suma y Producto por Escalar

Considere las matrices $A, B \in \mathbb{M}_{2\times 3}(\mathbb{R})$ y el escalar $\alpha = 3$:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 7 \\ 0 & 1 & -3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 4 & -2 \\ -1 & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

Suma de matrices: Se realiza término a término:

$$A + B = \begin{pmatrix} 2+3 & -5+4 & 7-2 \\ 0-1 & 1+6 & -3+5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 5 \\ -1 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

Producto por escalar: Se multiplica cada entrada de A por $\alpha = 3$:

$$3A = \begin{pmatrix} 3(2) & 3(-5) & 3(7) \\ 3(0) & 3(1) & 3(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 & -15 & 21 \\ 0 & 3 & -9 \end{pmatrix}$$

Nota

Solo puedes sumar matrices de la misma dimensión.

Ejercicio.

Realizar la suma $A + B$ y el producto por escalar αA, con $\alpha = 5$ y

$$A = \begin{pmatrix} -6 & -2 & 1 & 9 \\ 7 & 13 & -70 & 19 \\ 1 & 0 & -7 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -7 & -2 & 4 & 9 \\ 5 & 1 & -3 & 6 \\ 1 & 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$$

Theorem (Estructura de Espacio Vectorial)

El conjunto $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ con la suma y el producto por escalar satisface las siguientes propiedades para cualesquiera $A, B, C \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

1. $A + B = B + A$ *(Conmutatividad)*
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$ *(Asociatividad)*
3. $A + \mathbf{0} = A$ *(Neutro aditivo)*
4. $A + (-A) = \mathbf{0}$, *donde* $-A = (-1)A$ *(Inverso aditivo)*
5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$ *(Distributividad)*
6. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$ *(Distributividad)*
7. $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$ *(Compatibilidad)*
8. $1A = A$ *(Identidad escalar)*

Demostración. Verificaremos algunos incisos, lo demás queda como ejercicio. Supongamos que $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ y $C = (c_{ij})$.

Definition (Multiplicación de un vector columna por un vector fila)

Sean

$$u = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \end{pmatrix}, \quad v = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

un vector fila y un vector columna de la misma dimensión. Definimos su producto como

$$u \cdot v = v \cdot u = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n$$

Ejercicio

Calcular $u_1 \cdot v_1$ y $u_2 \cdot v_2$, donde

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 & 8 \end{pmatrix}, \quad v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 7 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 & 7 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 5 \\ -4 \\ 13 \\ -3 \end{pmatrix}$$