

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ №2, 3 КУРСА «ГАРМОНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»

Автор: Хоружий Кирилл

От: 17 мая 2021 г.

Содержание

1	Собственные интегралы с параметром	2
1.1	К. III, §13	3
2	Несобственные интегралы, зависящие от параметра	6
2.1	К. III, §14	6
2.2	T2	9
2.3	T3	10
2.4	К. III, §15	11
3	Интеграл Фурье и преобразование Фурье	14
3.1	К. III, §17	15
3.2	T4	17
3.3	T5	17
3.4	T6	18
3.5	T7	18
3.6	T8	19
3.7	T9	19
4	Третье задание по математическому анализу	20
4.1	Сходимость и полнота систем функций в пространствах C и L_p	20
4.2	Банаховы пространства и их двойственные	24
4.3	Распределения (обобщенные функции)	32
4.4	Преобразование Фурье обобщенных функций	37

Дополнительная задача о $\cos e^{ix}$

Найдём суммы вида

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left((-1)^n \frac{\cos(2nx)}{(2n)!} + i(-1)^n \frac{\sin(2nx)}{(2n)!} \right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{2inx}}{(2n)!},$$

далее, принимая $z = e^{ix}$, найдём по определению

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n e^{2inx}}{(2n)!} = \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = \cos(z) = \cos(e^{ix}).$$

1 Собственные интегралы с параметром

Thr 1.1 (непрерывность интеграла по параметру). Пусть $f: X \times E \mapsto \mathbb{R}$, где E – область определения α , а X для x . Пусть также $f(x, \alpha) \in \mathcal{L}(X) \quad \forall \alpha$, где $\mathcal{L}(X)$ – интегрируема по Лебегу на множестве X , $f(x, \alpha)$ непрерывна почти всюду по α , и $|f(x, \alpha)|$ мажорируется Лебег-интегрируемой функцией $\forall \alpha \in E$. Тогда

$$I(\alpha) = \int_X f(x, \alpha) dx$$

непрерывен.

Con 1.2 (непрерывность интеграла по параметру по Кудрявцеву). Если функция $f(x, \alpha)$ непрерывна в прямоугольнике

$$K = \{(x, \alpha) : a \leq x \leq b, \alpha_1 \leq \alpha_2\},$$

то интеграл

$$\Phi(\alpha) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\psi(\alpha)} f(x, \alpha) dx$$

есть непрерывная функция параметра α на отрезке $[\alpha_1, \alpha_2]$. В частности, возможен предельный переход под знаком интеграла:

$$\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \int_a^b f(x, \alpha) dx = \int_a^b \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} f(x, \alpha) dx.$$

Con 1.3. Пусть $f: [a, +\infty) \mapsto \mathbb{R}$. Если f непрерывна на $[a, +\infty) \times [c, d]$ и

$$I(\alpha) = \int_a^{+\infty} f(x, \alpha) dx$$

сходится равномерно по α на $[c, d]$, то $I(\alpha)$ непрерывен по α на $[c, d]$.

Thr 1.4. Пусть $f: X \times E \mapsto \mathbb{R}$, где E – область определения α , а X для x . Пусть также $f(x, \alpha) \in \mathcal{L}(X) \quad \forall \alpha$, где $\mathcal{L}(X)$ – интегрируема по Лебегу на множестве X , $\exists f'_\alpha(x, \alpha) \in \mathbb{R}$ почти всюду по α , и $|f'_\alpha(x, \alpha)|$ мажорируется Лебег-интегрируемой функцией $\forall \alpha \in E$ почти всюду. Тогда

$$I(\alpha) = \int_X f(x, \alpha) dx$$

дифференцируем E и $I'(\alpha) = \int_X f'_\alpha(x, \alpha) dx$.

Con 1.5. Пусть $f: [a, b] \times [c, d] \mapsto \mathbb{R}$, f и f'_α непрерывны на $[a, b] \times [c, d]$, то

$$I(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) \in C^1[c, d]; \quad I'(\alpha) = \int_a^b f'_\alpha(x, \alpha) dx.$$

Con 1.6. Пусть $I(\alpha) = \int_{a(\alpha)}^{b(\alpha)} f(x, \alpha) dx$. Для удобства выберем $a_0 = \inf_\alpha a(\alpha)$ и $b_0 = \sup_\alpha b(\alpha)$. Также требуем непрерывность f и f'_α на $[a_0, b_0] \times [c, d]$. Считаем, что $a(\alpha)$ и $b(\alpha)$ дифференцируемы. Тогда $I(\alpha)$ – дифференцируем по α на $[c, d]$. Более того, в таких условиях верна формула

$$I'(\alpha) = \int_{a(\alpha)}^{b(\alpha)} f'_\alpha(x, \alpha) dx + f(b(\alpha), \alpha) \cdot b'_\alpha(\alpha) - f(a(\alpha), \alpha) \cdot a'_\alpha(\alpha).$$

Con 1.7. Пусть функция $f: [a, +\infty) \times [c, d] \mapsto \mathbb{R}$. Если существует $\alpha_0 \in [c, d]$ такое, что

$$I(\alpha) = \int_a^\infty f(x, \alpha_0) dx$$

сходится, f и f'_α непрерывны на $[a, +\infty) \times [c, d]$, и

$$\int_a^\infty f'_\alpha(x, \alpha) dx$$

сходится равномерно по α на E , **тогда** $I(\alpha) \in C^1[c, d]$ и

$$I'_\alpha(\alpha) = \int_a^{+\infty} f'_\alpha(x, \alpha) dx.$$

Thr 1.8 (интегрирование интегралов, зависящих от параметров). Если функция $f(x, \alpha)$ непрерывна в прямоугольнике, то интеграл есть функция, интегрируемая на отрезке $[\alpha_1, \alpha_2]$ и справедливо

$$\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \left(\int_a^b f(x, \alpha) dx \right) d\alpha = \int_a^b \left(\int_{\alpha_1}^{\alpha_2} f(x, \alpha) d\alpha \right) dx.$$

1.1 К. III, §13

13.4

Пусть $f(x)$ непрерывна и принимает положительные значения на $[0, 1]$. Докажем, что функция

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\alpha}{x^2 + \alpha^2} f(x) dx$$

разрывна при $\alpha = 0$.

Функции $\varphi: \frac{\alpha}{x^2 + \alpha^2}$ и f Лебег-интегрируемы по x на $[0, 1]$, знакопостоянны $\forall x \in (0, 1)$, а также f — непрерывна, тогда можем воспользоваться первой теоремой о среднем

$$I(\alpha) = f(\xi(\alpha)) \arctg \frac{1}{\alpha}, \quad 0 \leq \xi(\alpha) \leq 1.$$

Тогда для $\forall \varepsilon > 0$

$$|F(\varepsilon) - F(-\varepsilon)| = \left| (f(\xi(\alpha)) + f(\xi(-\alpha))) \arctg \frac{1}{\varepsilon} \right| \geq 2 \inf_{x \in [0, 1]} f(x) \left| \arctg \frac{1}{\varepsilon} \right| \varepsilon \rightarrow 0 \pi \min_{x \in [0, 1]} f(x) > 0,$$

что говорит о разрывности функции.

13.5(1)

Выясним, справедливо ли равенство

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 f(x, \alpha) dx = \int_0^1 \lim_{\alpha \rightarrow 0} f(x, \alpha) dx,$$

где $f(x, \alpha) = \frac{x}{\alpha^2} e^{-x^2/\alpha^2}$.

Ну, вообще нельзя. Переходя к пределу под знаком интеграла, получаем нуль. Если же вычислить интеграл, а затем перейти к пределу, то получим

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \int_0^1 \frac{x}{\alpha^2} e^{-x^2/\alpha^2} dx = \frac{1}{2} \lim_{y \rightarrow 0} \int_0^1 e^{-x^2/\alpha^2} d\left(\frac{x^2}{\alpha^2}\right) = \frac{1}{2} \lim_{\alpha \rightarrow 0} (1 - e^{-1/\alpha^2}) = \frac{1}{2}.$$

Заметим, что f разрывна в точке $(0, 0)$, вот теоремы о предельном переходе и не работает, необходимо проверять вычислением.

13.8(3)

Выясним, равны ли интегралы

$$I_1(\alpha) = \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, \alpha) d\alpha \right) dx \stackrel{?}{=} \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, \alpha) d\alpha \right) dx = I_2(\alpha), \quad f(x, \alpha) = \left(\frac{x^5}{\alpha^4} - \frac{2x^3}{\alpha^3} \right) e^{-x^2/\alpha}.$$

Считая $t = -x^2/\alpha$ и $dt = x^2(-1/\alpha^2) d\alpha$, перейдём к интегралу

$$g(x) = \int_0^1 d\alpha \left(\frac{x^5}{\alpha^4} - \frac{2x^3}{\alpha^3} \right) e^{-x^2/\alpha} = \int_{x^2}^\infty \left(\frac{t^2 - 2t}{x} \right) e^{-t} dt = \frac{1}{x} \int_{x^2}^\infty (t^2 - 2t) e^{-t} dt = \frac{1}{x} (-t^2 e^{-t}) \Big|_{x^2}^{+\infty} = x^3 e^{-x^2}.$$

Возвращаясь к первоначальному интегрированию

$$\int_0^1 g(x) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 e^{-x^2} d(x^2) = \frac{1}{2} \int_0^1 t e^{-t} dt = -\frac{1}{2} (t+1) e^{-t} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} - \frac{1}{e}.$$

С другой стороны – другой интеграл,

$$h(\alpha) = \int_0^1 dx f(x, \alpha) = \frac{1}{2\alpha} \int_0^{1/\alpha} (t^2 - 2t)e^{-t} dt = \frac{1}{2\alpha} \left\{ -t^2 e^{-t} \right\} \Big|_0^{1/\alpha} = -\frac{1}{2\alpha^3} e^{-1/\alpha}.$$

Остается посчитать интеграл по α

$$\int_0^1 h(\alpha) d\alpha = -\frac{1}{2} \int_1^\infty t e^{-t} dt = -\frac{1}{e},$$

что приводит к противоречию, – интегралы LHS и RHS е равны друг другу.

13.12

Пусть $a > 0$, $b > 0$. Вычислим интеграл

$$I_1 = \int_0^1 \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx, \quad I_2 = \int_0^1 \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) \frac{x^b - x^a}{\ln x} dx.$$

Внутри аргумента интеграла можно увидеть другой интеграл, так что рассмотрим вместо $I_{1,2}$ два повторных интеграла

$$I_1 = \int_0^1 dx \int_a^b x^y \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) dy, \quad I_2 = \int_0^1 dx \int_a^b x^y \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) dy.$$

Обозначим аргументы новых $I_{1,2}$ за f_1 и f_2 , которые непрерывны, поэтому позволяют перестановку по Фубини:

$$I_1 = \int_a^b dy \int_0^1 x^y \sin\left(\ln \frac{1}{x}\right) dx, \quad I_2 = \int_a^b dy \int_0^1 x^y \cos\left(\ln \frac{1}{x}\right) dx.$$

Подставим $x = e^{-t}$:

$$I_1 = \int_a^b dy \int_0^{+\infty} e^{-t(y+1)} \sin t dt, \quad I_2 = \int_a^b dy \int_0^{+\infty} e^{-t(y+1)} \cos t dt.$$

Новый аргумент интегрировать мы уже умеем, так что находим

$$I_1 = \int_a^b \frac{dy}{(y+1)^2 + 1}, \quad I_2 = \int_a^b \frac{(y+1) dy}{(y+1)^2 + 1},$$

что также интегрируется, так что находим

$$I_1 = \arctg\left(\frac{b-a}{1+(a+1)(b+1)}\right), \quad I_2 = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{b^2+2b+2}{a^2+2a+2}\right).$$

13.14(3)

Найти $\Phi'(\alpha)$, если

$$\Phi(\alpha) = \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} e^{\alpha \sqrt{1-x^2}} dx.$$

Обозначая аргумент интеграла за $f(\alpha, x)$ заметим, что f и f'_α непрерывны, т.к. интеграл собственный, то, интегрируя по частям, находим, что

$$\Phi'(\alpha) = e^{\alpha |\sin \alpha|} (-\sin \alpha) - e^{\alpha |\cos \alpha|} \cos \alpha + \int_{\sin \alpha}^{\cos \alpha} e^{\alpha \sqrt{1-x^2}} \sqrt{1-x^2} dx.$$

13.17

Есть интеграл вида

$$I(\alpha) = \int_0^b \frac{dx}{x^2 + \alpha^2}.$$

Дифференцируя его по параметру $\alpha > 0$ вычислим интеграл

$$J(\alpha) = \int_0^b \frac{dx}{(x^2 + \alpha^2)^2}.$$

Считая интеграл собственным, заметим, что аргумент интеграла ($f(x, \alpha)$), а также f'_α непрерывны. Раз так, то можем интегрировать под знаком интеграла:

$$\frac{\partial I(\alpha)}{\partial \alpha} = \int_0^b dx \frac{\partial}{\partial \alpha} \frac{1}{x^2 + \alpha^2} = -2\alpha \int_0^b \frac{dx}{(x^2 + \alpha^2)^2} = -2\alpha J(\alpha).$$

Таким образом приходим к

$$J(\alpha) = \frac{1}{2\alpha} \frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{\alpha} \operatorname{arctg} \frac{b}{\alpha} \right) = \frac{1}{2\alpha^3} \left\{ \operatorname{arctg} \frac{b}{\alpha} + \frac{b\alpha}{b^2 + \alpha^2} \right\}.$$

13.18 (1)

Теперь, применяя дифференцирование по параметру α , вычислим

$$I(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \ln(\alpha^2 - \sin^2 \varphi) d\varphi.$$

Опять таки, перед нами собственный интеграл, с непрерывным аргументом и его производной по α , соответственно интегрируемые по Лебегу, поэтому законно писать, что

$$\frac{dI(\alpha)}{d\alpha} = \int_0^{\pi/2} \frac{\partial}{\partial \alpha} \ln(\alpha^2 - \sin^2 \varphi) d\varphi = \int_0^{\pi/2} \frac{2\alpha d\varphi}{\alpha^2 - \sin^2 \varphi} = \frac{\pi}{\sqrt{\alpha^2 - 1}}.$$

Таким образом находим, что

$$I(\alpha) = \pi \ln(\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 1}) + C.$$

С другой стороны

$$I(\alpha) = \int_0^{\pi/2} \{2 \ln \alpha + o(1)\} d\varphi = \pi \ln \alpha + o(1)$$

$$I(\alpha) = \pi \ln \alpha + \pi \ln 2 + C + o(1),$$

при больших α . Получается, что

$$I(\alpha) = \pi \ln \left\{ \frac{1}{2} (\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 1}) \right\}.$$

13.28 (T1)

Докажем формулу для $n \in \mathbb{N}$,

$$I_n = \frac{d^n f(x)}{dx^n} = \psi_n(x), \quad f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases} \quad \psi_n(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^{n+1}} \int_0^x y^n \cos\left(y + \frac{\pi n}{2}\right) dy, & x \neq 0, \\ \cos\left(\frac{1}{2}\pi n\right), & x = 0, n \in \mathbb{N}. \end{cases}$$

Уже из этого потом покажем, что верна оценка

$$\left| \frac{d^n f(x)}{dx^n} \right| \leq \frac{1}{n+1}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

Ну, выражение для I_n справедливо при $n = 1$. Пусть формула для I_n также верна при некотором $n = k$, тогда дифференцируя обе части по x с последующим применением интегрирования по частям получаем

$$\begin{aligned} I_{k+1} &= \frac{d^{k+1}}{dx^{k+1}} \left(\frac{\sin x}{x} \right) = \frac{1}{x} \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right) - \frac{k+1}{x^{k+2}} \int_0^x y^k \cos\left(y + \frac{k\pi}{2}\right) dy = \\ &= \frac{1}{x} \cos\left(x + \frac{k\pi}{2}\right) - \frac{k+1}{x^{k+2}} \left(\frac{y^{k+1}}{k+1} \cos\left(y + \frac{k\pi}{2}\right) \right) \Big|_0^x + \frac{1}{k+1} \int_0^x y^{k+1} \sin\left(y + \frac{k\pi}{2}\right) dy = \\ &= -\frac{1}{x^{k+2}} \int_0^x y^{k+1} \sin\left(y + \frac{k\pi}{2}\right) dy = \frac{1}{x^{k+2}} \int_0^x y^{k+1} \cos\left(y + \frac{(k+1)\pi}{2}\right) dy, \quad x \neq 0. \end{aligned}$$

Раскладывая $\sin x$ в ряд Тейлора, можем найти

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k+1)!}, \quad \forall x, \quad \Rightarrow \quad f^{(n)}(0) = \frac{\cos\left(\frac{1}{2}\pi n\right)}{n+1}.$$

Далее, при $x \neq 0$,

$$\left| \frac{1}{x^{n+1}} \int_0^x y^n \cos\left(y + \frac{\pi n}{2}\right) dy \right| \leq \frac{1}{|x|^{n+1}} \int_0^{|x|} y^n dy = \frac{1}{n+1},$$

а при $x = 0$,

$$|f^{(n)}(0)| = \frac{\left| \cos\left(\frac{1}{2}\pi n\right) \right|}{n+1} \leq \frac{1}{n+1}, \quad \forall x \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{d^n f(x)}{dx^n} \right| \leq \frac{1}{n+1}, \quad \text{Q. E. D.}$$

2 Несобственные интегралы, зависящие от параметра

Def 2.1. Интеграл, сходящийся $\forall \alpha \in E$, вида

$$I(\alpha) = \int_a^{+\infty} f(x, \alpha) dx$$

называют *равномерно сходящимся на множестве E* , если

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon : \forall \alpha \in E, \forall \xi \geq \delta_\varepsilon \quad \left| \int_\xi^{+\infty} f(x, \alpha) dx \right| \leq \varepsilon.$$

Если построить отрицание, то поймём, что *интеграл сходится неравномерно на E* , если

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta \in [\alpha, +\infty) \quad \exists \alpha_\delta \in E, \quad \xi_\delta \in [\delta, +\infty) : \left| \int_{\xi_\delta}^{+\infty} f(x, \alpha_\delta) dx \right| \geq \varepsilon_0.$$

Определение равномерной сходимости соответствует условию

$$\lim_{\xi \rightarrow +\infty} \left(\sup_{\alpha \in E} \int_\xi^{+\infty} f(x, \alpha) dx \right) = 0.$$

Lem 2.2 (признак Вейерштрасса). Если на $[a, +\infty)$ $\exists \varphi(x)$ такая, что $|f(x, \alpha)| \leq \varphi(x) \quad \forall x \in [a, +\infty)$ и $\forall \alpha \in E$, и если $\int_a^{+\infty} \varphi(x) dx$ сходится, то $I(\alpha)$ сходится абсолютно и равномерно на E .

Lem 2.3 (признак Дирихле). Интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x, \alpha) g(x, \alpha) dx$$

сходится равномерно по α на E , если $\forall \alpha \in E$ функции f, g, g'_x непрерывны по x на множестве $[a, +\infty)$ и удовлетворяют следующим условиям: $g(x, \alpha) \rightarrow 0$ при $x \rightarrow \infty, g'_x(x, \alpha) \forall \alpha$ не меняет знака при $x \in [a, +\infty)$, функция $f \forall \alpha \in E$ имеет ограниченную первообразную $\forall x, \alpha$.

Lem 2.4 (критерий Коши). Интеграл $I(\alpha)$ сходится равномерно на E тогда и только тогда, когда выполняется условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta_\varepsilon \in (a, \infty) : \forall \xi' \in [\varphi_\varepsilon, +\infty), \xi'' \in [\delta_\varepsilon, +\infty), \forall \alpha \quad \left| \int_{\xi'}^{\xi''} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon.$$

Lem 2.5 (непрерывность). Если функция $f(x, \alpha)$ непрерывна на $D = \{(x, \alpha) \mid a \leq x < +\infty, \alpha_1 \leq \alpha \leq \alpha_2\}$ и $I(\alpha)$ сходится равномерно по α на отрезке $[\alpha_1, \alpha_2]$, то функция $I(\alpha)$ непрерывна на отрезке $[\alpha_1, \alpha_2]$.

2.1 К. III, §14

14.1(1, 2)

Докажем в 14.1(1) равномерную сходимость интеграла

$$I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}, \quad E = [\alpha_0; +\infty), \quad \alpha_0 > 1.$$

По признаку Вейерштрасса $x^\alpha \geq x^{\alpha_0}$, если $x > 1, \alpha > \alpha_0 > 1$

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} \leq \int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{\alpha_0}} \Rightarrow M(x) = \frac{1}{x^{\alpha_0}}.$$

что соответствует сходимости. Аналогично 14.1(2), интеграл вида

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}, \quad E = (0, \alpha_0), \quad \alpha_0 < 1.$$

Так как $x < 1$, то верно, что при $\alpha < \alpha_0 < 1$ функция $x^\alpha \geq x^{\alpha_0}$, что позволяет найти Лебег-интегрируемую мажоранту на E .

14.6(3)

Докажем, что интеграл $I(\alpha)$ сходится равномерно на множестве E_1 , и сходится неравномерно на E_2 , если

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{4 + (x - \alpha)^6}, \quad E_1 = [-\infty, 0], \quad E_2 = [1, +\infty).$$

Для начала на E_1 :

$$\left| \int_{\xi}^{-\infty} \frac{dx}{4 + (x - \alpha)^6} \right| = \left| \int_{\xi - \alpha}^{+\infty} \frac{dt}{4 + t^6} \right|, \quad \sup_{\alpha \in E_1} \left| \int_{\xi - \alpha}^{+\infty} \frac{dt}{4 + t^6} \right| = \int_{\xi}^{+\infty} \frac{dt}{4 + t^6} \xrightarrow{\xi \rightarrow +\infty} 0,$$

что соответствует равномерной сходимости.

В случае же E_2 , по аналогичным рассуждениям, приходим к

$$\sup_{\alpha \in E_2} \left| \int_{\xi - \alpha}^{+\infty} \frac{dt}{4 + t^6} \right| = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{4 + t^6} \not\xrightarrow{\xi \rightarrow +\infty} 0,$$

что говорит о неравномерной сходимости.

14.6(4)

Теперь на множествах $E_1 = [0, 2]$ и $E_2 = [0, +\infty)$ рассмотрим интеграл вида

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \exp(-(x - \alpha)^2) dx.$$

По определению равномерной непрерывности рассмотрим

$$\Omega(E) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \sup_{\alpha \in E} \left| \int_{\xi}^{+\infty} e^{-(x - \alpha)^2} dx \right| = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \sup_{\alpha \in E} \left| \int_{\xi - \alpha}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right|.$$

В силу ограниченности E_1 $\Omega(E_1) = 0$. А вот на E_2 уже будет верно, что

$$\sup_{\alpha \in E_2} \left| \int_{\xi - \alpha}^{+\infty} e^{-x^2} dx \right| = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx \not\xrightarrow{\xi \rightarrow +\infty} 0,$$

что говорит о неравномерной сходимости.

14.7(2)

Исследуем на равномерную сходимость интеграл вида

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx, \quad E = [0, 1].$$

И снова по определению рассмотрим интеграл

$$\left| \int_{\xi}^{+\infty} \alpha e^{-\alpha x} dx \right| = \left| \int_{\alpha \xi}^{+\infty} e^{-t} dt \right| = e^{-\alpha \xi}.$$

В условиях задачи

$$\alpha > 0, \quad e^{-\alpha \xi} \geq \varepsilon_0 \in (0, 1).$$

Точнее рассмотрим

$$\alpha \xi \leq \ln \frac{1}{\varepsilon_0}, \quad \Leftrightarrow \quad \alpha \leq \frac{1}{\xi} \ln \frac{1}{\varepsilon_0}.$$

Далее, по определению,

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \exists \xi_\delta = \delta \quad \exists \alpha(\delta) = \frac{1}{\delta} \ln \frac{1}{\varepsilon_0}, \quad \Rightarrow \quad \left| \int_{\xi_\delta}^{+\infty} f(x, \alpha) dx \right| = e^{-\alpha(\delta) \xi(\delta)} \geq \varepsilon_0.$$

Признак Абеля

Лем 2.6 (признак Абеля). Если интеграл $I(\alpha) = \int_a^{+\infty} f(x, \alpha) dx$ сходится равномерно на $[\alpha_1, \alpha_2]$ и функция φ ограничена и монотонна по x , то интеграл

$$\int_a^{+\infty} f(x, y) \varphi(x, y) dx \xrightarrow{[\alpha_1, \alpha_2]}.$$

Δ . Для $\forall \varepsilon > 0$, по Критерию Коши, $\exists B(\varepsilon)$ такое, что $\forall b', \xi, b'' > B(\varepsilon)$ независимо от $\alpha \in [\alpha_1, \alpha_2]$ выполняется

$$\left| \int_{b'}^{\xi} f(x, \alpha) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad \left| \int_{\xi}^{b''} f(x, \alpha) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2M},$$

где $M = \sup_{x, \alpha} |\varphi(x, \alpha)| \neq 0$.

Далее, так как φ монотонна по x , а функция f интегрируема, то, по второй теореме о среднем, имеем

$$\int_{b'}^{b''} f(x, \alpha) \varphi(x, \alpha) dx = \varphi(b' + 0, \alpha) \int_{b'}^{\xi} f(x, \alpha) dx + \varphi(b'' - 0, \alpha) \int_{\xi}^{b''} f(x, \alpha) dx,$$

где $b' \leq \xi \leq b''$. Отсюда, учитывая неравенства, получаем оценку

$$\left| \int_{b'}^{b''} f(x, \alpha) \varphi(x, \alpha) dx \right| \leq |\varphi(b' + 0, \alpha)| \cdot \left| \int_{b'}^{\xi} f(x, \alpha) dx \right| + |\varphi(b'' - 0, \alpha)| \cdot \left| \int_{\xi}^{b''} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon,$$

для $\forall \alpha \in [\alpha_1, \alpha_2]$. А это, по критерию Коши, и означает, что интеграл $I(\alpha)$ сходится равномерно на E . \square

14.7(4)

Исследуем на равномерную сходимость на E интеграл $I(\alpha)$ вида

$$I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \frac{\sin x^2}{1+x^\alpha} dx, \quad E = [0, +\infty).$$

Сделав замену $x = \sqrt{t}$, получим

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t dt}{2(1+t^{p/2})\sqrt{t}}.$$

По признаку Дирихле $\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt$ сходится, а функция $\frac{1}{2}(1+t^{\alpha/2})^{-1}$ при $\alpha \geq 0$ монотонна по t и ограничена числом 0.5, следовательно, по *признаку Абеля*, интеграл сходится равномерно.

14.7(6)

Исследуем на равномерную сходимость на E интеграл $I(\alpha)$ вида

$$I(\alpha) = \int_0^1 \sin \frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{x^\alpha}, \quad E = (0, 2).$$

Положим $x = 1/t$, $t > 0$. Тогда

$$\int_0^1 \sin \frac{1}{x} \cdot \frac{dx}{x^\alpha} = \int_1^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-\alpha}} dt, \quad \Rightarrow \quad \int_\xi^{+\infty} \frac{\sin t}{t^{2-\alpha}} dt = \frac{\cos \xi}{\xi^{2-\alpha}} + (\alpha - 2) \int_\xi^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{3-\alpha}} dt.$$

Последний интеграл $[\!|]$ сходится равномерно, поэтому при достаточно большом ξ справедлива оценка

$$\left| \int_B^{+\infty} \frac{\cos t}{t^{3-\alpha}} dt \right| < \varepsilon_1, \quad \varepsilon > 0.$$

Возвращаясь к первому слагаемому, заметим, что оно не может быть сделано сколь угодно малым $\forall \Xi \geq \xi$ равномерно относительно параметра α . Действительно, пусть $\xi > 0$ задано, а также $0 < \varepsilon_2 \leq 1/2$, тогда выбирая $\Xi = 2\pi k > \xi$, $k \in \mathbb{N}$ значение параметра α из неравенства $0 < 2 - \alpha < \ln(\varepsilon_2^{-1})/\ln(2\pi k)$ находим, что

$$\left| \frac{\cos \xi}{\xi^{2-\alpha}} \right| = \frac{1}{(2k\pi)^{2-\alpha}} > \varepsilon_2,$$

что означает, что исследуемый интеграл сходится неравномерно.

Лем 2.7. Если $f(x, \alpha) \Rightarrow f(x, \alpha_0)$ на каждом интервала $[a, b]$ и $|f(x, \alpha)| \leq F(x)$, где $F(x)$ – Лебег-интегрируема, то

$$\lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} \int_a^{+\infty} f(x, \alpha) dx = \int_a^{+\infty} \lim_{\alpha \rightarrow \alpha_0} f(x, \alpha) dx.$$

\triangle . Оценим по абсолютной величине разность

$$\int_0^{+\infty} f(x, \alpha) dx - \int_0^{+\infty} f(x, \alpha_0) dx = \int_a^b (f(x, \alpha) - f(x, \alpha_0)) dx + \int_a^b f(x, \alpha) dx - \int_b^{+\infty} f(x, \alpha_0) dx, \quad b > a.$$

Для $\forall \varepsilon > 0$ задано, в силу мажорируемости Лебег-интегрируемой функцией, при достаточно большом b справедливы оценки

$$\left| \int_b^{+\infty} f(x, \alpha) dx \right| \leq \int_b^{+\infty} F(x) dx < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \left| \int_b^{+\infty} f(x, \alpha_0) dx \right| < \frac{\varepsilon}{3},$$

а в силу условия равномерной сходимости – оценка

$$|f(x, \alpha) - f(x, \alpha_0)| < \frac{\varepsilon}{3(b-a)}, \quad \forall x \in [a, b],$$

если разность $|y - y_0|$ достаточно мала.

Таким образом получаем

$$\left| \int_a^{+\infty} f(x, \alpha) dx - \int_a^{+\infty} f(x, \alpha_0) dx \right| < \varepsilon,$$

при достаточно малом $|\alpha - \alpha_0|$. □

14.21

Покажем, что есть f непрерывна и ограничена на промежутке $[0, +\infty)$, то

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{\alpha f(x)}{x^2 + \alpha^2} dx = f(0).$$

Как обычно положим $x = t\alpha$, при $t > 0$ и $y > 0$. Тогда

$$I = \lim_{y \rightarrow +0} \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(ty)}{t^2 + 1} dt.$$

Так как $|f(ty)|/(t^2 + 1) \leq M/(t^2 + 1)$, где $|f(ty)| \leq M = \text{const}$, $\int_0^{+\infty} dt/(t^2 + 1) = \pi/2$ (сходится), а в силу непрерывности f дробь $\frac{f(t\alpha)}{t^2 + 1} \Rightarrow \frac{f(0)}{t^2 + 1}$ при $y \rightarrow +0$ на каждом конечном интервале $[a, b]$, то, согласно выше рассмотренной лемме, находим

$$\lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(t\alpha)}{t^2 + 1} dt = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \lim_{\alpha \rightarrow +0} \frac{f(t\alpha)}{t^2 + 1} dt = f(0).$$

В силу нечетности интеграла по α , имеем

$$\lim_{\alpha \rightarrow -0} \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\alpha f(x)}{x^2 + \alpha^2} dx = -f(0).$$

2.2 T2

Интеграл Дирихле. Вычислим *интеграл Дирихле*

$$I(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx \tag{2.1}$$

Для начала вычислим некоторый другой интеграл:

$$\Phi(\alpha, \beta) = \int_0^{\infty} e^{-\beta x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx, \quad \Phi'_{\alpha}(\alpha, \beta) = \int_0^{\infty} e^{-\beta x} \cos(\alpha x) dx = \frac{\beta}{\alpha^2 + \beta^2}.$$

Действительно, считая $f'_{\alpha}(x, \alpha) = e^{-\beta x} \cos(\alpha x)$, заметим, что f и f'_{α} непрерывны на E , $\int_0^{\infty} f(x, \alpha) dx$ сходится $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ по Дирихле:

$$\left| \int_0^{\infty} \sin(\alpha x) dx \right| = \left| \frac{\cos(\alpha t) - 1}{\alpha} \right| \leq \frac{2}{|\alpha|}, \quad \alpha \neq 0,$$

а функция $x^{-1}e^{-\beta x}$ убывает на промежутке $(0, +\infty)$, также верно, что $\int_0^{\infty} f'_{\alpha}(x, \alpha) dx$ сходится равномерно по признаку Вейерштрассе, следовательно можем дифференцировать под знаком интеграла.

Теперь, интегрируя α на отрезке $[0, \alpha]$ находим

$$\Phi(\alpha, \beta) - \Phi(0, \beta) = \beta \int_0^{\alpha} \frac{dt}{t^2 + \beta^2} = \text{arctg} \frac{\alpha}{\beta}.$$

Понятно, что $I(\alpha) = -I(\alpha)$, так что далее считаем $\alpha > 0$. Имеем право рассмотреть $\beta \in [0, 1]$, точнее предел

$$\lim_{\beta \rightarrow +0} \int_0^{+\infty} e^{-\beta x} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx = I(\alpha) = \lim_{\beta \rightarrow +0} \text{arctg} \frac{\alpha}{\beta} = \frac{\pi}{2}.$$

Таким образом для произвольного α верно, что

$$\int_0^{\infty} \frac{\sin(\alpha x)}{x} dx = \frac{\pi}{2} \text{sign}(\alpha). \tag{2.2}$$

Интеграл Лапласа. Вычислим интегралы Лапласа

$$I(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{\cos \alpha x}{1 + x^2} dx = \int_0^{\infty} f(x, \alpha) dx, \quad K(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1 + x^2} dx.$$

Без ограничения общности рассмотрим $\alpha > 0$. Проверим, что можем дифференцировать под знаком интеграла: $f(x, \alpha)$ непрерывна $\forall \alpha, x$, интеграл

$$\int_0^{+\infty} f'_{\alpha} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1 + x^2} dx,$$

сходится равномерно по α на $[a_0, +\infty)$ для $\forall \alpha_0 > 0$, получается верно, что

$$I'(\alpha) = - \int_0^{+\infty} \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} dx = -K(\alpha).$$

Складывая с известным выражением интеграла Дирихле, находим

$$I'(\alpha) + \frac{\pi}{2} = \int_0^{+\infty} \left(\frac{\sin \alpha x}{x} - \frac{x \sin \alpha x}{1+x^2} \right) dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x(1+x^2)} dx.$$

Аргумент интеграла непрерывен, как и его производная по α , они Лебег-интегрируемы, поэтому, дифференцируя под знаком интеграла, находим

$$I''(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\cos \alpha x}{1+x^2} dx.$$

Так мы приходим к дифференциальному уравнению на $I(\alpha)$:

$$I''(\alpha) - I(\alpha) = 0, \quad \Rightarrow \quad I(\alpha) = C_1 e^\alpha + C_2 e^{-\alpha}.$$

Рассматривая пределы $\alpha \rightarrow 0$ и $\alpha \rightarrow +\infty$, находим константы интегрирования $C_1 = 0$ и $C_2 = \pi/2$. В силу четности $I(\alpha)$ находим

$$I(\alpha) = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

Бонусом находим $K(\alpha) = -I'_\alpha(\alpha)$:

$$K(\alpha) = \frac{\pi}{2} e^{-|\alpha|} \cdot \text{sign } \alpha.$$

Интегралы Френеля. Вычислим *интеграл Френеля*

$$I = \int_0^{+\infty} \sin^2 x^2 dx.$$

Для нахождения нам понадобится *интеграл Эйлера-Пуассона* и, возможно, *интеграл Лапласа*:

$$\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}, \quad I(\alpha) = \int_0^{+\infty} e^{-x^2} \cos 2\alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2} ..$$

Полагая $x^2 = t$ запишем интеграл I в виде

$$I = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{\sqrt{t}} dt.$$

При $t > 0$ справедливо равенство

$$\int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du = \left/ x = \sqrt{t}u \right/ = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{t}}, \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\sqrt{t}} = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du, \quad (2.3)$$

Так приходим к двойному интегралу

$$I = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \sin t dt \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} du.$$

Меняя порядок интегрирования, получаем

$$I = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} du \int_0^{+\infty} e^{-tu^2} \sin t dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{+\infty} \frac{du}{1+u^4}.$$

Который легко вычисляется, если заметить, что

$$\int_0^{+\infty} \frac{x^2 dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{(1/x^2) dx}{1+(1/x)^4} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4}.$$

Поэтому

$$2 \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^4} = \int_0^{+\infty} \frac{(1+1/x^2) dx}{x^2+1/x^2} = \int_0^{+\infty} \frac{d(x-1/x)}{(x-1/x)^2+2} = \frac{1}{\sqrt{2}} \arctg \left(\frac{x-1/x}{\sqrt{2}} \right) \Big|_0^\infty = \frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

Откуда уже и получаем

$$I = \int_0^{+\infty} \sin^2 x^2 dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2}}. \quad (2.4)$$

2.3 ТЗ

Докажем *формулу Фруллани*

$$\int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}, \quad a > 0, \quad b > 0,$$

где f – непрерывная функция и $\int_A^\infty \frac{f(x)}{x} dx$ сходится $\forall A > 0$.

В силу условий теоремы

$$\int_A^{+\infty} \frac{f(ax)}{x} dx = \int_{Aa}^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt, \quad \int_A^{+\infty} \frac{f(bx)}{x} dx = \int_{Ab}^{+\infty} \frac{f(t)}{t} dt, \quad \Rightarrow \quad \int_A^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_{Aa}^{Ab} \frac{f(t)}{t} dt.$$

По первой теореме о среднем, получаем

$$\int_A^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(\xi) \int_{Aa}^{Ab} \frac{dt}{t} = f(\xi) \ln \frac{b}{a}, \quad Aa \leq \xi \leq Ab.$$

Поскольку функция f непрерывна, то $\lim_{A \rightarrow +0} f(\xi) = f(0)$, откуда находим

$$\lim_{A \rightarrow +0} \int_A^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = f(0) \ln \frac{b}{a}. \quad (2.5)$$

Стоит заметить, что если $\int_A^\infty f(x)/x dx$ расходится, то

$$\exists \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = f(+\infty), \quad \exists \int_A^{+\infty} \frac{f(x) - f(+\infty)}{x} dx \in \mathbb{R}, \quad \Rightarrow \quad \int_0^{+\infty} \frac{f(ax) - f(bx)}{x} dx = (f(0) - f(+\infty)) \ln \frac{b}{a}.$$

2.4 К. III, §15

15.1(1, 2, 3, 4)

1) Найдём интеграл вида

$$\int_0^{+\infty} (\cos^2(ax) - \cos^2(bx)) \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (\cos(2ax) - \cos(2bx)) \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}.$$

где воспользовались формулой Фрулани, выбрав $\cos(2ax) = f(ax)$.

2) Теперь найдём

$$\int_0^{+\infty} (e^{-ax^2} - e^{-bx^2}) \frac{dx}{x} = \ln \sqrt{\frac{b}{a}} = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a},$$

3) Интеграл вида

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{-ax^2} - e^{-bx^2}}{x} dx = \left/ \frac{x = \sqrt{t},}{dx = dt/(2\sqrt{t})} \right/ = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-at} - e^{-bt}}{2t} dt = \frac{1}{2} \ln \frac{b}{a}.$$

4) И, наконец, вычислим интеграл вида

$$\int_0^1 \frac{x^a - x^b}{\ln x} dx = \left/ \ln \frac{1}{x} = t \right/ = \int_\infty^0 \frac{dt}{t} e^{-t} (e^{-at} - e^{-bt}) = \int_0^\infty (e^{-(b+1)t} - e^{-(a+1)t}) \frac{dt}{t} = \ln \frac{a+1}{b+1}$$

15.2(1)

Найдём интеграл, вида

$$\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos \alpha x}{x^2} dx = - \int_0^{+\infty} \sin^2 \left(\frac{\alpha x}{2} \right) d \left(\frac{1}{x} \right) = - \frac{\sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} x \right)}{x} \Big|_0^{+\infty} + \frac{\alpha}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \alpha x}{x} dx = \frac{\pi |\alpha|}{2},$$

где модуль вполне правомерен в силу чётности $\cos(\alpha x)$.

15.3(2)

Интеграл

$$\int_0^\infty \sin x \cos^2 x \frac{dx}{x} = \int_0^\infty \sin(x) \frac{1 + \cos(2x)}{2} \frac{dx}{x} = \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx + \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sin x \cos 2x}{x} dx,$$

где уже хочется подставить $\sin(3x) - \sin(x) = 2 \sin(x) \cos(2x)$:

$$\frac{1}{2} \frac{\pi}{2} + \frac{1}{2} \frac{1}{2} \int_0^\infty \frac{\sin(3x)}{x} dx - \frac{1}{4} \int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{4}.$$

15.4(3)

Есть интеграл вида

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin^4(\alpha x)}{x^2} dx = \int_0^{+\infty} f(x, \alpha) dx..$$

Заметим, что f, f'_α существуют почти всюду по α , $f'_\alpha = \frac{4\sin^3(\alpha x)\cos(\alpha x)}{x}$ мажорируется $10x^2$ при малых x и не абсолютно интегрируема при больших по признаку Дирихле, соответственно можем нтегрировать под знаком интеграла

$$I'_\alpha(\alpha) = \int_0^{+\infty} 4\sin^3(\alpha x)\cos(\alpha x)\frac{dx}{x} = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x} \left(\frac{1}{4}\sin(2x\alpha) - \frac{1}{8}\sin(4x\alpha) \right) = \frac{\pi}{4}\operatorname{sign}\alpha,$$

что верно $\forall \alpha$.

Возвращаясь к интегралу, находим, что

$$I(\alpha) = \frac{\pi}{4}|\alpha| + 0,$$

так как $I(0) = 0$.

Thr 2.8 (интерирование по частям). *Вообще*

$$\int_a^{+\infty} f(x, \alpha)g'_x(x, \alpha) dx = f(x, \alpha)g(x, \alpha)\Big|_a^\infty - \int_a^{+\infty} f'_x(x, \alpha)g(x, \alpha) dx,$$

работает, когда $f, g \in C^1$ по x и любые два из трёх написанных пределов существуют.

15.5(6)

Вычислим интеграл вида

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \sin^3(x)\cos(\alpha x)\frac{dx}{x^3}.$$

Интегрируя по частям

$$\sin^3 x \cos(\alpha x) = \frac{3}{8}(\sin(\alpha + 1)x - \sin(\alpha - 1)x) - \frac{1}{8}(\sin(\alpha + 3)x - \sin(\alpha - 3)x),$$

для $\alpha > 3$. В общем приходим к выражению

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \int_0^{+\infty} \sin^3(x)\cos(\alpha x)\frac{dx}{x^3} = \int_0^\infty \sin^3 x \cos(\alpha x) d\left(\frac{-1}{2x^2}\right) = \\ &= \left(-\frac{1}{2x^2}\right) \sin^3 x \cos \alpha x \Big|_0^\infty + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} d(\sin^3 x \cos \alpha x) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} (\sin^3(x)\cos(\alpha x))'_x f\left(-\frac{1}{x}\right) = \\ &= -\frac{1}{2x} (\sin^3 x \cos(\alpha x))'_x \Big|_0^\infty + \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x} d(\sin^3 x \cos \alpha x)'_x = \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{x} \left(\frac{3}{8}[(\alpha + 1)^2 \sin(\alpha + 1)x - (\alpha - 1)^2 \sin(\alpha - 1)x] - \right. \\ &\quad \left. \frac{1}{8}[(\alpha + 3)^2 \sin(\alpha + 3)x - (\alpha - 3)^2 \sin(\alpha - 3)x] \right) = \\ &= -\frac{\pi}{4} \left\{ \frac{3}{8}(\alpha + 1)^2 - \frac{3}{8}(\alpha - 1)^2 - \frac{1}{8}(\alpha + 3)^2 + \frac{1}{8}(\alpha - 3)^2 \right\} = 0 \end{aligned}$$

15.6(3)

С помощью дифференцирования по параметру вычислим

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}}{x} \sin \lambda x dx = \int_0^{+\infty} f(x, \alpha) dx, \quad \alpha > 0, \beta > 0, \lambda \neq 0.$$

Для начала проверим, что можем дифференцировать по параметру λ . Действительно $f \in \mathcal{L}(X)$, $f'_\lambda = (e^{-\alpha x} - e^{-\beta x})\cos(\lambda x)$ существует, конечна и Лебег-интегрируема ($< e^{-\alpha x} - e^{-\beta x}$) $\forall \lambda$. Тогда, дифференцируя под знаком интеграла

$$I'_\lambda(\lambda) = \int_0^{+\infty} (e^{-\alpha x} - e^{-\beta x})\cos(\lambda x) dx = \frac{\alpha}{\alpha^2 + \lambda^2} - \frac{\beta}{\beta^2 + \lambda^2}.$$

В таком случае $I(\lambda)$

$$I(\lambda) = \int I'_\lambda(\lambda) d\lambda = \arctg\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right) - \arctg\left(\frac{\lambda}{\beta}\right) + C = \arctg\left(\frac{\lambda}{\alpha}\right) - \arctg\left(\frac{\lambda}{\beta}\right),$$

где $C = 0$ так как $I(0) = 0$.

15.6(5)

При выполнении всех условий о дифференцирование интеграла по параметру, для интеграла

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\arctg(\alpha x)}{x\sqrt{1-x^2}} dx,$$

может быть так посчитан.

Действительно,

$$\begin{aligned} \frac{dI(\alpha)}{d\alpha} &= \int_0^1 \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{1+(\alpha x)^2} = \int_0^1 dx \left[\sqrt{1-x^2}(1+(\alpha x)^2) \right]^{-1} = \\ &= \int_0^1 \frac{1}{x \cos t, \quad dx = -\sin t dt} = \frac{1}{\sqrt{1+\alpha^2}} \arctg\left(\frac{\tg t}{\sqrt{1+\alpha^2}}\right) \Big|_0^{\pi/2} = \frac{\pi}{2\sqrt{1+\alpha^2}}. \end{aligned}$$

Тогда $I(\alpha)$

$$I(\alpha) = \frac{\pi}{2} \int \frac{d\alpha}{\sqrt{1+\alpha^2}} + C = \frac{\pi}{2} \ln \left| \alpha + \sqrt{\alpha^2+1} \right| + C = \frac{\pi}{2} \ln \left(\alpha + \sqrt{1+\alpha^2} \right),$$

где $I(0) = 0$ так что $C = 0$.

15.13(5)

Попробуем через интеграл Эйлера-Пуассона доказать, что

$$\int_0^{+\infty} e^{-(x^2+\alpha^2/x^2)} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-2\alpha}, \quad \alpha > 0.$$

Представим интеграл в виде

$$\int_0^1 \exp\left(-x^2 - \frac{\alpha^2}{x^2}\right) + \int_1^{+\infty} \left(-x^2 - \frac{\alpha^2}{x^2}\right) dx,$$

далее, произведя замену $y = 1/x$ в первом интеграле получаем

$$I(\alpha) = \int_1^{+\infty} \exp\left(-\alpha^2 y^2 + \frac{1}{y^2}\right) \frac{dy}{y^2} + \int_1^{+\infty} \exp\left(-y^2 - \frac{\alpha^2}{y^2}\right) dy.$$

Так как подынтегральные функции f_1 и f_2 сходятся непрерывны при всех α и $1 \leq y < +\infty$, а соответствующие интегралы, по признаку Вейерштрасса, сходятся равномерно:

$$|f_1| \leq \frac{1}{y^2}, \quad |f_2| \leq e^{-y^2},$$

и интегралы

$$\int_1^{+\infty} \frac{dy}{y^2}, \quad \int_1^{+\infty} e^{-y^2} dy$$

сходятся, то функция I непрерывна $\forall |\alpha| \in \mathbb{R}$.

Пусть $|\alpha| \geq \varepsilon > 0$. Поскольку функции $\partial_\alpha f_1$ и $\partial_\alpha f_2$ непрерывны в области $|\alpha| \geq \varepsilon$, $1 \leq y < +\infty$, а соответствующие интегралы от них, в силу мажорантного признака, сходятся равномерно, то функция I' непрерывна при $\alpha \neq 0$. Следовательно

$$I'_\alpha(\alpha) = -2\alpha \int_0^{+\infty} \exp\left(-x^2 - \frac{\alpha^2}{x^2}\right) \frac{dx}{x^2}.$$

Кроме того, положив в исходном интеграле $x = \alpha/y$, $y > 0$, можем написать

$$I(\alpha) = \alpha \int_0^{+\infty} \exp\left(-y^2 - \frac{\alpha^2}{y^2}\right) \frac{dy}{y^2}.$$

Сравнивая последние два интеграла, получаем дифференциальное уравнение $I' + 2I = 0$, решая которое, находим

$$I(\alpha) = C e^{-2\alpha}.$$

В силу непрерывности $I(\alpha)$ находим, что $I(0) = \sqrt{\pi}/2$, откуда $C = \sqrt{\pi}/2$. Окончательно,

$$I(\alpha) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \exp(-2|\alpha|).$$

Lem 2.9. Верно представление, вида

$$\frac{1}{x^2 + 1} = \int_0^{+\infty} e^{-y(1+x^2)} dy.$$

15.15(1, 4)

1) Найдём интеграл, вида

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2(\alpha x)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{\infty} \frac{1 - \cos(2\alpha x)}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{dx}{1+x^2} - \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(2\alpha x)}{1+x^2} dx = \frac{\pi}{4} (1 - e^{-2|\alpha|}).$$

4) Теперь хочется взять интеграл

$$I(\alpha) = \int_0^{\infty} \frac{\sin^2(\alpha x)}{x^2(1+x^2)} dx = \int_0^{+\infty} f(x, \alpha) dx.$$

Заметим, что $f(x, \alpha)$ Лебег-интегрируема $\forall \alpha \in E$. Рассмотрим

$$f'_\alpha = \frac{\sin 2\alpha x}{x^2(1+x^2)}.$$

для которой верно, что

$$\left| \frac{2 \sin 2\alpha x}{x(1+x^2)} \right| \leq \left| \frac{1}{1+x^2} \right|, \quad x < 0.1/\alpha, \quad \left| \frac{2 \sin 2\alpha x}{x(1+x^2)} \right| \leq \left| \frac{2}{x^3} \right|, \quad x > 1,$$

соответственно, f'_α Лебег-интегрируема. Тогда верно, что

$$I'_\alpha(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\sin 2\alpha x}{x(1+x^2)} dx.$$

Дифференцируем дальше, по крайней мере хотим, для этого необходимо, чтобы f'_α и $f''_{\alpha,\alpha}$ были бы Лебег-интегрируемы и существуют $\forall \alpha$, что верно. Тогда

$$\frac{d^2 I(\alpha)}{d\alpha^2} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{\cos(2\alpha x)}{1+x^2} dx = 2 \frac{\pi}{2} e^{-2|\alpha|}.$$

Последний интеграл уже берется:

$$I''(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{2 \cos 2\alpha x}{1+x^2} dx = 2 \frac{\pi}{2} e^{-2\alpha}.$$

Отсюда находим

$$I'_\alpha(\alpha) = -\frac{\pi}{2} e^{-2\alpha} + C_1 = -\frac{\pi}{2} e^{-2\alpha} + \frac{\pi}{2},$$

и, наконец, находим

$$I(\alpha) = \frac{\pi}{4} e^{-2\alpha} + \frac{\pi}{2} \alpha + C_2, \quad \Rightarrow \quad I(\alpha) = \frac{\pi}{4} (e^{-2\alpha} + 2\alpha - 1), \quad \alpha > 0.$$

3 Интеграл Фурье и преобразование Фурье

Введём прямое и обратное преобразование Фурье:

$$f(x) \mapsto \hat{f}(y) = F[f](y) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt, \quad (3.1)$$

$$f(y) \mapsto \check{f}(x) = F^{-1}[f](x) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{ixt} dt. \quad (3.2)$$

Далее выпишем некоторые свойства преобразования Фурье.

Формула обращения. Если непрерывная функция f абсолютно интегрируема на \mathbb{R} и имеет в каждой точке $x \in \mathbb{R}$ конечные односторонние производные, то

$$F^{-1}[F[f]] = F[F^{-1}[f]] = f.$$

Непрерывность. Если функция f абсолютно интегрируема на \mathbb{R} , то её преобразование Фурье $\hat{f}(y)$ – непрерывная и ограниченная на \mathbb{R} функция, для которой верно

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \hat{f}(y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \hat{f}(y) = 0.$$

Преобразования Фурье производной. Если функция f и её производные до n -го порядка включительно непрерывны и абсолютно интегрируемы на \mathbb{R} , то

$$F[f^{(k)}] = (iy)^k F[f], \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Производная преобразования Фурье. Если функция f непрерывна на \mathbb{R} , а функции $f(x), xf(x), \dots, x^n f(x)$ абсолютно интегрируемы на \mathbb{R} , то функция $\hat{f}(y) = F[f](y)$ имеет на \mathbb{R} производные до n -го порядка включительное, причем

$$\hat{f}^{(k)}(y) = (-i)^k F[x^k f(x)], \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

Также полезно определить *интеграл Фурье*, как интеграл вида

$$f(x) \sim F^{-1}[F[f]](x) = v.p. \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{ixy} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-ty} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} c(y) e^{ixy} dy,$$

где

$$c(y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{iyt} dt.$$

Иначе, через тригонометрические функции

$$f(x) = \int_0^{+\infty} a(y) \cos(yx) dy + \int_0^{+\infty} b(y) \sin(yx) dy,$$

где

$$a(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(yt) dt, \quad b(y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(yt) dt.$$

3.1 К. III, §17

17.1(4)

Представим функцию $f(x)$ интегралом Фурье, если $f(x)$ вида

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + a^2}, \quad a \neq 0.$$

Заметим, что $b(y) = 0$, а $a(y)$

$$a(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(yt)}{t^2 + a^2} dt = \int_0^{+\infty} \frac{2}{\pi a} \frac{\cos(ayx)}{1 + x^2} dx = \frac{2}{\pi a} \frac{\pi}{2} e^{-ya},$$

таким образом находим представление в виде интеграла Фурье

$$f(x) = \frac{1}{|a|} \int_0^{+\infty} e^{-y|a|} \cos(xy) dy.$$

17.2(3)

Представим функцию $f(x)$ интегралом Фурье, если $f(x)$ вида

$$f(x) = \begin{cases} \cos(x), & |x| \leq \pi/2, \\ 0, & |x| > \pi/2. \end{cases}$$

Для начала заметим, что $b(y) = 0$, а $a(y)$

$$a(y) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} dt f(t) \cos(yt) = \frac{2}{\pi} \begin{cases} \cos(\pi y/2), & y \neq 1 \\ \pi/4, & y = 1 \end{cases}$$

В таком случае можем сопоставить функции её интеграл Фурье

$$f(x) \sim \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\cos(\pi y/2)}{y^2 - 1} \cos(xy) dy.$$

17.6(2)

Представим интегралом Фурье функцию $f(x)$, продолжив её чётным образом на $(-\infty, 0)$, если

$$f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ -1, & |x| > 1. \end{cases}$$

Функция является кусочно-гладкой и абсолютно интегрируемой на $(-\infty, \infty)$, следовательно, её можно представить интегралом Фурье, в силу четности $b(\lambda) = 0$, а $a(\lambda)$

$$a(\lambda) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} f(x) \cos \lambda x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^1 \cos \lambda x dx = \frac{2}{\pi} \frac{\sin \lambda}{\lambda}.$$

Таким образом находим представление:

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin \omega}{\omega} \cos(\omega x) d\omega, \quad |x| \neq 1.$$

В точках же $x = \pm 1$, интеграл Фурье равен $1/2$.

17.7(4)

Теперь найдём преобразование Фурье у аналогичной функции:

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & |x| \leq \pi, \\ 0, & |x| > \pi. \end{cases}$$

Преобразование Фурье найдём, как интеграл вида

$$F[f](y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = \int_{-\pi}^{\pi} \sin(t) (-i) \sin(yt) \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = 2 \int_0^{\pi} \sin t \sin(yt) (-i) \frac{dt}{\sqrt{2\pi}},$$

который уже легко считается

$$F[f](y) = -i \sqrt{\frac{2}{\pi}} \begin{cases} \frac{\sin(\pi y)}{1 - y^2}, & y \neq \pm 1, \\ \frac{\pi}{2}, & y = \pm 1. \end{cases}$$

17.8(2, 4)

2) Найдём преобразование Фурье функции

$$f(x) = e^{-x^2/2}.$$

Преобразование Фурье найдём, как интеграл вида

$$\begin{aligned} F[f](y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2} e^{-ity} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2/2 - ity} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{1}{2}(t^2 + 2ity)} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = \\ &= e^{-y^2/2}, \end{aligned}$$

где мы воспользовались свойством

$$\int_0^{\infty} e^{-x^2} \cos(2\alpha x) dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} e^{-\alpha^2}.$$

6) Найдём преобразование Фурье функции

$$f(x) = \frac{d^2}{dx^2} (x e^{-|x|}).$$

Преобразование Фурье найдём, как интеграл вида

$$\begin{aligned} F[f](y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d^2}{dt^2} (t e^{-|t|}) e^{-iyt} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = y^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} \frac{\partial}{\partial(iy)} e^{-iyt} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} = \\ &= -iy^2 \frac{\partial}{\partial y} \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-|t|} \cos(yt) dt = i \sqrt{\frac{8}{\pi}} \frac{y^2}{(1 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

17.14

Рассмотрим преобразование Фурье $\hat{f}(y)$ функции $f(x) = 1/(1 + |x|^5)$.

1) Рассмотрим третью производную

$$\partial_y^3 F[f](y) = (-i)^3 F[t^3 f](y) = (-i)^3 \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{t^3}{1 + |t|^5} e^{-iyt} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} \stackrel{\text{def}}{=} \Psi(y).$$

Заметим, что

$$|\Psi(y)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{|t|^3}{1 + |t|^5} \cdot 1 \cdot \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} < +\infty,$$

по признаку Вейерштрассе.

2) Заметим, что $y^5 O(y^{-5}) = O(1)$, а также $(iy)^5 F[f](y) = O(1)$ в окрестности больших y . Если $\exists C: \overset{\circ}{U}(x_0): |f(x)/g(x)| \leq C$, то говорят, что $f(x) = O(g(x))$ при $x \rightarrow x_0$. Верно, что

$$\varphi(y) = (iy)^5 F[f](y) = F[f^{(5)}](y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{\partial^5 f(t)}{\partial t^5} \right) e^{-iyt}.$$

Тогда верна оценка

$$|\varphi(y)| = |y|^5 |F[f](y)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} \left| \frac{\partial^5 f(t)}{\partial t^5} \right| \equiv C < +\infty.$$

Более того

$$|F[f](y)| \leq \frac{X}{|y|^5}, \quad \Rightarrow \quad F[f](y) = O\left(\frac{1}{y^5}\right).$$

3) Наконец получим оценку для больших y :

$$|\varphi(y)| = |y|^5 \left| F[f](y) \right| = \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} \frac{\partial^5 f(t)}{\partial t^5} e^{-iyt} \right|.$$

Так приходим к оценке

$$\left| F[f](y) \right| = \frac{1}{|y|^5} \left| \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} \frac{\partial^5 f(t)}{\partial t^5} e^{-iyt} \right| = \frac{K(y)}{|y|^5},$$

где $C(y)$ бесконечно малое при $y \rightarrow \infty$ по лемме Лебега-Римана, или лемме об осцилляции.

Лем 3.1 (лемма Римана-Лебега). Если $f(x)$ такая, что $\int_{\mathbb{R}} |f| < +\infty$, то $\int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ipx} \rightarrow 0$ при $p \rightarrow \infty$.

17.17(2)

Найдём $\varphi(y)$, если

$$\int_0^{+\infty} \varphi(y) \sin(xy) dy = e^{-x}, \quad x > 0.$$

Через обратное преобразование Фурье:

$$\varphi(x) = \int_0^{+\infty} \left(\cos(xy) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\pi} \varphi(t) \cos(yt) + \sin(xy) 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{\pi} \varphi(t) \sin(yt) \right) dy,$$

тогда

$$\varphi(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} dy e^{-y} \sin(xy) = \frac{2}{\pi} \frac{x}{1+x^2}, \quad x > 0.$$

3.2 Т4

Докажем, что функции вида $P(x)e^{-x^2/2}$, где $P(x) \in \mathbb{C}[x]$, при преобразовании Фурье переходят в функцию того же вида, причём степень многочлена не повышается.

Действительно,

$$\begin{aligned} F[f](y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} P_{\alpha}(t) e^{-t^2/2} e^{-iyt} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} P_{\alpha} \left(\frac{\partial}{\partial(-iy)} e^{-yt} \right) = \\ &= P_{\alpha} \left(i \frac{\partial}{\partial y} \right) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} e^{-iyt} \stackrel{17.8(2)}{=} P_{\alpha} \left(-\frac{\partial}{\partial y} \right) e^{-y^2/2}. \end{aligned}$$

Осталось показать, что степень многочлена не увеличилась, для этого достаточно рассмотреть

$$F[f](y) = p_{\alpha} \cdot \left(i \frac{\partial}{\partial y} \right)^n e^{-y^2/2} + P_{\alpha-1} \left(i \frac{\partial}{\partial y} \right) e^{-y^2/2} = p_{\alpha} i^{\alpha} (-y)^{\alpha} e^{-y^2/2} + Q_{\alpha-1}(y) e^{-y^2/2} + P_{\alpha-1} \left(i \frac{\partial}{\partial y} \right) e^{-y^2/2},$$

поэтому степень не повышается.

3.3 Т5

Вычислим интегралы Лапласа с помощью образа преобразования Фурье:

$$I(y) = \int_0^{+\infty} dx \frac{\cos(yx)}{1+x^2}, \quad K(y) = \int_0^{+\infty} dx \frac{x \sin(yx)}{1+x^2}.$$

В частности рассмотрим функцию $f(x) = e^{-\alpha|x|}$, где $\alpha > 0$, тогда

$$F[f](y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\alpha}{\alpha^2 + y^2}, \quad F^{-1}[g](x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dy}{\sqrt{2\pi}} g(y) e^{ixy}.$$

Теперь воспользуемся формулой образования, и найдём

$$f(x) = F^{-1}[F[f]](x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} dy \frac{\alpha \cos(2y)}{\alpha^2 + y^2} = e^{-\alpha|x|}, \quad \alpha > 0.$$

Соответственно, при $\alpha = 1$, найдём

$$\int_0^{+\infty} dy \frac{\cos(xy)}{1 + y^2} = \frac{\pi}{2} e^{-|x|}.$$

Аналогично находим $K(\alpha)$, а именно $F[f'](y) = iyF[f](y)$

$$F^{-1}[F[f']](x) = f'(x) = F^{-1}[iyF[f]](x) = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dy}{\sqrt{2\pi}} i \sin(xy) \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\alpha iy}{\alpha^2 + y^2} = -\frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} dy \frac{\alpha y \sin(xy)}{\alpha^2 + y^2} = -\alpha \operatorname{sign} x e^{-\alpha|x|},$$

что при $\alpha = 1$ перейдёт в интеграл вида

$$\int_0^{+\infty} \frac{y \sin(xy)}{1 + y^2} dy = \frac{\pi}{2} \operatorname{sign}(x) e^{-|x|}.$$

3.4 Т6

Пусть $f \in S(\mathbb{R})$, $\forall x_0, y_0 \in \mathbb{R}$:

$$\|(x - x_0)f(x)\|_2 \cdot \|(y - y_0)\hat{f}(y)\| \geq \frac{1}{2} \|\hat{f}\|_2^2.$$

Для начала рассмотрим $(y - y_0)\hat{f}(y)$. Сделаем замену $t = y - y_0$, тогда

$$(y - y_0)\hat{f}(y) = t\hat{f}(y_0 + t),$$

раскрывая, находим

$$\hat{f}(y_0 + t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t + y_0) e^{-iyt} dt = e^{iy_0 t} F[f](y).$$

Построим следующую цепочку равенств

$$\|(y - y_0)\hat{f}(y)\|_2 = \|f\hat{f}(y_0 + t)\| = \|te^{iy_0 t}\hat{f}(t)\|_2.$$

Также заметим, что такое преобразование сохраняет норму (что логично):

$$\|ge^{iy_0 t}\|_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} ge^{iy_0 t} \cdot \overline{ge^{iy_0 t}} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} g\bar{g} dt = \|g\|_2.$$

Тогда

$$\|te^{iy_0 t}\hat{f}(t)\|_2 = \|t\hat{f}(t)\|_2 = \|\hat{f}'(t)\|_2.$$

Теперь, воспользовавшись унитарностью преобразования Фурье, найдём

$$\|\hat{f}'(t)\|_2 = \|f'(t)\|_2.$$

Наконец, можем свести изначальное утверждение к неравенству

$$\|xf(x)\|_2 \cdot \|f'(x)\|_2 \geq \frac{1}{2} \|f\|_2^2,$$

которое уже можем доказать по неравенству Коши-Буняковского

$$\int_{\mathbb{R}} (xf(x))^2 dx \int_{\mathbb{R}} (f')^2 dx \geq \left(\int_{\mathbb{R}} xf(x)f'(x) dx \right)^2 = \left(-xf^2(x) \Big|_{-\infty}^{+\infty} - \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} f^2(x) dx \right)^2 = \frac{1}{4} \|f\|_2^4, \quad \text{Q. E. D.}$$

где равенство нулю на границах обусловлено принадлежности пространству Шварца.

3.5 Т7

Найдём преобразование Фурье функции

$$f(x) = \begin{cases} x^{p-1} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

при $p > 0$.

Для начала рассмотрим

$$\frac{d\hat{f}}{dx} = -iF[f \cdot x] = -\frac{i}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} x^p e^{-x-ixy} dx = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{xpe^{-x(1+iy)}}{-1-iy} \Big|_0^{+\infty} \right) - \frac{ip}{\sqrt{2\pi}} \int x^{p-1} \frac{e^{-x-ixy}}{-1+iy} dx = \frac{-ip\hat{f}(y)}{1+iy},$$

что даёт нам некоторое дифференциальное уравнение на \hat{f} вида

$$\frac{d\hat{f}}{\hat{f}} = \frac{(-ip)dy}{1+iy}, \quad \Rightarrow \quad \hat{f}(y) = C(1+iy)^{-p}.$$

Осталось найти константу интегрирования, при $y = 0$:

$$\hat{f}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{+\infty} x^p e^{-x} dx = \frac{\Gamma(p)}{\sqrt{2\pi}},$$

откуда находим

$$\hat{f}(y) = \frac{\Gamma(p)}{\sqrt{2\pi}} (1+iy)^{-p}.$$

3.6 Т8

Пусть функция $f \in L_1(\mathbb{R})$ имеет ограниченную вариацию на всей прямой. Докажем, что свёртка

$$f * \dots * f$$

$k+2$ раза будет k раз непрерывно дифференцируема.

Рассмотрим

$$\hat{h}(y) = (2\pi)^{-k/2-1} (\hat{f}(y))^{k+2}.$$

Если $f \in L_1(\mathbb{R})$ имеет ограниченную вариацию на \mathbb{R} , то

$$c_f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-ixy} dx,$$

будет равным $O(1/y)$ при $y \rightarrow \infty$. Тогда $\hat{h}(y) = O(y^{-k-2})$ при больших y .

Теперь рассмотрим

$$F^{-1}[h](y): \frac{d}{dy} F^{-1}[h](y) = F[(-it)h(t)](y),$$

также верно, что

$$(F^i)^{(k)} = F[(-it)^k h[t]](y) \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} O\left(\frac{1}{y^2}\right) e^{iyt} dt.$$

Вспомним, что $I(\alpha) = \int f(x, \alpha) dx$ непрерывен при f непрерывной, и $I(\alpha)$ сходящемся равномерно по α :

$$|f(x)| = O(g(x)),$$

когда найдётся κ такая, что

$$|f(x)| \leq \kappa |g(x)|, \quad \Rightarrow \quad \int_{-\infty}^{+\infty} O\left(\frac{1}{y^2}\right) e^{iyt} dt \leq \kappa \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{y^2} e^{iyt} dt = \frac{-i\kappa e^{iyt}}{y^3} \leq \frac{\kappa}{y^3},$$

следовательно сходится равномерно по признаку Вейерштрассе, а значит и k -я производная существует и непрерывна.

3.7 Т9

Найдём преобразование Фурье функции $f: \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ вида $f(x) = e^{-A(x)}$, где $A(x)$ – положительно определенная квадратичная форма.

Во-первых

$$A(x) = x^T A x = \frac{1}{2} A_{\alpha\beta} x^\alpha x^\beta.$$

Тогда преобразование Фурье можно найти, как интеграл, вида

$$F[f](y) = \int_{\mathbb{R}^n} \frac{d^n t}{(2\pi)^{n/2}} \exp\left(-\frac{1}{2} A_{\alpha\beta} t^\alpha t^\beta - iy_\alpha t^\alpha\right) = \frac{1}{\sqrt{\det A}} \exp\left(-\frac{1}{2} (A^{-1})_{\alpha\beta} y^\alpha y^\beta\right) \equiv \frac{\exp(-A^{-1}(y))}{\sqrt{\det A}}. \quad (3.3)$$

Докажем эту замечательную формулу.

$$A(t) = \frac{1}{2} (Ox)^T A (Ox) = \frac{1}{2} x^T O^T A O x = \frac{1}{2} x^T D x = \frac{1}{2} \sum_{\alpha} \left(\sqrt{\lambda_{\alpha}} x^{\alpha} \right) \left(\sqrt{\lambda_{\alpha}} x^{\alpha} \right) = \frac{1}{2} z^{\alpha} z_{\alpha}.$$

Дифференциал можем переписать в виде

$$d^n t = \left| \frac{\partial(t_1, \dots, t_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)} d^n x \right| = |\det O| d^n x = \frac{d^n z}{\sqrt{\det A}}.$$

Также можем рассмотреть скалярное произведение:

$$(\mathbf{y} \cdot \mathbf{t}) = (O^T)_{\alpha\beta} y^\alpha x^\beta = \sum_{\beta} \frac{1}{\sqrt{\lambda_b}} O_{\beta\alpha} y^\alpha z^\beta = k_\beta z^\beta.$$

Итого наш первоначальный интеграл сводится к

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{d^n z}{(2\pi)^{n/2} \sqrt{\det A}} \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{z} \cdot \mathbf{z}) - i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{z})\right) &= \frac{1}{\sqrt{\det A}} \prod_{\alpha=1}^n \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dz^\alpha}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(z^\alpha)^2 - i k_\alpha z^\alpha\right) = \\ &= \frac{1}{\sqrt{\det A}} \prod_{\alpha=1}^n \exp\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{k} \cdot \mathbf{k})\right) = \frac{1}{\sqrt{\det A}} \prod_{\alpha=1}^n e^{-A^{-1}(y)}, \end{aligned}$$

где воспользовались равенством

$$k_\alpha k^\alpha = \sum_{\alpha} \frac{1}{\lambda_\alpha} O_{\beta\alpha} (O^T)^{\alpha\gamma} y^\beta y_\gamma = (A^{-1})_{\beta}^{\gamma} y^b y_\gamma = 2A^{-1}(\mathbf{y}),$$

что в итоге доказывает написанную формулу

$$\boxed{F\left[e^{-A(x)}\right](\mathbf{y}) = \frac{\exp(-A^{-1}(\mathbf{y}))}{\sqrt{\det A}}}.$$

4 Третье задание по математическому анализу

14.8(2)

Рассмотрим интеграл с подвижной особенностью. В частности есть $c(\alpha) \in [a, b]$:

$$I(\alpha) = \int_a^b f(x, \alpha) dx = \left(\int_a^{c(\alpha)} + \int_{c(\alpha)}^b \right) f(x, \alpha) dx.$$

В частности опишем ситуации, когда функция неограничена на нижнем и верхнем пределе:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \alpha_1(\varepsilon) \geq a \forall \xi_1 > \alpha_1(\varepsilon) \forall \varepsilon \in E \left| \int_{\xi_1}^{c(\alpha)} f(x, \alpha) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Аналогично для нижнего предела

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \alpha_2(\varepsilon) \leq b \forall \xi_2 > \alpha_2(\varepsilon) \forall \varepsilon \in E \left| \int_{c(\alpha)}^{\xi_2} f(x, \alpha) dx \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Если взять Δ большое правильным образом, то приходим к определению вида

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta(\varepsilon) > 0 \forall \delta_1 \in (0, \Delta(\varepsilon)) \forall \delta_2 \in (0, \Delta(\varepsilon)) \forall \alpha \in E \left| \int_{c(\alpha)-\delta_1}^{c(\alpha)+\delta_2} f(x, \alpha) dx \right| < \varepsilon.$$

Теперь можем перейти к примеру:

$$I(\alpha) = \int_0^1 \frac{\sin(\alpha x)}{\sqrt{|x - \alpha|}} dx,$$

тогда, по определению,

$$\left| \int_{\alpha-\delta_1}^{\alpha+\delta_2} \frac{\sin(\alpha x)}{\sqrt{|x - \alpha|}} dx \right| \leq \int_{\alpha-\delta_1}^{\alpha+\delta_2} \frac{dx}{\sqrt{|x - \alpha|}} = \int_{\alpha-\delta_1}^{\alpha} \frac{dx}{\sqrt{|x - \alpha|}} + \int_{\alpha}^{\alpha+\delta_2} \frac{dx}{\sqrt{|x - \alpha|}} = 2\sqrt{\delta_1} + 2\sqrt{\delta_2} < 4\Delta(\varepsilon),$$

в таком случае достаточно взять $\Delta(\varepsilon) = \varepsilon^2/16$.

4.1 Сходимость и полнота систем функций в пространствах C и L_p

Можно построить следующую систему вложений: топологические пространства \supset метрические пространства \supset нормированные пространства \supset предгильбертовы пространства.

Def 4.1. *Банахово пространство* – полное нормированное пространство.

Def 4.2. Гильбертово пространство – банахово пространство, с нормой, порожденной положительно определенным скалярным произведением $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$.

Def 4.3. Гильбертово пространство – ~~норм~~ нормированное пространство, с нормой, порожденной положительно определенным скалярным произведением $\|x\| = \sqrt{(x, x)}$.

Приведем некоторые примеры: пространство непрерывных функций $C[a, b]$ с нормой $\|\cdot\|_C = \|\cdot\|_\infty = \sup_{t \in [a, b]} |x(t)|$. Пространство L_p . Пространство C_p , совпадающее с $C[a, b]$, но с нормой $\|\cdot\|_2$ – предгильбертово, кстати.

T1

Построим табличку сходимостей. Для начала вспомним, что если $\mu(A) < +\infty$ и $1 \leq p_1 < p_2 \leq +\infty$, то

$$\|\cdot\|_{p_1} \leq C(\mu(A), p_1, p_2) \|\cdot\|_{p_2}, \quad C(\dots) = (\mu(A))^{\frac{p_2 - p_1}{p_1 p_2}}.$$

В частности, можно перейти к пределу, и обнаружить, что

$$\|\cdot\|_1 \leq C(\dots) \|\cdot\|_\infty, \quad \|\cdot\|_\infty = \lim_{p \rightarrow \infty} \|\cdot\|_p \equiv \|\cdot\|_C.$$

Таким образом из сходимости L_2 следует сходимость в L_1 .

Ещё раз напишем, что значит сходимость по норме:

$$f_n \xrightarrow{L_p} f \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq N_\varepsilon \|f_n - f\|_p < \varepsilon.$$

Тогда рассмотрим

$$\|f_n - f\|_1 \leq \sqrt{b-a} \|f_n - f\| < \varepsilon, \quad \square.$$

Теперь докажем $f_n \xrightarrow{C} f \Rightarrow f_n \xrightarrow{L_2} f$, где сходимость по C -норме:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \forall n \geq N_\varepsilon \forall x \in A |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Ну, действительно,

$$\|f_n - f\|_2^2 = \int_A |f_n - f|^2(x) \mu(dx) \leq \int_A \left\{ \sup_{x \in A} |f_n - f|(x) \right\}^2 \mu(dx) = \left\{ \sup_{x \in A} |f_n - f|(x) \right\}^2 \mu(A),$$

где множитель перед $\mu(A)$ стремится к 0 при $n \rightarrow \infty$, \square .

Также стоит вспомнить, что из равномерной сходимости следует поточечная сходимость. По определению, поточечная сходимость:

$$\forall x \in A \forall \varepsilon > 0 \exists N(\xi, \varepsilon) \in \mathbb{N} \forall n \geq N |f_n - f|(x) < \varepsilon.$$

Получается, что достаточно взять $N(x, \varepsilon) = N(\varepsilon)$ и получить искомое утверждение.

В качестве контрпримера рассмотрим $f_n(x) = n \operatorname{arctg}(n/x^2)$ с $A = [1, \infty)$. По отрицанию условия Коши, если

$$\exists \varepsilon_0 \forall k \in \mathbb{N} \exists n \geq k \exists p \in \mathbb{N} \exists \tilde{x} \in A: |f_{n+p} - f_n|(\tilde{x}) \geq \varepsilon_0,$$

то последовательность f_n не является равномерно сходящейся. Действительно, при $n = k$, $p = 2k - 2n$, $\tilde{x} = \sqrt{k} = \sqrt{n}$, верно, что

$$|f_{n+p} - f_n|(\tilde{x}) = n|2 \operatorname{arctg} 2 - \operatorname{arctg} 1| \geq |2 \operatorname{arctg} 2 - \pi/4| = \varepsilon_0 > 0,$$

что говорит об отсутствии равномерной сходимости. При этом $f_n \rightarrow x^2$ поточечно на $x \in E$.

Контрпримеры. Покажем, что $f_n \xrightarrow{L_1} f \not\Rightarrow f_n \xrightarrow{L_2} f$. Прямую мы умеем строить по двум точкам

$$\frac{f - f_0}{f_1 - f_0} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0},$$

Построим последовательность функций вида

$$\frac{f_n - c_n}{0 - c_n} = \frac{x - 0}{x_n - 0}, \quad f_n(x) = \begin{cases} c_n(1 - \frac{x}{x_n}), & x \in [0, x_n), \\ 0, & x \in [x_n, 1]. \end{cases}$$

Контрпримеры строим на отрезке $[0, 1]$. Выберем последовательность сходящуюся к 0 в L_1 норме:

$$\|f_n - 0\|_1 = \int_0^{x_n} \left| c_n \left(1 - \frac{x}{x_n} \right) \right| \mu(dx) = \frac{1}{2} c_n x_n, \quad \|f_n - 0\|_2^2 = \frac{1}{3} c_n^2 x_n, \quad \Rightarrow \quad \|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} c_n \sqrt{x_n}.$$

Пусть $c_n x_n = \alpha_n$ – бесконечно малая последовательность. Выберем $x_n = 1/n$, тогда $c_n = n \alpha_n$.

Для $\|f_n\|_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{\alpha_n}{\sqrt{x_n}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \sqrt{n} \alpha_n$, что устремим к ∞ , выбрав

$$\alpha_n = \frac{1}{n^{1/2-\xi}}, \quad \xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \quad \square.$$

Эту историю можно обобщить до отсутствия следствия в $\|f_n\|_p = c_n x_n^{1/p} (1+p)^{-1/p}$. Тогда можем взять $\alpha_n = (n^{1-1/p-\xi})^{-1}$, для $\xi \in (0, 1 - 1/p)$.

Теперь покажем, что $f_n \xrightarrow{L_2} f \not\xrightarrow{C} f$. Пусть $f_n \rightarrow 0$ в L_2 норме. Пусть

$$\|f_n - 0\|_2 = \|f_n\| = \frac{c_n}{\sqrt{3}} x_n = \alpha_n, \quad x_n = \frac{1}{n}.$$

Пусть f_n вида

$$f_n(x) = \begin{cases} \sqrt{3}\alpha_n\sqrt{n}(1-nx), & x \in [0, 1/n) \\ 0, & x \in (1/n, 1]. \end{cases}$$

В таком случае

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n - 0|(x) = \sup_{x \in [0,1/n]} |\sqrt{3}\alpha_n\sqrt{n}(1-nx)| = \sqrt{3}\alpha_n\sqrt{n} \not\rightarrow 0, \quad \alpha_n = \frac{1}{n^{1/2-\xi}}, \quad \xi \in [0, 1/2),$$

что и требовалось доказать.

Пусть теперь есть поточечная сходимость но нет сходимости в L_1 . Построим пилу, вида

$$f_n(x) = \begin{cases} c_n \frac{x_{1,n}-x}{x_{1,n}-x_n}, & x \in (x_{1,n}, x_n], \\ c_n \frac{x_{2,n}-x}{x_{2,n}-x_n}, & x \in [x_n, x_{2,n}), \\ 0, & x \in [0, x_{1,n}] \cup [x_{2,n}, 1]. \end{cases}$$

В этой задаче достаточно считать $x_{1,n} = 1/(n+1)$, а $x_{2,n} = 1/n$, тогда

$$\|f_n\|_1 = c_n \frac{x_{2,n} - x_{1,n}}{2} = \frac{c_n}{2} \frac{1}{(n+1)n} \rightarrow \infty.$$

Чтобы это сделать, достаточно выбрать $c_n = n^{2+\xi}$. Однако поточечно такой зуб пилы сходится к 0. Действительно, при $x = 0$ $f_n(0) = 0$. Для остальных x можно показать, что по определению $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$.

T2

Приведем пример, когда последовательность функция (f_n) сходится в пространстве $L_1[a, b]$, но для любого $x \in [a, b]$ последовательность чисел $f_n(x)$ расходится.

Из сходимости в L_1 следует сходимость по мере, так что можем воспользоваться *примером Рисса*. Пусть $f_n \xrightarrow{L_2} f \equiv 0$. Рассмотрим конструкцию вида

$$\varphi_{m,k}(x) = \xi \left[\frac{k}{2^m}, \frac{k+1}{2^m} \right] (x), \quad m \in \mathbb{N}_0,$$

где $k = 0, 1, \dots, 2^m - 1$. Утверждается, что $\forall n \in \mathbb{N} \exists! m, k : n = 2^m + k$. Таким нетривиальным образом мы (точнее Рисс) решили дробить ступеньку. Верно, что

$$\|f_n - 0\|_1 = \int_{k/2^m}^{(k+1)/2^m} \varphi_{m,k}(x) dx = \frac{1}{2^m} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Однако, для $\forall x \in [0, 1]$ существует бесконечное число сленов последовательности равных 0 и 1. Таким образом поточечно последовательность расходится.

T3

Докажем, что естественное отображение $C[a, b] \rightarrow L_1[a, b]$ не сюръективно, не забывая, что элементы L_1 – это не функции, а классы эквивалентности.

Достаточно выбрать функцию, вида

$$f(x) = \text{sign } x,$$

которую *нельзя* изменить на множестве нулевой меры, чтобы сделать её непрерывной.

T4

Выясним полноты некоторых систем функций в пространстве $L_2[0, \pi/2]$. Начём с

$$\{f_n(x) = \sin[(2n-1)x]\}_{n \in \mathbb{N}}.$$

Def 4.4. Пусть X – нормированное пространство. Система $S = \{f_\alpha\}_{\alpha \in \mathcal{A}}$ называется *полной*, если $\forall x \in X \forall \varepsilon > 0 \exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathcal{A}$, а также $\exists f_{\alpha_1}, \dots, f_{\alpha_n} \in S$ такие, что $\|x - (\alpha_1 f_{\alpha_1} + \dots + \alpha_n f_{\alpha_n})\|_X < \varepsilon$.

Стоит подчеркнуть, что это не определение базиса, так как $\alpha \equiv \alpha(\varepsilon)$. Это определение слабее базиса, это – приближение.

Если мы возьмём $L_2[-\pi, \pi]$, и систему вида $\{1, \sin(nx), \cos(nx)\}_{n \in \mathbb{N}}$, то она будет полна, более того будет являться базисом. В рамках задачи мы интересуемся промежутком $[0, \pi/2]$.

Более того, такая система полна в $\mathring{C}[-\pi, \pi]$, ($f(-\pi) = f(\pi)$), чем мы потом воспользуемся в Т5.

В смысле L_2 мы можем приближать, игнорируя счётное число точек:

$$\|f - \tau_n\|_2^2 = \int_0^{\pi/2} |f - \tau_n|(x) \mu(dx).$$

Достраивая функцию специфичным образом на отрезок $[-\pi, \pi]$ (u, d, u, d), пользуемся знанием о полноте тригонометрической системы и приходим к полной системе.

Для понимания продолжения функции с отрезка $[0, \pi/2]$, на $[-\pi, \pi]$, достаточно построить функции, образующие системы (рис. 1). И, аналогично, для $k = 2$ (рис. 2).




Рис. 1: Графики функция при $m = 1$ для Т4




Рис. 2: Графики функция при $m = 2$ для Т4

Т5

Аналогично Т4, рассмотрим полноту систем некоторых функция в пространстве $C[0, \pi/2]$. В частности покажем, что $\exists \tilde{x} \in C[0, \pi/2]$ и $\exists \varepsilon_0 \forall \tau_n$. Все синусы упираются в 0, выберем $\tilde{x}(t) = 1$, тогда

$$\|\tilde{x} - \tau_n\|_\infty = \sup_{x \in [0, \pi/2]} |\tilde{x}(t) - \tau_n(t)| \geq |\tilde{x} - \tau_n| = |\tilde{x} - \tau_n|(0) = |1 - 0| = \varepsilon_0.$$

Получается, что ломаются все синусы и косинусы с «нечётными дугами» (достаточно взять $t = \frac{\pi}{2}$), что явно видно по построению.

Итого, единственная хорошая система, – $\cos(2kx)$.

Т6. Функции Эрмита

Приведем пример счетной системы функций, полной в $L_2(\mathbb{R})$. В частности, воспользуемся функциями Эрмита:

$$\varphi_n(t) = c_n H_n(t) e^{-\frac{1}{2}t^2}, \quad H_n(t) = e^{\frac{1}{2}t^2} \frac{d^n}{dt^n} e^{-\frac{1}{2}t^2}.$$

Утверждается, что это базис $L_2(\mathbb{R})$, докажем это.

Есть система функций

$$\mathcal{L} = \{\varphi_n(t)\} = \{\rho(t) e^{-\frac{1}{2}t^2}, \rho \in \mathcal{P}\}.$$

Так как L_2 – гильбертово пространство, то достаточно проверить замкнутость системы, то есть показать, что $\mathcal{L}^\perp = \{0\}$. По определению:

$$f \in \mathcal{L}^\perp, \quad \Rightarrow \quad \int_{\mathbb{R}} f(t) t^n e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = 0, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Рассмотрим преобразование Фурье:

$$\begin{aligned} F\left[f(t)e^{-\frac{1}{2}t^2}\right](y) &= \int_{\mathbb{R}} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} f(t)e^{-\frac{1}{2}t^2} e^{-iyt} = \int_{\mathbb{R}} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} f(t)e^{-\frac{1}{2}t^2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iyt)^n}{n!} = \\ &\stackrel{\textcircled{1}}{=} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iy)^n}{n!} \int_{\mathbb{R}} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} f(t) \underbrace{t^n e^{-\frac{1}{2}t^2}}_{=0 \text{ по условию}} = 0, \end{aligned}$$

таким образом мы выяснили, что Фурье функции $\equiv 0$.

Далее воспользуемся тем, что $f(t)e^{-\frac{1}{2}t^2} \in L_2(\mathbb{R})$, а значит работает равенство Парсеваля:

$$\int_{\mathbb{R}} \left|f(t)e^{-\frac{1}{2}t^2}\right|^2 \frac{dt}{2\pi} = \int_{\mathbb{R}} |F[\dots](y)|^2 dy = 0, \quad \Rightarrow \quad f(t)e^{-\frac{1}{2}t^2} = 0, \quad \Rightarrow \quad f(t) = 0,$$

по крайней мере кроме множества меры нуль. Таким образом функции эрмита составляют базис в L_2 .

T7

Возьмём функцию, которая лежит в L_2 , но не лежит в $\mathring{C}[-\pi, \pi]$, например, ограничение $\text{sign } x$. И рассмотрим подпространство $V \subset \mathring{C}[-\pi, \pi]$, заданное ортогональностью к ней, то есть заданное формулой

$$\int_{-\pi}^0 f(x) dx = \int_0^{\pi} f(x) dx.$$

Это V есть замкнутое подпространство в $\mathring{C}[-\pi, \pi]$ и в нём можно выбрать какую-то полную систему, и даже её ортогонализировать. Если начать с тригонометрической системы, то косинусы и чётные синусы и так лежат в V , нечётные синусы надо будет подправить, скомбинировав их с $\sin x$, а потом ещё ортогонализировать (что может быть неприятно).

В итоге, система не может быть полна в $\mathring{C}[-\pi, \pi]$, так как её линейные комбинации не выходят за пределы V . А что касается замкнутости, то переходя в гильбертово L_2 видно, что ортогональное дополнение к замыканию образа V в гильбертовом пространстве одномерно и натянуто на этот вот $\text{sign } x$, который разрывен и не лежит в образе $\mathring{C}[-\pi, \pi]$. Так что замкнутость в терминах $\mathring{C}[-\pi, \pi]$ есть.

4.2 Банаховы пространства и их двойственные

T8

Здесь, и далее $p(x) = \|x\|$, $q(x) = \|x\|'$. Нормы эквивалентны, если

$$\exists m, M : mp(x) \leq q(x) \leq Mp(x) \quad \forall x.$$

Так вот, всегда есть $\{e_k\}_{k=1}^n$ базис Гамиля, такой что $x = \sum_{k=1}^n x_k e_k$, где естественно ввести норму вида

$$p(x) = \sum_{k=1}^n |x_k|.$$

Пусть $q(x)$ – ещё одна норма на X , в качестве мажоранты выберем $M = \max_{i=1, \dots, n} q(e_i)$. Теперь можем оценить сумму сверху:

$$q(x) = q\left(\sum_{k=1}^n x_k e_k\right) \leq \sum_{k=1}^n |x_k| q(e_k) \leq M \cdot p(x).$$

И оценить снизу:

$$|q(x) - q(y)| \leq q(x - y) \leq M \cdot p(x - y),$$

вообще это значит, что q – липшецев функционал, – непрерывный функционал на X с нормой p , а тогда и $q(x)$ непрерывный функционал X с нормой $p(x)$.

Lem 4.5. Шары в пространстве компактны тогда, и только тогда, когда $\dim X < +\infty$.

Рассмотрим сферу $S = \{x \in X \mid p(x) = 1\}$ – компакт. Но мы знаем, что непрерывный функционал на компакте достигает своего минимума:

$$\min_{x \in S} q(x) = \min_{p(x)=1} q(x) = m > 0.$$

Тогда на сфере S верно, что $q(x) \geq m$. Тогда в X $q(x) \geq m \cdot p(x)$. Действительно,

$$q(tx) = |t|q(x), \quad p(tx) = |t|p(x), \quad \Rightarrow \quad q(tx) = \frac{p(tx)}{p(x)}q(x) \geq m p(tx).$$

Собственно, $mp(x) \leq q(x) \leq M \cdot p(x)$, $Q.E.D.$

Т9. Пространство c

Пространство состоит из некоторых бесконечномерных «векторов» (последовательностей):

$$x = (x(1), x(2), \dots, x(k), \dots), \quad \left| \lim_{k \rightarrow \infty} x(k) \right| < +\infty.$$

Норма определена, как

$$p(x) = \|x\|_c = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x(k)| = \|x\|_\infty.$$

Докажем, что это пространство является банаховым, а именно полноту по $\|\cdot\|_\infty$ норме.

Рассмотрим последовательность x_n , где

$$x_n = (x_n(1), \dots, x_n(k), \dots).$$

Глобально хотим показать, что

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N(\varepsilon) \quad \forall l \in \mathbb{N} \quad \|x_{n+l} - x_n\|_\infty = \sup_{k \in \mathbb{N}} |x_{n+l}(k) - x_n(k)| < \varepsilon.$$

Попробуем через это продаться: из сходимости следует, что

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad |x_{n+l}(k) - x_n(k)| < \varepsilon.$$

Здесь можем выделить $(x_n(k))_{n \in \mathbb{N}}$ – числовая фундаментальная в \mathbb{R} . По критерию Коши:

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n(k) = y(k) \in \mathbb{R},$$

устанавливается покомпонентная сходимость. Теперь рассмотрим

$$\sup_{k \in \mathbb{N}} |x_n(k) - y(k)| = \|x_n - y\|_\infty < \varepsilon,$$

что автоматически означает, что $\exists y$ такой, что

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = y.$$

Следующий этап – показать, что

$$\exists \lim_{k \rightarrow \infty} y(k) \in \mathbb{R},$$

то есть показать полноту пространства:

$$\begin{aligned} |y(k+q) - y(k)| &= |y(k+q) - x_n(k+q) + x_n(k+q) - x_n(k) + x_n(k) - x_n(k)| \\ &\leq |y(k+q) - x_n(k+q)| + |y(k) - x_n(k)| + |x_n(k+q) - x_n(k)| \\ &< \varepsilon/3 + \varepsilon/3 + \varepsilon/3 = \varepsilon. \end{aligned}$$

Таким образом мы доказали полноту пространства¹.

Т10. Критерий Йордана-фон Неймана

Хочется понять, можно ли ввести на пространстве $C[a, b]$ скалярное произведение так, что норма пространства будет получаться из этого скалярного произведения.

Thr 4.6 (критерий Йордана-фон Неймана). *Норма $\|\cdot\|_X$ порождается скалярным произведением тогда, и только тогда, когда $\|\cdot\|_X$ удовлетворяет правилу параллелограмма:*

$$\forall x, y \in X \quad \|x + y\|_X^2 + \|x - y\|_X^2 = 2\|x\|_X^2 + 2\|y\|_X^2.$$

Выберем $C[0, \pi/2]$, и $x(t) = \cos t$, $y(t) = \sin t$. Заметим, что

$$\|x\|_\infty = \|y\|_\infty = 1, \quad \|x + y\|_\infty = \sqrt{2}, \quad \|x - y\|_\infty = 1, \quad 2 + 1 \neq 2 + 2,$$

таким образом пространство не гильбертово.

Т11. Поиск функционала

Далее будем обозначать за $\mathcal{D}(A)$ область определения оператора A , и $\mathcal{R}(A)$ – область значений. Оператор действует $A: X \mapsto Y$, где X и Y – линейные нормированные пространства.

¹ c_0, c_{00}, l_∞ – банаховы ли? (Ⓢ: c_0 (сходящиеся к 0), c_{00} (финитные), l_∞ (ограниченные)).

Def 4.7. Говорится, что линейный оператор $A: X \mapsto Y$ непрерывен в точке $x \in \mathcal{D}(A)$, если $\forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{D}(A)$, сходящейся к x в X , $Ax_n \rightarrow Ax$ в Y . Оператор глобально непрерывен, если он непрерывен $\forall x \in \mathcal{D}(A)$.

Lem 4.8. Для того, чтобы линейный оператор A был непрерывен на всей $\mathcal{D}(A)$, необходимо и достаточно, чтобы он был непрерывен в нуле.

Def 4.9. Линейный оператор $A: X \mapsto Y$ называется ограниченным, если $\exists C > 0: \|Ax\|_Y \leq C \cdot \|x\|_X \quad \forall x \in \mathcal{D}(A)$. Наименьшее из чисел C называется нормой оператора A и обозначается $\|A\|$.

Lem 4.10. Для того, чтобы линейный оператор был ограниченным, необходимо и достаточно, чтобы он переводил всякое ограниченное в X множество, в ограниченное в Y .

Thr 4.11. Оператор A непрерывен тогда, и только тогда, когда он ограничен.

Thr 4.12 (о норме линейного оператора). Верно, что

$$\|A\| = \sup_{\|x\|=1} \|Ax\| = \sup_{\|x\| \neq 0} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}.$$

Найдём норму функционала

$$A: f \mapsto \sum_{k=0}^N (-1)^k f\left(\frac{k}{N}\right),$$

на пространстве $C[0, 1]$.

Вообще нормированным пространством мы называем пару вида $(X, \|\cdot\|_X)$. И пусть есть некоторый непрерывный ограниченный оператор из X в Y . Если $Y = \mathbb{C}(\mathbb{R})$,

$$A = F: X \rightarrow \mathbb{C}(\mathbb{R}),$$

то A называют функционалом. Выберем в качестве $X = C[0, 1]$, а в качестве $F: C[0, 1] \mapsto \mathbb{C}(\mathbb{R})$. Функционал вида

$$F[f] = \sum_{k=0}^n (-1)^k f\left(\frac{k}{n}\right).$$

Что есть норма функционала? Норма функционала есть

$$\|F\| = \sup_{\|f\|_{\infty} \leq 1} |F[f]| = \sup_{\|f\|_{\infty} = 1} |F[f]| = \inf\{L > 0 \mid |F[f]| \leq L\|f\|_{\infty}\}, \quad \forall f \in C[0, 1].$$

Глобально, это доказывается, например, в Константинове очень подробно.

Всегда легко сверху ограничить. Тривиальный шаг:

$$|F[f]| = \left| \sum_{k=0}^n (-1)^k f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \sum_{k=0}^n \left| f\left(\frac{k}{n}\right) \right| \leq \sum_{k=0}^n \sup_{x \in [0, 1]} |f(x)| = (n+1) \cdot \|f\|_{\infty}.$$

Продолжаем,

$$\frac{|F[f]|}{\|f\|_{\infty}} \leq n+1, \quad \Rightarrow \quad \|F\| = \sup_{\|f\|_{\infty} = 1} |F[f]| \leq n+1.$$

Теперь выберем функцию $f_s(x) = f(k/n) = (-1)^k$. На ней мы действительно достигаем супремума, тогда

$$\|F\| = |F[f_s]| = n+1.$$

Таким образом нашли норму оператора.

В более общем случае можем показать, что

$$F[f] = \sum_{k=1}^n c_k x(t_k), \quad |F[f]| \leq \sum_{k=1}^n |c_k| \cdot \|f\|_{\infty}, \quad \Rightarrow \quad \|F\| \leq \sum_{k=1}^n |c_k|.$$

Далее, определив схожим образом непрерывную функцию \tilde{f} , равную $\text{sign } c_k$ в $t = t_k$ увидим, что $\|\tilde{f}\| = 1$,

$$\|F[\tilde{f}]\| \geq |F[\tilde{f}]| = \sum_{k=1}^n |c_k|,$$

таким образом решили чуть более общую задачу.

T12

Пусть функция g непрерывна на $[a, b]$. Найдём норму линейного отображения $M_g: L_2[a, b] \mapsto L_2[a, b]$, где $A_g(f) = [f]$ – мультипликативный оператор. Здесь $X = Y = L_2[a, b]$.

По определению, норма оператора $\|A_g\| = \sup_{\|f\|_X=1} \|A_g[f]\|_Y$. Аналогично, ищем ограничение сверху:

$$\|A_g[f]\|_2^2 = \|gf\|_2^2 = \int_{[a,b]} |gf|^2(x) \mu(dx) \leq \int_{[a,b]} \left\{ \sup_{x \in [a,b]} |g(x)| \right\}^2 |f(x)|^2 \mu(dx).$$

Вынесенный супремум позволит записать:

$$\|A_g[f]\|_2^2 \leq \|g\|_\infty^2 \|f\|_2^2, \quad \Rightarrow \quad \|A_g\| = \sup_{\|f\|_2=1} \|A_g[f]\|_2 \leq \|g\|_\infty.$$

Далее покажем, что норма не достигается, но сколь угодно близко приближается.

Есть функция

$$\sup_{x \in [a,b]} |g(x)| = |g(c)|,$$

есть некоторая $f_\varepsilon \in L_2[a, b]$ вида

$$f(x) = \begin{cases} \alpha_\varepsilon, & x \in [c - \varepsilon, c + \varepsilon], \\ 0, & x \notin [c - \varepsilon, c + \varepsilon], \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \|f_\varepsilon\|_2^2 = \int_{[c-\varepsilon, c+\varepsilon]} \alpha_\varepsilon^2 \mu(dx) = \alpha_\varepsilon^2 \cdot 2\varepsilon = 1, \quad \alpha_\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{2\varepsilon}}.$$

В таком случае рассмотрим

$$\|A_g[f_\varepsilon]\|_2^2 = \|gf_\varepsilon\|_2^2 = \alpha_\varepsilon^2 \int_{[c-\varepsilon, c+\varepsilon]} |g(x)|^2 \mu(dx) = \alpha_\varepsilon^2 \cdot 2\varepsilon |g(x_{c,\varepsilon})|^2 \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \|g\|_\infty^2,$$

в силу непрерывности g , по теореме о среднем.

Можно пойти другим путем, по определению:

$$\forall \varepsilon \in (0, \|g\|_\infty), \quad \exists x_\varepsilon \subseteq [a, b] \quad g(x) \geq \|g\|_\infty - \varepsilon,$$

почти всюду на X_ε . Выберем $h(x)$ вида

$$h(x) = \text{sign } g(x) \chi_{X_\varepsilon}(x), \quad \|h_\varepsilon\|_1 = \|h_\varepsilon\|_2 = \mu(X_\varepsilon),$$

тогда верно, что

$$\|A_g\| \geq \|A_g[h_\varepsilon]\|_1 \cdot \|h_\varepsilon\|_1 = \int_{[a,b]} |g(x)| \chi_{X_\varepsilon}(x) \mu(dx) \geq (\|g\|_\infty - \varepsilon) \chi \mu(X_\varepsilon), \quad \Rightarrow \quad \|A_g\| = \|g\|_\infty.$$

Аналогично в L_2 :

$$\|A_g\|^2 \geq \|g\| \chi_{X_\varepsilon} \|h_\varepsilon\|_2^2 \geq \|g\|_\infty^2 \mu^2(X_\varepsilon),$$

что приводит такому же результату.

T13

Сначала найдём норму оператора F , откуда уже получим значение нормы для J , где

$$F[f] = \int_a^b g(t) f(t) dt, \quad J[f] = \int_a^b K(x, y) f(y) dy,$$

где $g \in C[a, b]$, а F, J – линейные функционалы на $C[a, b]$.

Первая часть. Функционал F ограничен в силу

$$|F[f]| \leq \int_a^b |g(t)| |f(t)| dt \leq \|f\|_\infty \cdot \int_a^b |g(t)| dt.$$

Далее выберем произвольное $\varepsilon > 0$. По *теореме Кантора* найдётся такое разбиение отрезка $[a, b]$ точками $a = t_0 < t_1 < \dots < t_n = b$, что колебание $\omega_i(g)$ функции g на i -ом отрезке $\Delta_i = [t_{i-1}, t_i]$ удовлетворяет неравенствам

$$\omega_i(g) < \varepsilon, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Разобьём все Δ_i на две группы. В первую группу отнесем те отрезки, на которых g сохраняет знак. Пусть это будут отрезки $\Delta'_1, \dots, \Delta'_r$. Вторую группу $\Delta''_1, \dots, \Delta''_s$ образуют отрезки, на которых g меняется знак. В каждом промежутке второго типа существует точка, в которой g обращается в нуль. Ввиду установленных неравенств там $|g(t)| < \varepsilon$.

На промежутках первого типа положим $\tilde{f}(t) = \text{sign } g(t)$, в остальных точках $\tilde{f}(t)$ – линейная непрерывная

функция, удовлетворяющая неравенству $|\tilde{f}| \leq 1$. Тогда $\|\tilde{f}\| = 1$, и

$$\begin{aligned} \|F\| &= \sup_{\|f\|=1} |F[f]| \geq |F[\tilde{f}]| = \left| \int_a^b g(t) \tilde{f}(t) dt \right| = \left| \sum_{k=1}^r \int_{\Delta'_k} g(t) dt + \sum_{i=1}^s \int_{\Delta''_i} g(t) \tilde{f}(t) dt \right| \geq \\ &\geq \sum_{k=1}^r \int_{\Delta'_k} |g(t)| dt - \sum_{i=1}^s \int_{\Delta''_i} |g(t)| dt = \int_a^b |g(t)| dt - 2 \sum_{i=1}^s \int_{\Delta''_i} |g(t)| dt \geq \int_a^b |g(t)| dt - 2\varepsilon \cdot \mu[a, b], \end{aligned}$$

что ввиду произвольности ε означает, что $\|F\| \geq \int_a^b |g(t)| dt$, что вместе со знанием супремума позволяет утверждать: $\|f\| = \int_a^b |g(t)| dt$.

Вторая часть. Переходим к поиску нормы J :

$$\|J[f]\| = \sup_{t \in [a, b]} \left| \int_a^b K(t, s) f(s) ds \right| \leq \sup_{t \in [a, b]} \int_a^b |K(t, s)| \cdot |f(s)| ds \leq \|f\| \cdot \sup_{t \in [a, b]} \int_a^b |K(t, s)| ds,$$

таким образом, по определению

$$\|J\| \leq \sup_{t \in [a, b]} \int_a^b |K(t, s)| ds \stackrel{\text{def}}{=} M.$$

Так как ядро K непрерывно, то непрерывен и интеграл $\int_a^b |K| ds$, поэтому $\exists t_0 \in [a, b]$ такой, что $M = \int_a^b |K(t_0, s)| ds$.

Как было показано в первой части, $q(x) = \int_a^b |K(t_0, s)| f(s) ds$ – линейный непрерывный функционал на $C[a, b]$ с нормой равной M . Таким образом, выбирая \tilde{f} так, чтобы $\text{sign } \tilde{f}(s) = \text{sign } K(t_0, s)$ может утверждать, что супремум достигается, и

$$\|J\| = M = \sup_{t \in [a, b]} \int_a^b |K(t, s)| ds.$$

Thr 4.13 (Теорема Бэра для открытых множеств). *Счётное семейство открытых всюду плотных подмножеств банахова пространства имеет непустое пересечение.*

Thr 4.14 (Теорема Бэра для замкнутых множеств). *Если банахово пространство E покрыто счётным семейством замкнутых множеств, то одно из них имеет непустую внутренность.*

T14

Докажем, что алгебраический базис бесконечномерного банахова пространства не может быть счётным.

Вводился алгебраический базис Гамиля $\{e_\alpha\}_{\alpha \in A}$, где $\forall x \in E$ представляется в виде $x = \sum_{k=1}^n x_k e_{\alpha_k}$. Получается, что нужно показать, что в бесконечномерном банаховом пространстве такой базис не может быть счётным: докажем от противного.

Пусть $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$, тогда пространство описывается, как

$$E_n = \left\{ \sum_{k=1}^n x_k e_k \mid x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R} \right\} = \langle e_1, \dots, e_n \rangle, \quad \Rightarrow \quad E = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n.$$

Но по теореме Бэра для замкнутых множеств E не может быть счётным объединением нигде не плотных множеств.

Точнее, это было бы возможно, только с случае непустой внутренности одного из пространств E_n , что невозможно.

T15

Приведем пример плотного в $X = C[a, b]$ банахова пространства, со счётным базисом.

По теореме Вейерштрассе система степеней A полна в $C[a, b]$, что равносильно тому, что линейная оболочка системы степеней A плотна на $C[a, b]$. Таким образом, A со счётным базисом, является ответом на задачу.

Def 4.15. Последовательность элементов $\{e_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ называется *базисом* в пространстве² X , если $\forall x \in X$ существует единственный набор $\{x_i\}_{i \in \mathbb{N}_0}$ таких, что сумма вида (не конечная не при каком n)

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} x_k e_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n x_k e_k, \quad \Leftrightarrow \quad \exists! \{x_i\}_{i \in \mathbb{N}_0} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}_0 \quad \forall n \geq N_\varepsilon \quad \|x - \sum_{k=0}^n x_k e_k\|_X = \|x - S_n\| < \varepsilon.$$

²Если линейное нормированное пространство имеет не более, чем счётный базис, то оно сепарабельно. Однако существуют сепарабельные банаховы пространства без базиса.

Thr 4.16 (Теорема Банаха-Штейнгауза для линейных функционалов). Пусть семейство линейных функционалов $Y \subset E'$ ограничено в любой точке банахова пространства E , то есть для любого $x \in E$ множество чисел $\{\lambda(x) \mid \lambda \in Y\}$ ограничено. Тогда Y ограничено в смысле нормы в E' .

T16

Thr 4.17 (Расходимость ряда Фурье в точке). Существует непрерывная 2π -периодическая функция, ряд Фурье которой расходится в точке 0 .

Δ . На пространстве $\dot{C}[-\pi, \pi]$ непрерывных 2π -периодических функций с нормой $\|\cdot\|_C$ определим линейный функционал

$$\lambda_n(f) = \int_{-\pi}^{\pi} f(t) D_n(t) dt,$$

это значение n -й частичной суммы ряда Фурье в точке 0 , $T_n(f, 0)$. Можно заметить по определению нормы, что его норма равна

$$\|\lambda_n\| = \int_{-\pi}^{\pi} |D_n(t)| dt.$$

Оценим интеграл модуля ядра Дирихле стандартным способом:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|\sin(n+1/2)x|}{2\pi|\sin x/2|} dx \geq \int_{-\pi}^{\pi} \frac{|\sin(n+1/2)x|}{\pi|x|} dx = \int_{-\pi(1+1/2)}^{\pi(1+1/2)} \frac{|\sin u|}{\pi|u|} du \geq \\ &\geq \int_{-\pi(1+1/2)}^{\pi(1+1/2)} \frac{\sin^2 u}{\pi|u|} du = \int_{-\pi(1+1/2)}^{\pi(1+1/2)} \frac{1 - \cos 2u}{2\pi|u|} du \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1 - \cos 2u}{2\pi|u|} du = +\infty, \quad n \rightarrow \infty. \end{aligned}$$

Получается, то нормы функционалов λ_n при $n \rightarrow \infty$ не являются ограниченными. Следовательно, по теореме Банаха-Штейнгауза, примененной в обратную сторону, для некоторой функции $f \in \dot{C}[-\pi, \pi]$ значения $\lambda_n(f) = T_n(f, 0)$ не будут ограничены, и, следовательно, расходятся при $n \rightarrow \infty$. \square

T17

Для последовательностей

$$x = (x(1), \dots, x(k), \dots),$$

рассмотрим пространство вида

$$l_p = \{x \mid \|x\|_p \in \mathbb{R}\}, \quad \|x\|_p = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x(k)|^p \right)^{1/p}.$$

Возьмём пространство l_p как множество, но добавим норму из пространства l_q , где $\infty > q > p$. Покажем, что в таком «дырявом» пространстве не выполняется теорема Бэра и принцип равномерной ограниченности.

Рассмотрим шар A_n вида

$$A_n = \{x \in l_p \mid \|x\|_p \leq n\}, \quad l_p = \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n.$$

Докажем от противного, что A_n нигде не плотно.

Пусть существует такой $R > 0$ и $x_0 \in A_n$: $B_R(x_0) \subset \text{cl } A_n = A_n$.

$$\forall x \in l_p: \quad \rho_q(x, x_0) < R, \quad \Rightarrow \quad x \in A_n \quad \Rightarrow \quad \|x\|_p \leq n.$$

Рассмотрим некоторую последовательность

$$z(k) = \frac{R}{2} \frac{1}{\sum_{\kappa=1}^{\infty} \frac{1}{\kappa^{q/p}}} \frac{1}{k^{1/p}}.$$

Для начала,

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} (z(k))^q \right)^{1/q} = \|z\|_q = \frac{R}{2} < +\infty.$$

Далее, видим гармонический ряд

$$\sum_{k=1}^{\infty} (z(k))^p = +\infty, \quad \Rightarrow \quad \exists N: \sum_{k=1}^N (z(k))^p > (2n)^p.$$

Теперь рассмотрим набор «частниных последовательностей»

$$y(k) = \{z(k), \quad k \leq N, 0, \quad k > N.$$

Теперь рассмотрим последовательность $h(k) = (x_0 + y)(k)$, для которой верно, что

1. $\rho_q(h, x_0) = \|y\|_q \leq R/2$, откуда следует $\|h\|_p \leq n$.
2. $\|h\|_p \geq \|y\|_p - \|x_0\|_p > 2n - n = n$, а тогда $\|h\|_p > n$, таким образом пришли к противоречию.

Полное пространство нельзя представить, как объединение нигде не плотных множеств, получается l_p не полно. Осталось доказать, что A_n замкнуто.

Пусть t – точка прикосновения. Тогда $\forall \varepsilon > 0$ найдётся

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists x_\varepsilon \in A_n: \rho_q(t, x_\varepsilon) < \varepsilon, \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{k=1}^N |t(k) - x_\varepsilon(k)|^q < \varepsilon \quad \Rightarrow \quad |t(k) - x_\varepsilon(k)| < \varepsilon^{1/q},$$

получается это правда и для

$$\Leftrightarrow \quad \forall N \in \mathbb{N} \quad \left(\sum_{k=1}^N |t(k)|^p \right)^{1/p} \leq t(k) - x_\varepsilon(k) + x_\varepsilon(k) \leq \left(\sum_{k=1}^N |t(k) - x_\varepsilon(k)|^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=1}^N |x_\varepsilon(k)|^p \right)^{1/p} \leq (N\varepsilon^{p/q})^{1/p} + n,$$

что стремится к n при $\varepsilon \rightarrow 0$. Таким образом $\|t\|_p \leq n$.

И, наконец, докажем, что не выполняется принцип равномерной ограниченности. Рассмотрим функционалы

$$F_n[x] = \sum_{k=1}^n x(k).$$

Верно, что

$$\forall x \in l_1 \quad |F_n[x]| \leq \|x\|_1.$$

По норме $\|\circ\|_2$ верно, что эти функционалы можно переписать в виде скалярного произведения (x, e_n) , где $e_n = (1, \dots, 1, 0, \dots, 0, \dots)$:

$$F_n[x] = (x, e_n) = \sum_{k=1}^{\infty} x(k)(e_n)_{(k)} = \sum_{k=1}^n x(k),$$

что является проявлением одной из теорем Рисса. Положив $x = e_n$ видим, что норма достигается и $\|F_n\| = n \rightarrow \infty$ при $n \rightarrow \infty$. Таким образом мы показали, что на таком пространстве не работает принцип равномерной сходимости.

T18

Докажем, что в бесконечномерном банаховом пространстве E единичный шар не является компактным.

Lem 4.18 (Лемма Рисса или лемма о перпендикуляре). Если X_0 – замкнутое линейное подпространство в нормированном пространстве X , $X_0 \neq X$, тогда

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists x_\varepsilon \in X: \|x_\varepsilon\| = 1, \quad \|x_\varepsilon - y\| \geq 1 - \varepsilon \quad \forall y \in X_0.$$

Δ . Найдётся $z \in X \setminus X_0$, положим $\delta = \inf\{\|z - u\| \mid y \in X_0\} > 0$. Тогда выберем

$$\varepsilon_0 > 0: \frac{\delta}{\delta + \varepsilon_0} > 1 - \varepsilon,$$

выберем $y_0 \in X_0$ такой, что $\|z - y_0\| < \delta + \varepsilon_0$.

Далее, считая

$$x_\varepsilon = \frac{z - y_0}{\|z - y_0\|}, \quad \forall y \in X_0.$$

Теперь оценим

$$\|x_\varepsilon - y\| = \frac{1}{\|z - y_0\|} \|z - y_0 - \|z - y_0\|y\| \geq \frac{\delta}{\delta + \varepsilon_0} > 1 - \varepsilon.$$

Заметим, что

$$v = y_0 + \|z - y_0\|y \in X_0, \quad \Rightarrow \quad \|z - v\| \geq \delta.$$

□

Con 4.19. В $\forall X$ (бесконечномерном, нормированном пространстве) $\exists(x_n): \|x_n\| = 1$ и $\|x_n - x_k\| \geq 1$, $n \neq k$. Как следствие все шары $R > 0$ в X некомпактны.

△. Всякое бесконечное подмножество компакта имеет предельную точку. Последовательность x_n строится по индукции с помощью леммы Рисса. □

Thr 4.20 (Теорема Хана-Банаха). Пусть E – банахово пространство, $F \subset E$ – его линейное подпространство. Тогда всякий ограниченный линейный функционал $\lambda \in F'$ продолжается до линейного функционала на всём E без увеличения его нормы.

Con 4.21. Для всякого банахова пространства E и его ненулевого элемента $x \in E$ найдётся $\lambda \in E'$, такой что $\|\lambda\| = 1$ и $\lambda[x] = \|x\|$.

Con 4.22. Естественное отображение банахова пространства в двойственное к его двойственному (второе двойственное)

$$E \mapsto E'', \quad x \mapsto (\lambda \mapsto \lambda(x))$$

является вложением, сохраняющим норму.

Thr 4.23 (Теорема Радона-Никодима в \mathbb{R}^n). Пусть неотрицательная конечная борелевская мера μ на \mathbb{R}^n абсолютно непрерывна относительно меры Лебега. Тогда у меры ν есть плотность, то есть борелевская $f \geq 0$, такая что для всякого борелевского X $\nu(X) = \int_X f(x) dx$.

T19

Выведем из теоремы Хана-Банаха, что всякое конечномерное подпространство V в банаховом пространстве E имеет замкнутое дополнение $W \subseteq E$, такое что $E = V \oplus W$.

Thr 4.24. Для всякого ненулевого элемента x нормированного пространства X найдётся такой функционал l , что $\|l\| = 1$ и $l[f] = \|f\|$.

△. На одномерном пространстве X порожденном x положим $l_0(tx) = t\|x\|$. Тогда $l_0(x) = \|x\|$ и $\|l_0\| = 1$. Остается продолжить l на x с сохранением нормы. □

Из этой теоремы можно получить, что в случае бесконечномерного пространства X для всякого n найдутся такие векторы $x_1, \dots, x_n \in X$ и функционалы $l_1, \dots, l_n \in X^*$, что $l_i(x_j) = \delta_{ij}$. В частности поэтому, сопряженное пространство тоже бесконечномерно.

Con 4.25. Пусть X_0 – конечномерное подпространство нормированного пространства X . Тогда X_0 топологически дополняемо в X , т.е. существует такое замкнутое линейное подпространство X_1 , что X является прямой алгебраической суммой X_0 и X_1 , а естественные алгебраические проекции P_0 и P_1 на X_0 и X_1 непрерывны.

△. Можно найти базис x_1, \dots, x_n пространства X_0 и элементы $l_i \in X^*$ с $l_i(x_j) = \delta_{ij}$. Положим

$$X_1 \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap_{i=1}^n \text{Ker } l_i, \quad P_0[x] \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{i=1}^n l_i(x)x_i, \quad P_1[x] \stackrel{\text{def}}{=} x - P_0x.$$

Для всякого j имеем $P_0[x_j] - l_j(x_j)x_j = x_j$. В таком контексте становится понятно, что $P_0|_{X_1} = 0$, и $X_0 \cap X_1 = \{0\}$, $X = X_0 \oplus X_1$, ибо $x - P_0x \in X_1$ ввиду равенств $l_j(x - P_0x) = l_j(x) - l_j(x)l_j(x_j) = 0$. Непрерывность P_0 и P_1 понятна из определения, более того совпадают с алгебраическими проектированиями на X_0 и X_1 . □

T20

Приведем пример замкнутого в топологии нормы множества $X \subset E'$ (двойственное к некоторому банахову пространству), которое не замкнуто в его *-слабой топологии.

Ответ – сфера, докажем это. Покажем, что для $X \subset E'$ $\text{cl } X = X$ и $w.\text{cl } X \neq X$. Что есть сфера? Сфера есть

$$S = \{f \in E' \mid \|f\| = 1\}, \quad \text{cl } S = S, \quad w.\text{cl } S = \bar{S}, \quad \bar{S} = \{F \in E' \mid \|f\| \leq 1\}.$$

Введём дополнение $S_C \stackrel{\text{def}}{=} E' \setminus S$, и покажем, что оно открыто.

Выберем $g \in S_C$ с $\|g\| < 1$ и $\varepsilon = 1 - \|g\| > 0$. Пусть $h \in B_\varepsilon(g)$, более того

$$\|h\| = \|g + h - g\| \leq \|g\| + \|h - g\| < 1, \quad \Rightarrow \quad B_\varepsilon(g) \subseteq S_C.$$

Далее, пусть $g \in S_C$ и $\|g\| > 1$, тогда $\varepsilon = \|g\| - 1 > 0$. Выберем $h \in B_\varepsilon(g)$, тогда

$$\|g\| = \|h + g - h\| \leq \|h\| + \|g - h\|, \quad \Rightarrow \quad \|h\| \geq \|g\| - (\|g\| - 1) = 1,$$

получается $\|h\| > 1$ и $B_\varepsilon(g) \subseteq S_c$. Таким образом S_c открыто, S замкнуто.

Докажем теперь, что $w, \text{cl } S = \bar{B}$. Во-первых $\forall g_0 \notin B$ верно, что

$$\|g_0\| > 1, \quad \exists x_0 \in E, \exists \varepsilon_0 > 0 \forall g \in U_{x_0, g_0, \varepsilon_0} \quad \|g\| > 1, \quad \Rightarrow \quad w, \text{cl } S \subseteq B.$$

В частности, покажем, что

$$\|g\| \geq |g[x_0]| = |g[x_0] - g_0[x_0] + g_0[x_0]| \geq |g_0[x_0]| - |g[x_0] - g_0[x_0]|,$$

что уже можно сделать строго больше:

$$\|g\| > |g_0[x_0]| - \varepsilon_0 = 1,$$

где $\varepsilon_0 = |g_0[x_0]| - 1$.

Пусть теперь \forall фиксированного $g_0 \in \bar{B}$ с $\|g_0\| < 1$. Тогда

$$\exists U(g_0): g_0 \in \bigcap_{k=1}^N U_{x_k, g_k, \varepsilon_k} \subset U(g_0).$$

Утверждается, что существует ненулевой g такой, что $\forall t \in \mathbb{R}$ с $g_0 + tg \in U(g_0)$.

Осталось построить цилиндрическое множество по которому «прогуляемся» до нужной нам области. Пусть

$$\varphi(t) = \|g_0 + tg\| \in C(\mathbb{R}), \quad |\varphi(t_1) - \varphi(t_2)| \leq |t_1 - t_2| \cdot \|g\|.$$

Понятно, что $\varphi(0) = \|g_0\| < 1$. Тогда $\varphi(t) \geq |t| \cdot \|g\| - \|g\|_0 \rightarrow \infty$ при $t \rightarrow \infty$. По теореме о промежуточных значениях непрерывной функции

$$\exists t_0 \in \mathbb{R}: \varphi(t_0) = 1, \quad \Rightarrow \quad g_0 + t_0 g \in S.$$

Получается, что взяв точку из шара, и взяв её слабую окрестность, мы находим непустое пересечение этой окрестности со сферой. Из этого следует, что $g_0 \in w, \text{cl } S$, а тогда и $\bar{B} \subseteq w, \text{cl } S$, которое содержится в замкнутом шаре. Вывод: $\bar{B} = w, \text{cl } S$.

T21

Докажем, что $*$ -слабой топологии E' компактность некоторого множества влечет его замкнутость.

Lem 4.26. Слабая топология хаусдорфова.

Пусть K – компакт в ХТП X . Пусть $x \in X \setminus K$. Для $\forall y \in K$ $\exists U_y, V_y$ (открытые) такие, что $U_y \cap V_y = \emptyset$, где $x \in U_y$ и $y \in V_y$.

Рассмотрим систему $S = \{V_y \mid y \in K\}$ – открытое покрытие компакта K . Также $S_0 = \{V_y \mid y \in F\}$, F – конечное подмножество K (т.к. K – компакт).

Рассмотрим множество $U = \bigcap_{y \in F} U_y$ – открытая окрестность точки x . Утверждается, что $U \cap K = \emptyset$. Перебирая все точки $x \in K$ получаем доказательство исходного утверждения.

T22

Хочется найти такое топологическое пространство, в котором есть компактные, но не замкнутые подмножества. В качестве такого хаусдорфова топологического пространства можем выбрать $X = \{a, b\}$, базой топологии $\tau = \{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$.

Пример выглядит искусственным, но, на мой взгляд, большинство примеров нехаусдорфовых пространств выглядят очень искусственно.

4.3 Распределения (обобщенные функции)

Работать будем с $\mathcal{D}(X) \stackrel{\text{def}}{=} C_0^\infty(X)$, $X \subseteq \mathbb{R}$. Функция называется *финитной*, если $\text{supp } \varphi = K \subset X$,

$$\text{supp } \varphi \stackrel{\text{def}}{=} \bar{Y}, \quad Y = \{x \in X \mid \varphi(x) \neq 0\}.$$

Далее будем считать $\mathcal{D}(\mathbb{R}) \equiv \mathcal{D}$.

Вспомним, что $\varphi_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} \varphi$ означает $\exists [a, b] \supset \text{supp } \varphi_n$ и $\text{supp } \varphi$, а также $\varphi_n^{(k)} \xrightarrow{[a, b]} \varphi^{(k)}$, и тогда пишут, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n \stackrel{\mathcal{D}}{=} \varphi$.

Хочется определить пространство линейных непрерывных функционалов. Далее, договоримся обозначать $f(\varphi) \equiv f[\varphi] \stackrel{\text{def}}{=} \langle f \mid \varphi \rangle$.

Def 4.27. Функционал $f: \mathcal{D} \mapsto \mathbb{C}(\mathbb{R})$ непрерывен в \mathcal{D}' , если

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n \stackrel{\mathcal{D}}{=} \varphi, \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \langle f \mid \varphi_n \rangle = \langle f \mid \varphi \rangle.$$

Def 4.28. Всякий линейный функционал из \mathcal{D}' называют *обобщенной функцией* на \mathcal{D} .

Каждая локально-интегрируемая функция порождает некоторую обобщенную, их назовём *регулярными*. Если не существует такой локально-интегрируемой функции в D для функционала из \mathcal{D}' , то это *сингулярная обобщенная функция*. Стоит заметить, что регулярные обобщенные функции плотны в \mathcal{D}' , а их пополнением являются сингулярные.

Например, $\delta(x)$ можно представить как предел РОФ, где под пределом имеется ввиду

$$f_n \xrightarrow{\mathcal{D}'} f \quad (f_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{D}', \quad f \in \mathcal{D}', \quad \forall \varphi \in \mathcal{D} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \langle f_n | \varphi \rangle = \langle f | \varphi \rangle,$$

в частности тогда пишут

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \stackrel{\mathcal{D}'}{=} f \quad \Leftrightarrow \quad *w. \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f.$$

T23

Найдём пределы последовательностей регулярных элементов пространства \mathcal{D}' , при

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \langle \cos(nx) | \varphi \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(nx) \varphi(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} dx e^{inx} \varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \operatorname{Re} \hat{\varphi}(n) = \langle 0 | \varphi \rangle \stackrel{\mathcal{D}'}{=} 0.$$

По той же причине

$$*w. \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin(nx) = 0.$$

Найдём некоторые пределы в терминах обобщенных функций. В частности,

$$*w. \lim_{a \rightarrow +0} \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)} = *w. \lim_{\mathcal{B}_a} \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)},$$

где \mathcal{B}_a – база, состоящая из всех последовательностей, стремящихся к 0. В частности, при $a = 1/n$, перейдём к T24(a). Прямым вычислением, находим

$$\left\langle \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)} \middle| \varphi \right\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a \varphi(x)}{\pi(a^2 + x^2)} dx = \left(\lim_{\Lambda_+ \rightarrow +\infty} \int_0^{\Lambda_+} + \lim_{\Lambda_- \rightarrow -\infty} \int_{\Lambda_-}^0 \right) \frac{a \varphi(x)}{\pi(a^2 + x^2)} dx,$$

что интегрируя по частям можем свести к $\arctg x$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \lim_{\Lambda_+ \rightarrow +\infty} \left\{ \arctg \frac{x}{a} \varphi(x) \Big|_0^{\Lambda_+} - \int_0^{\Lambda_+} \left(\arctg \frac{x}{a} \right) \varphi'(x) dx \right\} + \frac{1}{\pi} \lim_{\Lambda_- \rightarrow -\infty} \left\{ \arctg \frac{x}{a} \varphi(x) \Big|_{\Lambda_-}^0 - \int_{\Lambda_-}^0 \left(\arctg \frac{x}{a} \right) \varphi'(x) dx \right\} = \\ = -\frac{1}{2} \varphi(x) \Big|_0^{\infty} + \frac{1}{2} \varphi(x) \Big|_{-\infty}^0 = \varphi(0) = \langle \delta(x) | \varphi \rangle, \end{aligned}$$

таким образом мы нашли, что

$$\left\langle \frac{a}{\pi(a^2 + x^2)} \middle| \varphi \right\rangle = \langle \delta(x) | \varphi \rangle.$$

Второй пункт сводится к интегрированию

$$\frac{1}{\pi} \int_0^x \frac{1}{t} \sin \frac{t}{a} dt = \frac{1}{\pi} \int_0^{x/a} \frac{d \sin y}{dy} dy = \frac{1}{\pi} \operatorname{Si} \left(\frac{x}{a} \right).$$

Вспоминая, что

$$\frac{1}{\pi} \operatorname{Si}(+\infty) = \frac{1}{\pi} \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{\pi} \operatorname{Si}(-\infty) = \frac{1}{\pi} \left(-\frac{\pi}{2} \right), \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \frac{\sin nx}{x} \stackrel{\mathcal{D}'}{=} \delta(x).$$

T25

Теперь найдём предел вида

$$*w. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 x}{(1 + n^2 x^2)^2} = *w. \lim_{a \rightarrow +0} \frac{xa}{(x^2 + a^2)^2} = F,$$

для этого

$$\left\langle \frac{xa}{(x^2 + a^2)^2} \middle| \varphi \right\rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{xa}{(x^2 + a^2)^2} \varphi(x) dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(-\frac{1}{2} \right) \left(\frac{\partial}{\partial x} \frac{a}{x^2 + a^2} \right) \varphi(x) dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{a \varphi'(x)}{x^2 + a^2} dx \xrightarrow{a \rightarrow +0} \frac{\pi}{2} \varphi'(0),$$

что, учитывая предыдущую задачу, позволяет записать

$$\frac{\pi}{2} \langle \delta(x) | \varphi' \rangle = \left\langle \left(-\frac{\pi}{2} \right) \delta'(x) \middle| \varphi \right\rangle, \quad \Rightarrow \quad w. \lim_{a \rightarrow +0} \frac{xa}{(x^2 + a^2)^2} = -\frac{\pi}{2} \delta'(x),$$

T26

Алгоритмично, обрабатываем выражение

$$\langle d | \varphi \rangle = \langle g \cdot \delta | \varphi \rangle = \langle \delta | g \cdot \varphi \rangle = g(0)\varphi(0) = \langle g(0\delta) | \varphi \rangle,$$

так приходим к упрощенному выражению вида

$$g(x)\delta(x) \stackrel{\mathcal{D}'}{=} g(0)\delta(x).$$

Во втором пункте $f = g\delta'$, упростим выражение

$$\begin{aligned} \langle f | \varphi \rangle &= \langle g\delta' | \varphi \rangle = \langle \delta' | g\varphi \rangle = -\langle \delta | (g\varphi)' \rangle = -\langle \delta | g'\varphi + g\varphi' \rangle = \\ &= -g'(0)\varphi(0) - g(0)\varphi'(0) = -g'(0)\langle \delta | \varphi \rangle - g(0)\langle \delta | \varphi' \rangle = \langle g(0)\delta' - g'(0)\delta | \varphi \rangle, \end{aligned}$$

таким образом приходим к равенству в \mathcal{D}' :

$$g(x)\delta'(x) \stackrel{\mathcal{D}'}{=} -g'(0)\delta(x) + g(0)\delta'(x).$$

T27

Lem 4.29. В \mathcal{D}' верно, что

$$(g \cdot f)^{(m)} = \sum_{k=0}^m C_m^k g^{(k)} f^{(m-k)}.$$

Найдём производные отдельных «строительных блоков»:

$$H(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases} \quad \tilde{H}(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 1/2, & x = 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Докажем, что

$$\text{sign } x = 2\tilde{H}(x) - 1, \quad \Rightarrow \quad \text{sign}'(x) = 2\tilde{H}'(x) = 2\delta(x).$$

Первый шаг, по определению,

$$\langle \text{sign}'(x) | \varphi \rangle = -\langle \text{sign } x | \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} \text{sign } x \varphi'(x) dx = \int_{-\infty}^0 \varphi'(x) dx - \int_0^{+\infty} \varphi'(x) dx = 2\varphi(0) = \langle 2\delta(x) | \varphi \rangle.$$

Теперь покажем, что

$$|x|' = (x \text{sign } x)' = \text{sign } x + x \text{sign}' x = \text{sign } x + x2\delta(x) = \text{sign } x.$$

Также можем найти вторую производную

$$|x|'' = \text{sign}'(x) = 2\delta(x).$$

Пункт а. Теперь легко посчитать, что

$$(g(x) \text{sign } x)' = g'(x) \text{sign } x + g(x) \text{sign}'(x) = g'(x) \text{sign } x + 2g(0)\delta(x),$$

где равенства подразумеваются в пространстве \mathcal{D}' . Для второй производной, находим

$$\begin{aligned} (g(x) \text{sign } x)'' &= g'' \text{sign } x + 2g'(x) \text{sign}' x + g(x) \text{sign}''(x) = g''(x) \text{sign } x + 4g'(0)\delta(x) + 2g(x)\delta'(x) = \\ &= g''(x) \text{sign } x + 4g'(0)\delta(x) + 2(-g'(0)\delta(x) + g(0)\delta'(x)) = g''(x) \text{sign } x + 2g'(0)\delta(x) + 2g(0)\delta'(x). \end{aligned}$$

Пункт б. Сразу подставим значение $g(x) = (x+1)e^{|x|}$:

$$g' = e^{|x|} (1 + (x+1) \text{sign } x),$$

$$g'' = e^{|x|} (1 + \text{sign } x + 2\delta(x)(x+1) + \text{sign } x + x + 1) = 2e^{|x|} (1 + x/2 + \text{sign } x + \delta(x)).$$

T28

Докажем, что слабая сходимост $\delta_{x_n} \rightarrow \delta_{x_0}$ эквивалентна обычной сходимости $x_n \rightarrow x_0$. Другими словами есть набор $f_n(x) = \delta(x - x_n)$ которые в пределе сходятся к $f(x) = \delta(x - x_0)$.

По определению,

$$\forall \varphi \in \mathcal{D} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \delta(x - x_n) | \varphi \rangle = \langle \delta(x - x_0) | \varphi \rangle.$$

В силу непрерывности функций в \mathcal{D} :

$$\forall \varphi \in \mathcal{D} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi(x_n) \varphi(x_0).$$

Наконец, это можно переписать в виде

$$\forall \varphi \in \mathcal{D} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N(\varphi, \varepsilon) \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N(\varphi, \varepsilon) \quad |\varphi(x_n) - \varphi(x_0)| < \varepsilon.$$

Это было дано. Хотелось показать, что из этого следует $x_n \rightarrow x_0$, или

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n \geq N_\varepsilon \quad |x_n - x_0| < \varepsilon.$$

Докажем от противного, пусть $x_n \rightarrow x_1 \neq x_0$. Тогда пусть $\varkappa = |x_1 - x_0|/3$, выберем функцию $\varphi = \chi_{X_0}(x) - \chi_{X_1}(x)$, где $X_0 = [x_0 - \varkappa, x_0 + \varkappa]$, $X_1 = [x_1 - \varkappa, x_1 + \varkappa]$. В таком случае, в пределе, $\langle f_n(x) | \varphi \rangle = -1$, при этом по условию $\langle f(x) | \varphi \rangle = 1$, что приводит нас к противоречию.

Пример (КЗ, 21.75)

Найдём

$$I = \langle (\ln x)' | \varphi \rangle = -\langle \ln |x| | \varphi \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} \ln |x| \varphi'(x) dx = \langle \text{smth} | \varphi \rangle,$$

однако просто вернуть производную на логарифм будет нехорошо. Запишем это так:

$$I = -\lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \left(\int_{-\infty}^{-\varepsilon} + \int_{\varepsilon}^{+\infty} \right) \ln |x| \varphi'(x) dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} [\ln \varepsilon \cdot (\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon))] + \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx.$$

Здесь заметим, что

$$\ln \varepsilon \cdot (\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)) = 2\varepsilon \ln \varepsilon \cdot \frac{\varphi(\varepsilon) - \varphi(-\varepsilon)}{2\varepsilon} = 0 \cdot \varphi'(0) = 0,$$

тогда

$$I = \lim_{\varepsilon \rightarrow +0} \int_{|x| > \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx,$$

но $1/x$ – не является локально интегрируемой в 0 функцией. Итого

$$I = \text{v. p.} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(x)}{x} dx = \left\langle \mathcal{P} \frac{1}{x} \middle| \varphi \right\rangle.$$

Другими словами мы установили, что

$$(\ln |x|)' \stackrel{D'}{=} \mathcal{P} \frac{1}{x}, \Leftrightarrow (\ln |x|)' \stackrel{*w.}{=} \mathcal{P} \frac{1}{x}, \Leftrightarrow \langle (\ln |x|)' | \varphi \rangle = \left\langle \mathcal{P} \frac{1}{x} \middle| \varphi \right\rangle.$$

Пример (КЗ, 21.84)

Уместен вопрос: когда верно, что

$$\langle \lambda'_f | \varphi \rangle = \langle \lambda_{f'} | \varphi \rangle.$$

Далее пусть $\frac{d}{dx}$ – классическая производная, f' – производная обобщенной функции, тогда наш вопрос будет выглядеть, как

$$\langle f' | \varphi \rangle = \left\langle \frac{df}{dx} \middle| \varphi \right\rangle + \sum_{k=1}^n \Delta f(x_k) \langle \delta(x - x_k) | \dots \rangle,$$

где x_k – точки разрыва классической функции f , а

$$\Delta f(x_k) = f(x_k + 0) - f(x_k - 0) \in \mathbb{R}.$$

В частности рассмотрим случай с $x_k = 0$. Тогда

$$\langle f' | \varphi \rangle = -\langle f | \varphi' \rangle = -\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \varphi'(x) dx,$$

что удобно расписать в виде

$$-\left(\int_{-\infty}^0 + \int_0^{+\infty} \right) f(x) \varphi'(x) = -f(x) \varphi(x) \Big|_{+0}^{+\infty} - f(x) \varphi(x) \Big|_{-\infty}^{-0} + \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{df(x)}{dx} \varphi(x) dx = \Delta f(0) \langle \delta(x) | \varphi \rangle + \left\langle \frac{df}{dx} \middle| \varphi \right\rangle.$$

Т29 и Т30

Сначала докажем, что всякое распределение $\lambda \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ имеет первообразную, то есть такую $\mu \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$, что $\mu' = \lambda$ в смысле дифференцирования обобщенных функций. Потом докажем, что любые две первообразные одного и того же распределения отличаются на константу.

Lem 4.30. Пусть $f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ и так оказалось, что $f' = 0$, тогда f имеет вид $\langle f | \varphi \rangle = c \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx$.

△. Утверждается, что $c = \langle f | \varphi_0 \rangle$ годится, где

$$\varphi_0 \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) : \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi_0(x) dx = 1.$$

Итак, любую функцию $\varphi \in \mathcal{D}$ можно представить в виде

$$\varphi = -\theta \cdot \varphi_0 + \theta' \cdot \varphi_0, \quad \theta = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx.$$

Зададим функцию от вида

$$\psi(x) = \int_{-\infty}^x (\varphi(t) - \theta \varphi_0(t)) dt \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Собирая всё вместе находим

$$\psi' = \varphi - \theta \cdot \varphi_0, \quad \Rightarrow \quad \langle f | \varphi \rangle = \langle f | \psi' + \theta \varphi_0 \rangle = \langle f | \psi' \rangle + \theta \langle f | \varphi_0 \rangle,$$

где $-\langle f' | \psi \rangle = 0$ по условию. Также $\langle f | \varphi_0 \rangle = c$, тогда верно, что

$$\psi' = c \cdot \theta = c \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx, \quad \text{Q. E. D.}$$

□

Thr 4.31. Для всякой обобщенной функции f из $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ существует $g \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ такая, что $g' \stackrel{\mathcal{D}'}{=} f$. Для всякой другой $h \in \mathcal{D}'(\mathbb{R})$ верно, что если $h' \stackrel{\mathcal{D}'}{=} f$, то $g - h \stackrel{\mathcal{D}'}{=} c$.

△. Точно также берем некоторую φ, ψ . Положим, по определению, что

$$\langle g | \varphi \rangle \stackrel{\text{def}}{=} -\langle f | \Psi \rangle,$$

для которого хотелось бы показать линейность и непрерывность.

Для этого рассмотрим

$$\langle g | \varphi_1 + \varphi_2 \rangle = -\langle f | \psi_1 + \psi_2 \rangle = -\left\langle f \left| \int_{-\infty}^x (\varphi_1 + \varphi_2 - (\theta_1 + \theta_2)\varphi_0) dt \right. \right\rangle = -\langle f | \psi_1 \rangle - \langle f | \psi_2 \rangle.$$

Осталось показать непрерывность, точнее показать, что линейной отображение $\varphi \rightarrow \psi$ непрерывно на $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Рассмотрим в частности $\varphi_k \stackrel{\mathcal{D}'}{\rightarrow} 0$, для них $\theta_k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$. Построим теперь $\varphi_k - \theta_k \varphi_0 \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и имеют нулевые интегралы. Более того

$$\hat{l}(\varphi_k) = \psi_k = \int_{-\infty}^x (\varphi_k(t) - \theta_k \varphi_0(t)) dt \in \mathcal{D}(\mathbb{R}).$$

Итого $\psi_k \rightarrow 0$ при $k \rightarrow \infty$, что и завершает доказательство непрерывности.

□

T31

Thr 4.32. Для \forall СОФ $g \in \mathcal{D}'$, с носителем в открытом шаре, существует такая РОФ f и $k \in \mathbb{N}$, что $f^{(k)} = g$.

Def 4.33. Носитель обобщенной функции $\text{supp } f$ – дополнение к объединению всех открытых множеств U , на которых f равна нулю. Обобщённая функция f равна нулю на U , если $\langle f | \varphi \rangle = 0$ для всех φ таких, что $\text{supp } \varphi$ содержится в U .

Примером такой функции (которая не является m -й производной РОФ), носитель которой не помещается в открытый шар, может служить распределение вида

$$f = \sum_{k=1}^{\infty} \delta^{(k)}(x - k).$$

Докажем от противного, пусть $g^{(m)} = f$ и g – РОФ.

Ну, по определению,

$$\langle (-1)^m g^{(m)} | \varphi \rangle = (-1)^m \sum_{k=0}^{\infty} \varphi^{(k)}(x - k) (-1)^k = (-1)^m \sum_{n=N}^N \varphi^{(k)}(x - k) (-1)^k.$$

Распишем чуть подробнее свёртку с g :

$$I = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) \varphi^{(m)}(x) dx = (-1)^m \sum_{k=0}^N \varphi^{(k)}(k) (-1)^k.$$

Теперь выберем φ , такую, что это ступенька гаусс вокург $x = m$, тогда

$$I = (-1)^m (-1)^m \varphi^{(m)}(m) = \langle \delta(x - m) | \varphi^{(m)} \rangle,$$

таким образом пришли к противоречию.

4.4 Преобразование Фурье обобщенных функций

Для преобразования Фурье над пространством обобщенных функций медленного роста S – пространства Шварца, верны следующие утверждения:

$$\langle F[f] | \varphi \rangle = \langle f | F[\varphi] \rangle, \quad \langle F^{-1}[f] | \varphi \rangle = \langle f | F^{-1}[\varphi] \rangle, \quad F[f^{(n)}] = (ix)^n F[f], \quad F^{(n)}[f] = (-i)^n F[x^n f].$$

Верно, что $\mathcal{D} \subset S$. Также важно держать в голове, что

$$F[1] = \sqrt{2\pi} \delta.$$

Т32

Найдём преобразование Фурье в S' некоторых функций.

Синус. Найдём преобразование Фурье вида

$$\begin{aligned} \langle F^{-1}[\delta(x - x_0)] | \varphi \rangle &= \langle \delta(x - x_0) | F^{-1}[\varphi] \rangle = F^{-1}[\varphi](x_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dt}{\sqrt{2\pi}} \varphi(t) e^{ix_0 t} = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} dt f(t) \varphi(t) = \left\langle \frac{e^{ix_0 t}}{\sqrt{2\pi}} \middle| \varphi \right\rangle, \quad \Rightarrow \quad F^{-1}[\delta(x - x_0)](t) = \frac{e^{ix_0 t}}{\sqrt{2\pi}}. \end{aligned}$$

Отсюда следует, что

$$\langle F[e^{ix_0 t}] | \varphi \rangle = \langle F[\sqrt{2\pi} F^{-1}[\delta(x - x_0)]] | \varphi \rangle,$$

тогда можем перегруппировать, и найти

$$\langle F[e^{ix_0 t}] | \varphi \rangle = \langle \sqrt{2\pi} \delta(x - x_0) | \varphi \rangle.$$

Нас, правда, интересует Фурье от синуса

$$\langle F[\sin(x_0 t)] | \varphi \rangle = \left\langle F \left[\frac{e^{ix_0 t} - e^{-ix_0 t}}{2i} \right] \middle| \varphi \right\rangle = \left\langle \sqrt{\frac{\pi}{2}} i (\delta(x + x_0) - \delta(x - x_0)) \middle| \varphi \right\rangle.$$

Тогда \mathcal{D}' справедливо равенство вида

$$F[\sin(x_0 t)] \stackrel{\mathcal{D}'}{=} \sqrt{\frac{\pi}{2}} i (\delta(x + x_0) - \delta(x - x_0)).$$

Дельта-функция. Пользуясь формулой n -й производной

$$\begin{aligned} \langle F[\delta^{(n)}(x)] | \varphi \rangle &= \langle \delta^{(n)}(x) | F[\varphi] \rangle = (-1)^n F^{(n)}[\varphi](0) = \frac{(-1)^n}{i^n} F[x^n \varphi](0) = \left\langle \frac{(-1)^n}{i^n} \delta(x) \middle| F[x^n \varphi] \right\rangle = \\ &= i^n \langle F[\delta(x)] | x^n \varphi \rangle = \langle (ix)^n F[\delta(x)] | \varphi \rangle = \left\langle \frac{(ix)^n}{\sqrt{2\pi}} \middle| \varphi \right\rangle, \end{aligned}$$

таким образом пришли к равенству вида

$$F[\delta^{(n)}(x)] \stackrel{\mathcal{D}'}{=} \frac{(ix)^n}{\sqrt{2\pi}}.$$

Фунция Хевисайда. Для начала найдём преобразование Фурье функции $\theta(x)e^{-tx}$ при $t > 0$

$$F[\theta(x)e^{-tx}] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty e^{-x(t+iy)} dx = \frac{-i}{\sqrt{2\pi}(y-it)}.$$

Покажем теперь, что в S'

$$\lim_{t \rightarrow +0} \theta(x)e^{-tx} = \theta(x).$$

Действительно, для каждой функции $\varphi \in S$ и любого числа A имеем

$$|\langle \theta(x) | \varphi(x) \rangle - \langle \theta(x)e^{-tx} | \varphi(x) \rangle| = \left| \int_0^\infty (1 - e^{-tx}) \varphi(x) dx \right| \leq \left| \int_0^A (1 - e^{-tx}) \varphi(x) dx \right| + \left| \int_A^\infty (1 - e^{-tx}) \varphi(x) dx \right|.$$

Теперь зафиксируем $\sigma \in S$ и какое-либо число $\varepsilon > 0$. В силу абсолютной интегрируемости φ , существует $A > 0$ такоо, что $\int_A^{+\infty} < \varepsilon/2$, тогда

$$\left| \int_A^\infty (1 - e^{-tx}) \varphi(x) dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}.$$

Выберем теперь $t_0 > 0$ так, чтобы при $0 < t < t_0$ было справедливо неравенство

$$(1 - e^{-tA}) \int_0^A |\varphi(x)| dx < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \Rightarrow \quad |\langle \theta(x) | \varphi(x) \rangle - \langle \theta(x) e^{-tx} | \varphi(x) \rangle| < \varepsilon.$$

Таким образом утверждение про $\lim_{t \rightarrow +0} \theta(x) e^{-tx} = \theta(x)$ верно.

В силу непрерывности преобразования Фурье

$$\lim_{t \rightarrow +0} F[\theta(x) e^{-tx}] = F[\theta(x)], \quad \Rightarrow \quad F[\theta(x)] = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{t \rightarrow +0} \frac{i}{y - it},$$

причём мы сразу утверждаем, что S' предел существует, и, кстати, обозначается за $\frac{i}{y - i0}$. Тогда

$$F[\theta(x)] = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{i}{y - i0}.$$

Т33

Докажем, что если $f \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$ и преобразование Фурье $F[f] \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, то $f \equiv 0$.

По Зоричу, если есть некоторое преобразование сигнала

$$\hat{f}(\omega) \equiv F[f](\omega) = \frac{\sqrt{2\pi}}{2a} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} f\left(\frac{\pi}{a}k\right) \exp\left(-i\frac{\pi k}{a}\omega\right),$$

где $\hat{F}(\omega) = 0$ за пределами $|\omega| > a$, то мы приходим ряду с некоторыми отсчётными значениями. Но, так как $f \in \mathcal{D}$, то можем записать тригонометрический полином вида

$$\hat{f}(\omega) = \frac{\sqrt{2\pi}}{2a} \sum_{k=-N}^N f\left(\frac{\pi}{a}k\right) \exp\left(-i\frac{\pi k}{a}\omega\right) = 0,$$

ведь у конечного полинома не может быть континуально нулей.

Теорема Котельникова

Рассмотрим получаемый сигнал $f(t)$ с финитным спектром, отличный от нуля только для $\omega < a > 0$. Итак, $\hat{f}(\omega) \equiv 0$ при $|\omega| > a$, поэтому представление

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

для функции с финитным спектром сводится к интегралу лишь по промежутку $[-a, a]$. На этом отрезке функцию $\hat{f}(\omega)$ разложим в ряд Фурье

$$\hat{f}(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k(\hat{f}) \exp\left(i\frac{\pi\omega}{a}k\right),$$

по полной и ортогональной система на этом отрезке. Для коэффициентов этого ряда можем получить простое выражение вида

$$c_k(\hat{f}) = \frac{1}{2a} \int_{-a}^a \hat{f}(\omega) \exp\left(i\frac{\pi\omega}{a}k\right) d\omega = \frac{\sqrt{2\pi}}{2a} f\left(-\frac{\pi}{a}k\right).$$

Собирая всё вместе находим, что

$$f(t) = \frac{1}{2a} \sum_{k=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{\pi}{a}k\right) \int_{-a}^a \exp\left(i\omega\left(t - \frac{\pi}{a}k\right)\right) d\omega.$$

Вычисляя эти интегралы и приходим к формуле Котельникова:

$$f(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} f\left(\frac{\pi}{a}k\right) \frac{\sin a\left(t - \frac{\pi}{a}k\right)}{a\left(t - \frac{\pi}{a}k\right)}.$$

Таким образом, для восстановления сообщения, опиописываемого функцией с финитным спектром, сосредоточенным в полосе частот $|\omega| < a$ достаточно передать по каналу связи лишь значения $f(k\Delta)$ (называемые

отсчетными значениями) данной функции через равные промежутки времени $\Delta = \pi/a$.

Т34

Докажем, что преобразование Фурье в S' переводит распределение

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta_{2\pi n} \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta_n.$$

Thr 4.34 (Формула Пуассона). *Так называется следующее соотношение:*

$$\sqrt{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi(2\pi n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}(n).$$

\triangle . Формула получается при $x = 0$ из равенства вида

$$\sqrt{2\pi} \sum_{m=-\infty}^{\infty} \varphi(x + 2\pi n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}(n) e^{inx},$$

которое мы и докажем.

Поскольку $\varphi, \hat{\varphi} \in S$, ряды сходятся абсолютно и равномерно по x на \mathbb{R} . Также стоит заметить, что

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi(x + 2\pi n)$$

бесконечно гладкая и 2π -периодическая. Пусть $\{\hat{c}_k(f)\}$ – её коэффициенты Фурье по ортонормированной системе $\left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{ikx}, k \in \mathbb{Z} \right\}$. Тогда

$$\hat{c}_k(f) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) e^{ikx} dx = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{2\pi n}^{2\pi(n+1)} \varphi(x) e^{ikx} dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) e^{ikx} dx \stackrel{\text{def}}{=} \hat{\varphi}(k).$$

Но ряд Фурье f сходится к ней в любой точке $x \in \mathbb{R}$, значит в любой точке $x \in \mathbb{R}$ справедливо соотношение

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi(x + 2\pi n) = f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{c}_n(f) \frac{e^{inx}}{\sqrt{2\pi}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \hat{\varphi}(n) e^{ikx}, \text{ Q. E. D.}$$

□

Тогда в пределах задания можем переписать это в терминах обобщенных функций

$$\sqrt{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle \delta(x - 2\pi n) | \varphi \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle \delta(x - n) | F[\varphi] \rangle = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \langle F[\delta(x - n)] | \varphi \rangle.$$

Тогда приходим к выражению вида

$$F \left[\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n) \right] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - 2\pi n).$$

Вообще $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n) = G$ называют *решеткой Дирака*.

Утверждается, что G_N сходится в S' к $G \forall \varphi$. В частности,

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \langle G_N(x) | \varphi \rangle = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=-N}^N \varphi(n) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \varphi(n) = \left\langle \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n) \middle| \varphi \right\rangle,$$

так что ряд действительно сходится и всё хорошо.