

# БИЛЕТЫ ПО КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ

**Авторы заметок:** Хоружий Кирилл  
Примак Евгений

**От:** 24 декабря 2021 г.

Я так давно родился,  
Что слышу иногда,  
Как надо мной проходит  
Студёная вода.

...  
Я так давно родился,  
Что говорить не могу,  
И город мне приснился  
На каменном берегу.

А я лежу на дне речном  
И вижу из воды  
Далекий свет, высокий дом,  
Зелёный луч звезды.

A. A. Тарковский



Также выражаем благодарность Гурьевой Соне и Мещерякову Паше за консультации по отдельным задачам.

## Содержание

Задача №1 . . . . .	3
Задача №2 . . . . .	3
Задача №3 . . . . .	3
Задача №4 . . . . .	4
Задача №5 . . . . .	4
Задача №6 . . . . .	4
Задача №7 . . . . .	5
Задача №8 . . . . .	5
Задача №9 . . . . .	6
Задача №12 . . . . .	6
Задача №13 . . . . .	6
Задача №14 . . . . .	7
Задача №15 . . . . .	7

**Задача №1**

Найти собственные значения и собственные функции оператора трансляции  $\hat{T}_a$ . Также рассказать про «квазимпульс», «функции Блоха» и «зону Бриллюэна».

Оператор трансляции работает  $\hat{T}_a |x\rangle = |x+a\rangle$  или так  $\langle x|T_a\Psi\rangle = \Psi(x+a)$ . **Написать про пассивные и активные преобразования.**

Оператор трансляции унитарный, а для унитарного оператора  $\hat{A}$  и его собственных состояний  $\hat{A}|\lambda\rangle = \lambda|\lambda\rangle$  легко показать, что

$$\langle A\lambda|A\lambda\rangle = \langle\lambda|A^\dagger A\lambda\rangle = \langle\lambda|\lambda\rangle, \quad \langle A\lambda|A\lambda\rangle = \lambda\lambda^*\langle\lambda|\lambda\rangle \Rightarrow \langle\lambda|\lambda\rangle = 1 = \lambda\lambda^*.$$

Тогда имеем  $\lambda = e^{i\varphi}$ , что приводит к самому виду оператора  $\hat{A} = e^{i\hat{\varphi}}$ , где  $\hat{\varphi}$  – эрмитов.

Оператор трансляции запишем в виде  $\hat{T}_a = e^{i\hat{\varphi}}$ , и оператор фазы  $\hat{\varphi} = \frac{1}{\hbar}\mathbf{a}\cdot\hat{\mathbf{k}}$ , где  $\hat{\mathbf{k}}$  – оператор квазимпульса. Собственные же волновые функции для  $\hat{T}_a$  выразим в координатном представлении

$$\hat{T}_a |\Psi\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{a}\cdot\mathbf{k}} |\Psi\rangle \Rightarrow \langle \mathbf{r}|T_a|\Psi\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{a}\cdot\mathbf{k}} |\Psi\rangle.$$

Они удовлетворяют уравнению

$$\Psi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{a}\cdot\mathbf{k}} \Psi(\mathbf{r}) \Rightarrow \Psi(\mathbf{r}) = e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{r}\cdot\mathbf{k}} \Phi(\mathbf{r}), \quad \Phi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = \Phi(\mathbf{r}),$$

и называются функциями Блоха.

Собственные значения выражаются в виде  $\lambda = e^{\frac{i}{\hbar}\mathbf{a}\cdot\mathbf{k}}$ .

**Задача №2**

Вычислить  $[x, \hat{p}^2]$ ,  $[U(x), \hat{p}]$ ,  $[U(x), \hat{p}^2]$ .

В координатном представлении  $\hat{x} = x$  и  $\hat{p}_x = -i\hbar\partial_x$ , тогда  $\hat{p}_x^2 = -\hbar^2\partial_x^2$ .

**0) Начнём с нулевого примера, чтобы убедиться, что правильно смотрим на мир:**

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}]\psi(x) &= x(-i\hbar)\partial_x\psi - (-i\hbar)\partial_x(x\psi) = i\hbar\psi + i\hbar x\partial_x\psi - i\hbar x\partial_x\psi = i\hbar\psi, \\ \Rightarrow [\hat{x}, \hat{p}] &= i\hbar. \end{aligned}$$

**a)** Аналогично, в смысле операторного равенства,

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}^2]\psi(x) &= x(-i\hbar)^2\partial_x^2\psi - (-i\hbar)^2\partial_x^2(x\psi) = -\hbar^2x\partial_x^2\psi + \hbar^2\partial_x(\psi + x\partial_x\psi) = \\ &= -\hbar^2x\partial_x^2\psi + \hbar^2\partial_x\psi + \hbar^2\partial_x\psi + \hbar^2x\partial_x^2\psi = 2i\hbar\hat{p}\psi, \\ \Rightarrow [\hat{x}, \hat{p}^2] &= 2i\hbar\hat{p}. \end{aligned}$$

**б)** Теперь найдём коммутатор с некоторой функцией  $U(x)$ :

$$\begin{aligned} [U(\hat{x}), \hat{p}]\psi(x) &= U(x)(-i\hbar\partial_x\psi) + i\hbar\partial_x(U\psi) = U(-i\hbar\partial_x\psi) + i\hbar(\psi\partial_xU + U\partial_x\psi) = i\hbar(\partial_xU)\psi, \\ \Rightarrow [U(\hat{x}), \hat{p}] &= 2i\hbar\hat{p}. \end{aligned}$$

**в)** Наконец,

$$\begin{aligned} [U(\hat{x}), \hat{p}^2]\psi(x) &= U(-\hbar^2)\partial_x^2\psi + \hbar^2\partial_x^2U\psi = U(-\hbar^2)\psi'' + \hbar^2(\psi U'' + 2U'\psi' + \psi''U) = \\ &= \hbar^2(\psi U'' + 2U'\psi') = (\hbar^2U'' + \hbar^2iU'\hat{p})\psi, \\ \Rightarrow [U(\hat{x}), \hat{p}^2] &= \hbar^2U'' + 2i\hbar U'\hat{p}. \end{aligned}$$

**Задача №3**

Доказать соотношения Фейнмана-Гельмана  $\partial_\lambda f_n(\lambda) = \langle n|\partial_\lambda \hat{f}(\lambda)|n\rangle$ , где  $f_n$  – собственное значение  $\hat{f}|n\rangle = f_n|n\rangle$ , то есть  $f_n = \langle n|\hat{f}|n\rangle$ .

△. По формуле Лейбница:

$$\begin{aligned} \partial_\lambda f_n &= \langle n|\partial_\lambda \hat{f}|n\rangle + \langle \partial_\lambda n|\hat{f}|n\rangle + \langle n|\hat{f}|\partial_\lambda n\rangle = \langle n|\partial_\lambda \hat{f}|n\rangle + \langle \partial_\lambda n|n\rangle f_n + \langle n|\partial_\lambda n\rangle f_n = \\ &= \langle n|\partial_\lambda \hat{f}|n\rangle + f_n \partial_\lambda \langle n|n\rangle = \langle n|\partial_\lambda \hat{f}|n\rangle, \end{aligned}$$

что и требовалось доказать. □

**Задача №4**

| Найти операторы рождения и уничтожения для гармонического осциллятора в представлении Гейзенберга.

**I.** Запишем уравнение Гейзенберга

$$i\hbar \frac{df}{dt} = i\hbar \frac{\partial \hat{f}}{\partial t} + [\hat{f}, \hat{H}].$$

Запишем гамильтониан системы

$$\hat{H} = \hbar\omega \left( \hat{a}^\dagger \hat{a} + \frac{1}{2} \right),$$

тогда можем найти

$$i\hbar \frac{d\hat{a}}{dt} = \hbar\omega [\hat{a}, \hat{a}^\dagger \hat{a}] = \hbar\omega (\hat{a}\hat{a}^\dagger \hat{a} - \hat{a}^\dagger \hat{a}\hat{a}) = \hbar\omega ([\hat{a}, \hat{a}^\dagger] \hat{a}) = \hbar\omega \hat{a},$$

и, решая диффур, находим

$$i\hbar \frac{d\hat{a}}{dt} = \hbar\omega \hat{a}, \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \hat{a}(t) = e^{-i\omega t} \hat{a}, \\ \hat{a}^\dagger(t) = e^{i\omega t} \hat{a}^\dagger. \end{cases}$$

**II.** Можно было напрямую, воспользоваться

$$\hat{U}(t) = \exp \left( -\frac{i}{\hbar} \hat{H}t \right), \quad \Rightarrow \quad \hat{a}(t) = \hat{a} + (i\omega t)[\hat{a}^\dagger \hat{a}, \hat{a}] + (i\omega t)^2 [\hat{a}^\dagger \hat{a}, -\hat{a}] + \dots = \exp(-i\omega t) \hat{a},$$

где мы воспользовались равенством, доказанным в У6:

$$e^{\xi A} B e^{-\xi A} = B + \xi [A, B] + \frac{1}{2!} \xi^2 [A, [A, B]] + \dots$$

**Задача №5**

| Вычислить коммутаторы  $[l_\alpha, x_\beta]$ ,  $[l_\alpha, p_\beta]$ .

Напомним, что мы работаем с

$$l_\alpha = \varepsilon_{\alpha}^{\beta\gamma} r_\beta p_\gamma \quad [l_\alpha, a_\beta] = i\varepsilon_{\alpha\beta}^{\gamma} a_\gamma, \quad \hat{p}_\gamma = -i\partial_\gamma.$$

Тогда подействуем на функцию состояния

$$[l_\alpha, x_\beta]\psi(x) = [-i\varepsilon_{\alpha\beta'\gamma} x^{\beta'} \partial^\gamma, x_\beta]\psi(x) = -i\varepsilon_{\alpha\beta'\gamma} x^{\beta'} \partial^\gamma (x_\beta \psi(x)) + i\varepsilon_{\alpha\beta'\gamma} x^{\beta'} x_\beta \partial^\gamma \psi(x) = -i\varepsilon_{\alpha\beta'\beta} x^{\beta'} \psi(x)$$

Таким образом мы свели действие заданного оператора к

$$[l_\alpha, x_\beta] = -i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} x^\beta s$$

Для другого случая действуем абсолютно аналогично

$$[l_\alpha, p_\beta]\psi(x) = [-i\varepsilon_{\alpha\beta'\gamma} x^{\beta'} \partial^\gamma, -i\partial_\beta]\psi(x) = -\varepsilon_{\alpha\beta'\gamma} x^{\beta'} \partial^\gamma \partial_\beta \psi(x) + \varepsilon_{\alpha\beta'\gamma} \partial_\beta (x^{\beta'} \partial^\gamma \psi(x)) = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \partial^\gamma \psi(x)$$

Таким образом мы свели действие заданного оператора к

$$[l_\alpha, p_\beta] = \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \partial^\gamma = -i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} p^\gamma$$

**Задача №6**

| Доказать равенство  $(\sigma \cdot a)(\sigma \cdot b) = (a \cdot b) + i\sigma \cdot [a \times b]$ , где  $a, b$  – векторы.

Напомним, как выглядят матрицы Паули сами по себе

$$\hat{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \hat{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix},$$

а также как выглядят коммутатор и антисимметрический коммутатор

$$[\hat{\sigma}_\alpha, \hat{\sigma}_\beta] = 2i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{\sigma}_\gamma, \quad \{\hat{\sigma}_\alpha, \hat{\sigma}_\beta\} = \hat{\sigma}_\alpha \hat{\sigma}_\beta + \hat{\sigma}_\beta \hat{\sigma}_\alpha = 2\delta_{\alpha\beta}$$

Таким образом сложив коммутатор и антисимметрический коммутатор получим

$$\hat{\sigma}_\alpha \hat{\sigma}_\beta = \frac{1}{2} [\hat{\sigma}_\alpha, \hat{\sigma}_\beta] + \frac{1}{2} \{\hat{\sigma}_\alpha, \hat{\sigma}_\beta\} = i\varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \hat{\sigma}_\gamma + \delta_{\alpha\beta},$$

А значит, мы знаем и как найти требуемое скалярное произведение

$$(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \hat{\boldsymbol{\sigma}}_\alpha \mathbf{a}^\alpha + \hat{\boldsymbol{\sigma}}_\beta \mathbf{b}^\beta = i\hat{\boldsymbol{\sigma}}_\gamma \varepsilon_{\alpha\beta\gamma} \mathbf{a}^\alpha \mathbf{b}^\beta + \delta_{\alpha\beta} \mathbf{a}^\alpha \mathbf{b}^\beta = i\hat{\boldsymbol{\sigma}}_\gamma [\mathbf{a} \times \mathbf{b}]^\gamma + \mathbf{a}^\alpha \mathbf{b}_\alpha = i[\mathbf{a} \times \mathbf{b}] \cdot \hat{\boldsymbol{\sigma}} + (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}).$$

### Задача №7

Найти уровни энергии и волновые функции стационарных состояний частицы в потенциальном ящике

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, a], \\ +\infty, & x \in \mathbb{R} \setminus [0, a]. \end{cases}$$

Стационарное уравнение Шрёдингера:

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x), \quad \Rightarrow \quad \psi''(x) + \frac{2mE}{\hbar^2}\psi(x) = 0.$$

Тогда решение может быть найдено в виде

$$\psi(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx), \quad k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2},$$

но в силу требования  $\psi(x)|_{x \in \{0, a\}} = 0$ , сразу получаем  $B = 0$ , и условие на  $k$ :

$$k = k_n = \frac{\pi n}{a}, \quad \Rightarrow \quad E_n = \frac{\hbar^2}{2ma^2} \pi^2 n^2,$$

то есть спектр дискретный.

Из нормировки  $\psi$  можем найти

$$\langle \psi | \psi \rangle = \int_0^a dx |\psi(x)|^2 = \frac{|A|^2}{2} a = 1, \quad \Rightarrow \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}.$$

Тогда искомая волновая функция стационарных состояний и соответствующие уровни энергии

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{\pi n}{a} x\right), \quad E_n = \frac{\hbar^2}{2ma^2} \pi^2 n^2.$$

### Задача №8

Найти уровни энергии<sup>a</sup> и волновые функции стационарных состояний частицы в потенциале  $U(x) = -\frac{\hbar^2}{m} \varkappa_0 \delta(x)$ .

<sup>a</sup>Формально «уровень энергии»,  $\delta$ -ямая – всегда мелкая яма, то есть  $\exists!$  связное состояние.

**Координатное представление.** Сделаем замечание, что  $E < 0$ , тогда получим

$$\hat{H}\psi = -|E|\psi, \quad \varkappa^2 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{2m|E|}{\hbar^2}.$$

С такой заменой получим:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' - \frac{\hbar^2}{m}\varkappa_0 \delta(x)\psi + |E|\psi = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi'' - (\varkappa - 2\varkappa_0 \delta(x))\psi = 0.$$

Мы ожидаем непрерывности от волновой функции на границах областей, а именно в точке дельта-ямы, то есть одним из граничных условий будет  $\psi(-0) = \psi(+0)$ .

Потребовав непрерывности  $\psi$ , из-за дельта функции, мы получаем разрыв для первой производной

$$\psi'' - (\varkappa - 2\varkappa_0 \delta(x))\psi = 0 \quad \xrightarrow{\int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon}} \quad \psi'(+0) - \psi'(-0) = -2\varkappa_0 \psi(0).$$

Вне ямы будем наблюдать спад по экспоненте, сама же яма – по сути точечна, значит такое же поведение будем ожидать и в связном состоянии, таким образом ищем волновую функцию как

$$\psi = \begin{cases} C_1 e^{-\varkappa x}, & x > 0 \\ C_2 e^{\varkappa x}, & x < 0 \end{cases}$$

Из непрерывности получим автоматически, что

$$\psi(-0) = \psi(+0) \quad \Rightarrow \quad C_2 = C_1 = C.$$

Разрыв же первой производной позволит нам найти

$$\psi'(+0) - \psi'(-0) = -2\varkappa_0 \psi(0) \quad \Rightarrow \quad -2\varkappa_0 C = C(-\varkappa - \varkappa) \quad \Rightarrow \quad \varkappa = \varkappa_0.$$

Таким образом энергия связного состояния:

$$E = -\frac{\hbar^2 \varkappa_0^2}{2m}.$$

Теперь, осталось проверить нормировку нашей волновой функции

$$\int_{\mathbb{R}} \psi \psi^* dx = 1 \quad \Rightarrow \quad C^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\varkappa_0|x|} dx = \frac{C^2}{\varkappa_0} \int_0^{+\infty} e^{-2\varkappa_0 x} d2\varkappa_0 x = \frac{C^2}{\varkappa_0} = 1 \quad \Rightarrow \quad \varkappa_0 = C^2.$$

Таким образом собирая всё вместе получаем волновую функцию вида:

$$\langle x | 0 \rangle = \psi(x) = \sqrt{\varkappa_0} e^{-\varkappa_0|x|}.$$

**Импульсное представление.** Вставляя разбиение единицы, вида  $\mathbb{1} = \int_{\mathbb{R}} |x\rangle \langle x| dx$ , находим

$$\psi(p) = \langle p | 0 \rangle = \int_{\mathbb{R}} dx \langle p | x \rangle \langle x | 0 \rangle = \left\langle p | x \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}} e^{-\frac{i}{\hbar} px} \Bigg/ = \frac{\sqrt{\varkappa_0}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\varkappa_0 x - \frac{i}{\hbar} px} dx = \frac{\sqrt{\varkappa_0}}{\sqrt{2\pi\hbar}} \cdot \frac{2\varkappa_0}{\varkappa_0^2 + (p/\hbar)^2} = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{(\varkappa_0\hbar)^{3/2}}{(\varkappa_0\hbar)^2 + p^2}.$$

### Задача №9

| Найти волновую функцию, минимизирующую соотношение неопределенностей  $\Delta x \cdot \Delta p = \hbar/2$ .

Возьмём операторы импульса  $\hat{p} = -i\hbar\partial_x$  и координаты  $\hat{x}$ . Сразу найдём их средние и коммутатор

$$\bar{x} = \langle x \rangle = \langle \psi | \hat{x} | \psi \rangle, \quad \bar{p} = \langle p \rangle = \langle \psi | \hat{p} | \psi \rangle, \quad [\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar.$$

Перейдём к несмещенным переменным:

$$\hat{\xi} = \hat{x} - \bar{x}, \quad \hat{\eta} = \hat{p} - \bar{p}, \quad [\hat{\xi}, \hat{\eta}] = i\hbar.$$

С неизмененным значением дисперсии

$$(\Delta\xi)^2 = \langle \psi | (\hat{\xi} - \bar{\xi}) | \psi \rangle = \langle \psi | (\hat{x} - \bar{x}) | \psi \rangle = (\Delta x)^2, \quad (\Delta\eta)^2 = (\Delta p)^2.$$

Теперь введем функцию  $\Phi$  по методу Вейля

$$|\Phi\rangle = (\hat{\xi} - i\gamma\hat{\eta}) |\psi\rangle.$$

И, по определению нормы,  $\langle \Phi | \Phi \rangle \geq 0$ , а значит

$$\langle \psi | (\hat{\xi} - i\gamma\hat{\eta})^\dagger (\hat{\xi} - i\gamma\hat{\eta}) | \psi \rangle = \langle \psi | \hat{\xi}^2 - i\gamma(\hat{\xi}\hat{\eta} - \hat{\eta}\hat{\xi}) + \gamma^2 \hat{\eta}^2 | \psi \rangle \geq 0.$$

Неотрицательной должно быть и выражение

$$(\Delta x)^2 + \hbar\gamma + \gamma^2(\Delta p)^2 \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \hbar^2 - 4(\Delta p)^2(\Delta x)^2 \leq 0,$$

что получилось просто из условия на дискриминант для квадратного уравнения на  $\gamma$ , тогда минимум достигается просто при нулевом дискриминанте

$$(\Delta p)^2(\Delta x)^2 = \frac{\hbar}{4}, \quad \gamma = -2 \frac{(\Delta x)^2}{\hbar}.$$

Таким образом и нашли волновую функцию, которая удовлетворяет минимизации соотношения неопределенностей, что мы четко и показали

$$|\Phi\rangle = [\hat{x} - \bar{x} + \frac{2i}{\hbar}(\Delta x)^2(\hat{p} - \bar{p})] |\psi\rangle,$$

для некоторой  $\forall\psi$ .

### Задача №12

| Записать стационарное уравнение Шредингера для атома водорода в импульсном представлении.

### Задача №13

| Найти средние значения  $1/r$ ,  $1/r^2$  и  $p^2$  для nl-состояний атома водорода, используя теорему вириала и теорему Фейнмана–Гельмана.

Используя общую теорему о вириале:  $2\langle \hat{T} \rangle = \langle \mathbf{r} \cdot \frac{\partial V(r)}{\partial r} \rangle$ , а также явно потенциал в атоме водорода  $V(r) = -\frac{e^2}{r}$  явно найдём то, как у нас работает вириал:

$$\frac{\partial V(r)}{\partial r^\alpha} = \frac{\partial V(r)}{\partial r} \cdot \frac{r_\alpha}{r} = -\frac{r_\alpha}{r^2} V(r) \quad \Rightarrow \quad \mathbf{r} \cdot \frac{\partial V(r)}{\partial \mathbf{r}} = -r^\alpha \frac{r_\alpha}{r^2} V(r) = -V(r) \quad \Rightarrow \quad \langle T \rangle = -\frac{1}{2} \langle V(r) \rangle$$

Тогда, раз мы работаем с атомом водорода, с одной стороны мы знаем энергию на  $n$ -ом уровне  $E_n$ , а с другой эта энергия – есть сумма средних потенциальной и кинетической энергий:

$$E_n = -\frac{\hbar^2}{2ma^2} \frac{1}{n^2} = \langle T \rangle + \langle V \rangle = \frac{1}{2} \langle V \rangle = -\frac{e^2}{2} \langle 1/r \rangle \quad \Rightarrow \quad \boxed{\langle 1/r \rangle = \frac{\hbar^2}{2me^2} \frac{1}{n^2 a^2} = \frac{1}{an^2}}$$

Сразу же из кинетической энергии получаем:

$$\langle T \rangle = -\frac{1}{2} \langle V(r) \rangle \quad \Rightarrow \quad \left\langle \frac{\hat{p}^2}{2m} \right\rangle = \frac{e^2}{2} \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle \quad \Rightarrow \quad \boxed{\langle \hat{p}^2 \rangle = \frac{\hbar^2}{a^2 n^2}}$$

Чтобы получить последний ответ, воспользуемся теоремой Фейнмана-Геллмана<sup>1</sup>

$$\frac{\partial E_n}{\partial t} = \langle n | \frac{\partial \hat{H}}{\partial t} | n \rangle, \quad \hat{H} = \frac{\hat{p}_r^2}{2m} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{mr^2} - \frac{e^2}{r}, \quad n = n_r + l + 1.$$

Тогда заметим, что производная по  $l$  и даёт нам среднее от оставшегося выражения:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial \hat{H}}{\partial l} &= \frac{\hbar^2(l+\frac{1}{2})}{mr^2} \\ \frac{\partial E_n}{\partial l} &= \frac{\partial E_n}{\partial n} = \frac{\hbar^2}{mn^3 a^2} \end{aligned} \right\} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\langle 1/r^2 \rangle = \frac{1}{a^2 n^3 (l + \frac{1}{2})}}$$

### Задача №14

Вычислить в квазиклассическом приближении уровни энергии и собственные функции частицы для

$$U(x) = \begin{cases} +\infty, & x < 0 \\ \frac{1}{2} m \omega^2 x^2, & x > 0 \end{cases}$$

Нужно быть аккуратными, слева – бесконечная граница, что требует от нас наложения граничного условия

$$\psi(0) = 0 \quad \Rightarrow \quad \psi_{x \geq 0}(x=0) \sim \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_{x=0}^{x_0} p(x) dx + \frac{\pi}{4}\right) = 0.$$

Таким образом запишем модифицированное правило квантования Бора-Зоммерфельда

$$\int_0^{x_0} p(x) dx = \pi \hbar \left(n + \frac{3}{4}\right).$$

Подставим импульс как  $p(x) = \sqrt{2m(E_n - V(x))}$  возьмём интеграл от 0 до  $x_0 = \sqrt{2E/(m\omega^2)}$  – то есть в классически разрешенной области

$$\int_0^{x_0} p(x) dx = \int_0^{x_0} \sqrt{2mE_n - m^2\omega^2 x^2} dx = \frac{E_n}{\omega} \int_0^\pi \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{\pi}{2\omega} E_n \quad \Rightarrow \quad \boxed{E_n = \hbar\omega \left(2n + \frac{3}{2}\right)}$$

В квазиклассическом приближении  $\psi(x) \sim \frac{1}{\sqrt{p(x)}} \cdot \exp\left[\frac{i}{\hbar} \int p(x) dx\right]$  тогда исходя из правила согласования квазиклассических решений при переходе из запрещенной (затухание) в разрешенную (осцилляция) область

$$\psi_n(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \frac{C}{\sqrt{p(x)}} \sin\left(\frac{1}{\hbar} \int_x^{x_0} p(\xi) d\xi\right), & 0 < x \leq x_0 \\ \frac{C}{2\sqrt{|p(x)|}} \exp\left(-\frac{1}{\hbar} \int_{x_0}^x |p(\xi)| d\xi\right), & x_0 \leq x \end{cases}$$

Остается только найти константы из условия

$$C^2 = \frac{4m}{T} = 4 \frac{1}{\int_0^{x_0} dx / p(x)} = \frac{2m\omega}{\pi}.$$

### Задача №15

Квазиклассическое рассмотрение  $\alpha$ -распада, закон Гейгера–Неттола.

<sup>1</sup>он же Хеллман, он же Гельман, он же "окорок" и он же "одногонгий"

Стоит всё-таки вспомнить потенциал из задания, ведь именно такой потенциал впервые рассматривался в теории  $\alpha$ -распада. И так

$$U(x) = \begin{cases} -U_0, & 0 < x < a \\ \frac{2Ze^2}{x}, & x > a \end{cases}$$

Коэффициент прохождения через такой барьер, как отношение входящего потока к выходящему

$$\mathcal{T} \sim \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_a^b |p(x)| dx\right), \quad \int_a^b |p(x)| dx = \int_a^b \sqrt{2m|E-U(x)|} dx = \sqrt{2m} \int_a^{2Ze^2/E} \sqrt{\frac{2Ze^2}{x} - E} dx.$$

Остается только вычислить интеграл, для удобства введём  $\beta = \frac{aE}{2Ze^2}$ , тогда

$$\mathcal{T} \sim \exp\left[-\frac{4Ze^2}{\hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}} (\arccos \sqrt{\beta} - \sqrt{\beta(1-\beta)})\right]$$

И если мы уже далеко отошли от пика  $x = a$ , то  $\beta \ll 1$  и соответственно коэффициент пропускания

$$\mathcal{T} \sim \exp\left(-\frac{2\pi Ze^2}{\hbar} \sqrt{\frac{2m}{E}}\right).$$

Соответственно альфа частицы из потенциала такого вида могут туннелировать, с известным теперь нам коэффициентом, то есть излучаться. Таким образом вероятность излучения в единицу времени пропорциональна пропусканию:  $w = n\mathcal{T}$ , где  $n$  – частота столкновений частиц с барьером. Если ввести характерную скорость частиц в потенциальной яме ( $x < a$ ), то

$$n \sim v/a, \quad v \sim p/m_\alpha \sim \frac{\hbar}{m_\alpha a} \Rightarrow n \sim \frac{\hbar}{m_\alpha a^2}.$$

Вероятность распада в единицу времени  $\lambda$  связан с периодом полураспада  $T$

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{w} \approx \frac{m_\alpha a^2 \ln 2}{\hbar D} = C_1 \exp\left(\frac{C_2}{\sqrt{E}}\right) \Rightarrow \boxed{\ln T_{1/2} = A + \frac{B}{\sqrt{E}}}$$

Конечное равенство представляет собой уравнение *Гейгера-Неттола*. Константы выписывать конечно не интересно, ведь и так наши рассуждения носят оценочный характер, но на всякий случай

$$A = \ln C_1 \approx \ln\left(\frac{m_\alpha a^2 \ln 2}{\hbar}\right), \quad B = C_2 \approx \frac{2\pi Ze^2 \sqrt{2m}}{\hbar}.$$