

# ЗАДАНИЕ ПО КУРСУ «КВАНТОВАЯ МЕХАНИКА II»

Автор заметок: Хоружий Кирилл

От: 11 марта 2022 г.

## T1

**Линейное возмущение.** Во-первых будем работать в представлении операторов  $\hat{a}$  и  $\hat{a}^\dagger$ :

$$\hat{x} = \frac{x_0}{\sqrt{2}} (\hat{a} + \hat{a}^\dagger), \quad \hat{p} = \frac{p_0}{\sqrt{2}} (\hat{a} - \hat{a}^\dagger), \quad x_0 = \sqrt{\frac{\hbar}{m\omega}}, \quad p_0 = \frac{\hbar}{x_0}.$$

Рассмотрим возмущение, вида

$$\hat{V} = \alpha x,$$

Заметим, что в первом порядке

$$V_{nn} = \frac{\alpha x_0}{\sqrt{2}} \langle n | \hat{a} + \hat{a}^\dagger | n \rangle = 0.$$

Тогда для второго порядка рассмотрим

$$V_{kn} = \frac{\alpha x_0}{\sqrt{2}} (\langle k | \sqrt{n} | n-1 \rangle + \sqrt{n+1} | n+1 \rangle) = \frac{\alpha x_0}{\sqrt{2}} (\sqrt{n} \delta_{k,n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{k,n+1}).$$

Теперь находим  $\Delta_2$ :

$$\Delta_2 = \frac{\alpha x_0^2}{2} \left( \frac{n}{\hbar\omega} - \frac{n+1}{\hbar\omega} \right) = -\frac{\alpha^2}{2m\omega^2}.$$

Действительно, при замене переменных в  $\hat{H}_0$  можем увидеть, что вторая поправка даёт точный ответ:

$$\hat{H} = \frac{m\omega^2}{2} \left( \hat{x} + \frac{\alpha}{m\omega^2} \right)^2 = \frac{\alpha^2}{2m\omega^2} + \frac{\hat{p}^2}{2m}.$$

**Нелинейное возмущение.** Рассмотрим возмущение вида

$$\hat{V} = Ax^3 + Bx^4.$$

Тогда первая поправка к энергии:

$$\Delta_1^B = V_{nn} = \frac{3B\hbar^2}{4m^2\omega^2} (2n^2 + 2n + 1), \quad \Delta_1^A = 0.$$

Вторую поправку найдём через

$$V_{kn}^A = A \left( \frac{x_0}{\sqrt{2}} \right)^3 \left( 3\delta_{k,n-1} n\sqrt{n} + 3\delta_{k,n+1} (n+1)\sqrt{n+1} + \delta_{k,n+3} \sqrt{(n+1)(n+2)(n+3)} + \delta_{k,n-3} \sqrt{n(n-1)(n-2)} \right).$$

Тогда

$$\Delta_2^A = -\frac{A^2\hbar^2}{8m^3\omega^4} (30n^2 + 30n + 1), \quad \Delta \approx \Delta_1^B + \Delta_2^A.$$

## T2

**Атом-ион.** Рассмотрим возмущение, вида

$$\hat{V} = -\mathbf{d}_{\text{ат}} \cdot \mathbf{E}_{\text{ион}}, \quad \mathbf{E}_{\text{ион}} = \frac{Q\mathbf{r}}{r^3}, \quad \mathbf{d}_{\text{ат}} = \sum_{i=1} e_i \mathbf{r}_i.$$

Живём в парадигме

$$\hat{\mathbb{P}} \psi_{\text{ат}} = \lambda_p \psi_{\text{ат}}, \quad \lambda_p = \pm 1, \quad \hat{\mathbb{P}} \hat{\mathbf{r}} = -\hat{\mathbf{r}} \hat{\mathbb{P}}, \quad \hat{\mathbb{P}}^2 = \mathbb{1}.$$

Для начала заметим, что

$$\Delta_1 = \langle \psi_{\text{ат}} | \hat{V} | \psi_{\text{ат}} \rangle = -\mathbf{E}_{\text{ион}} \cdot \langle \mathbf{d}_{\text{ат}} \rangle = 0.$$

Для второй поправки

$$\Delta_2 \sim -\frac{1}{r^4}.$$

**Атом-атом.** Возмущение теперь вида

$$\hat{V} = -\frac{1}{r^3} (3(\mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{n})(\mathbf{d}_2 \cdot \mathbf{n}) - \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2), \quad \mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

Первая поправка как обычно


$$\Delta_1 = \langle \psi_1 | d_1^\alpha | \psi_1 \rangle \langle \psi_2 | d_2^\beta | \psi_2 \rangle \delta_{\alpha\beta} = 0.$$

Зато вторая поправка

$$\Delta_2 \sim -\frac{1}{r^6}.$$

### Т3

Рассмотрим процесс, вида



Энергия в основном состоянии

$$U_H = -\frac{e^2}{r}, \quad U_{He} = -\frac{2e^2}{r}.$$

Волновые функции:

$$\psi_{100}^H = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}, \quad \psi_{100}^{He} = \sqrt{\frac{2^3}{\pi a^3}} e^{-2r/a}.$$

При  $n = 2$ :  $l = 0, \pm 1$ , тогда

$$\psi_{200}^{He} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a} \left(1 - \frac{r}{a}\right).$$

Заметим, что остальные функции можем игнорировать, но для этого на них нужно посмотреть:

$$\psi_{2,1,-1}^{He} = \frac{2^{5/2}}{8a\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a} e^{-i\varphi} r \sin \theta;$$

$$\psi_{2,1,0}^{He} = \frac{2^{5/2}}{4a\sqrt{2\pi a^3}} e^{-r/a} r \cos \theta;$$

$$\psi_{2,1,1}^{He} = \bar{\psi}_{2,1,-1}^{He}.$$

Тогда искомая вероятность

$$w_{100} = |\langle \psi_{100}^{He} | \psi_{100}^H \rangle|^2 \approx 0.7,$$

$$w_{200} = |\langle \psi_{200}^{He} | \psi_{100}^H \rangle|^2 \approx 0.25,$$

с их отношением  $w_{100}/w_{200} \approx 2.8$ .

### Т4

Продолжаем работать с основным состоянием водорода, а значит

$$\langle \mathbf{r} | \psi \rangle = \psi_{100}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}.$$

**Электростатика.** Вспоминаем, что

$$\Delta\varphi = -4\pi\rho_0, \quad \frac{4\pi}{3}\rho_0 r^3 = -e > 0, \quad r_0 \approx 10^{-13} \text{ см.}$$

Расписываем лапласиан в сферических координатах:

$$\Delta\varphi(r) = \nabla^2\varphi(r) = \varphi'' + \frac{2}{r}\varphi' = \frac{1}{r}(r\varphi)'', \quad \Rightarrow \quad r\varphi = -4\pi\rho_0 \iint r,$$

а значит

$$\varphi = \frac{e}{r_0^3} \frac{r^2}{2} + C_1 + \frac{C_0}{r}.$$

Считая  $\Delta\varphi$  понимаем, что  $\delta(\mathbf{r})$  быть не должно, а значит  $C_0 = 0$ . По условиям сшивки находим, что

$$U = \begin{cases} -e^2/r, & r \geq r_0 \\ e^2 r^2 / 2r_0^3 + C_1 e, & r_1 \leq r_0 \end{cases} \Rightarrow C_1 = -\frac{3}{2} \frac{e}{r_0}.$$

Итого, искомый потенциал

$$\varphi = \frac{e}{r_0^3} \frac{r^2}{2} - \frac{3}{2} \frac{e}{r_0}.$$

**Кванты.** Поправку можем найти, считая

$$-\frac{e^2}{r} \mapsto U(r), \quad \Rightarrow \quad \varphi_{\text{new}} - \varphi = \frac{e^2 r^2}{2r_0^3} - \frac{3e}{2r_0} - \left(-\frac{e^2}{r}\right), \quad r \leq r_0.$$

А значит, интегрируя, находим

$$\Delta_1 = \langle \psi | \hat{V} | \psi \rangle = \int_0^{r_0} r^2 dr \int_{-1}^1 d \cos \theta \int_0^{2\pi} d\varphi \left( \frac{e^2 r^2}{2r_0^3} - \frac{3}{2} \frac{e}{r_0} + \frac{e^2}{r} \right) = \frac{2e^2}{5a} \left( \frac{r_0}{a} \right)^2.$$

## T5

Помним, что

$$\psi_{100} = \frac{1}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}, \quad a = \frac{\hbar}{mc\alpha_{em}}.$$

Также помним, что

$$\mathbf{d} = e\mathbf{r}, \quad \hat{V} = -\mathbf{d} \cdot \mathbf{E} = -eEr \cos \theta.$$

При этом мы знаем, что

$$\Delta = -\frac{1}{2} \alpha_{ij} E^i E^j,$$

где  $\alpha_{ij}$  – тензор поляризуемости.

Замечаем, что всё также

$$\Delta_1 = \langle \psi_{100} | \hat{V} | \psi_{100} \rangle = 0.$$

Вторую поправку можем найти, как

$$\Delta_2 = \langle n^{(0)} | \hat{V} | n^{(1)} \rangle.$$

**Поиск возмущения.** Волновую функцию  $\psi^{(1)}$  можем найти, как решение уравнения, вида

$$\left( -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta - \frac{e^2}{r} \right) \psi^{(1)} = -\frac{e^2}{2a} \frac{1}{n^2} \psi^{(1)} + \frac{\varepsilon E r \cos \theta}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a}.$$

Ищем решение в виде

$$\psi^{(1)}(\mathbf{r}) = \sum_{l,m} R_l(r) Y_{l,m}(\theta, \varphi).$$

Подставляя, находим

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi_{l,m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r} (r R_l)'' Y_{l,m} + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{l(l+1)}{r^2} R_l Y_{l,m}.$$

Так как  $Y_{10} \sim \cos \theta$ , то нам подходит только  $\psi_{10}$ , а значит

$$\psi^{(1)}(r) = \frac{eE}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a} \cos \theta \cdot f(r).$$

Подставляя это в модифицированное уравнение Шрёдингера, найдём  $f(r)$ . Так приходим к диффуру

$$\frac{f''}{2} + f' \left( \frac{1}{r} - \frac{1}{a} \right) - f \frac{1}{r^2} = -r \frac{1}{ae^2}.$$

Далее будем искать  $f$  в виде полинома второй степени:  $f(r) = Ar + Br^2$ . Тогда

$$A = \frac{a}{e^2}, \quad B = \frac{1}{2e^2}, \quad \Rightarrow \quad f(r) = \frac{ra}{e^2} + \frac{r^2}{2e^2}.$$

А значит искомая функция

$$\psi^{(1)} = \frac{eE}{\sqrt{\pi a^3}} e^{-r/a} \cos \theta \cdot \frac{r}{e^2} \left( a + \frac{r}{2} \right).$$

**Сдвиг по энергии.** Интегрируя  $\psi^{(1)}$ , находим

$$\Delta_2 = \int_0^\infty r^2 dr \int_{-1}^1 d \cos \theta \int_0^{2\pi} d\varphi \frac{1}{\pi a^3} e^{-2r/a} \cos \theta \times (-eEr \cos \theta) \frac{ra}{e^2} \left( 1 + \frac{r}{2a} \right) = -\frac{9}{4} E^2 a^3.$$

Сопоставляя с поляризуемостью, находим

$$\alpha = \frac{9}{2} a^3.$$

## T6

Теперь

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} - \frac{e^2}{r} + \hat{V},$$

где  $\hat{V} = -eE\hat{z}$ . Известно, что  $n = 2$ , тогда вырождение  $n^2 = 4$ . Можем явно выписать несколько функций

$$\begin{aligned} |200\rangle &= \frac{2}{\sqrt{4\pi}} \left(\frac{z}{2a}\right)^{3/2} e^{-r/2a} \left(1 - \frac{r}{2a}\right), \\ |210\rangle &= \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos\theta \left(\frac{1}{2a}\right)^{3/2} e^{-r/2a} \frac{r}{\sqrt{3}a}, \end{aligned}$$

а для  $|211\rangle$  и  $|21-1\rangle$  важно только что есть фактор  $e^{im\varphi}$ .

Действительно,

$$\langle 21m|\hat{V}|21m'\rangle = 0, \quad m, m' = \pm 1.$$

Осталось посчитать

$$\kappa \stackrel{\text{def}}{=} \langle 200|\hat{V}|210\rangle = \int_{\mathbb{R}^3} \dots d^3\mathbf{r} = 3eE\frac{a}{z}.$$

Получилось матрица ненулевыми коэффициентами только в первом блоке 2 на 2:

$$\hat{V} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa \\ \kappa & 0 \end{pmatrix}, \quad \lambda_1 = \kappa, \quad \lambda_2 = -\kappa, \quad \lambda_3 = \lambda_4 = 0.$$

Решая секулярное уравнение, находим

$$E_2 = -\frac{\text{Ry}}{2^2}, \quad \left[ \hat{H} + \hat{V} - (E_2 \pm \kappa)\mathbb{1} \right] |\psi\rangle = 0, \quad \Rightarrow \quad \mathbf{c}_+ = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1, 0, 0), \quad \mathbf{c}_- = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1, 0, 0).$$

Энергии расщепления

$$E^+ = E_2^{(0)} + \kappa, \quad E^- = E_2^{(0)} - \kappa.$$

## T9+T10

И снова задача на решение нестационарного уравнения Шрёдингера. Пусть в невозмущенном варианте всё  $\parallel z$ , возмущением будет  $\sigma_+$  поляризованная волна, падающая по  $Oz$ .

Гамильтониан системы:

$$\hat{H} = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{H}, \quad \boldsymbol{\mu} = \frac{e\hbar}{2mc} \mathbf{s}g,$$

где  $g = 2$ . Магнитное поле

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_0 + \mathbf{e}_x h \cos(\omega t) + \mathbf{e}_y h \sin \omega t.$$

Тогда  $\hat{H}$  перепишется в виде

$$\hat{H} = \frac{|e|H_0}{2mc} \hbar \sigma_z + \frac{|e|h}{2mc} \hbar (\sigma_x \cos(\omega t) + \sigma_y \sin(\omega t)).$$

введем обозначения

$$\Omega_0 \stackrel{\text{def}}{=} \frac{|e|H_0}{mc}, \quad \Omega' = \frac{|e|h}{mc}.$$

Вводя  $\sigma_{\pm}$  переходим к

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\Omega_0\sigma_z + \frac{1}{2}\hbar\Omega'(\sigma_+e^{-i\omega t} + \sigma_-e^{i\omega t}).$$

Далее будем решать нестационаное уравнение Шрёдингера

$$i\hbar\partial_t\chi = \hat{H}\xi, \quad \chi(t) = \exp\left(-\frac{i}{2}\tilde{\Omega}t\sigma_z\tilde{\chi}(t)\right).$$

Подставляем и находим

$$i\hbar\partial_t\chi = \exp\left(-\frac{i}{2}t\tilde{\Omega}\sigma_z\right)\left(\frac{1}{2}\hbar\tilde{\Omega}\sigma_z + i\hbar\partial_t\right)\tilde{\chi},$$

которое в свою очередь равно

$$i\hbar\partial_t\chi = \hat{H} \exp\left(-\frac{i}{2}t\tilde{\Omega}\sigma_z\right)\tilde{\chi}.$$

Домножим это всё слева на  $\exp\left(\frac{i}{2}\tilde{\Omega}t\sigma_z\right)$ , так приходим к

$$\left(\frac{1}{2}\hbar\tilde{\Omega}\sigma_z + i\hbar\partial_t\right)\tilde{\xi} = \left(\frac{1}{2}\hbar\Omega_0\sigma_z + \frac{1}{2}\hbar\Omega'\left(\tilde{U}^+\sigma_+\tilde{U}e^{-i\omega t} + \tilde{U}^+\sigma_-\tilde{U}e^{i\omega t}\right)\right)\tilde{\chi}.$$

Введем обозначения

$$\sigma_{\pm} = e^{\frac{i}{2}\tilde{\Omega}t\sigma_z}\sigma_{\pm}e^{-\frac{i}{2}\tilde{\Omega}t\sigma_z}.$$

Помним коммутаторы для  $\sigma$ , получаем

$$\frac{d}{dt}\sigma_{\pm}(t) = \pm i\tilde{\Omega}\sigma_{\pm}(t),$$

где

$$\sigma_{\pm}(0) = \sigma_{\pm}, \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\pm}(t) = \sigma_{\pm}e^{\pm i\tilde{\Omega}t}.$$

Замечаем, что наша жизнь становится лучше, если  $\tilde{\Omega} = \omega$ , а значит

$$i\hbar\partial_t\tilde{\chi} = \left(\frac{1}{2}\hbar(\Omega_0 - \omega)\sigma_z + \frac{1}{2}\hbar'(\sigma_+ + \sigma_-)\right)\tilde{\chi}.$$

Новый  $\hat{H}$  можем переписать в виде

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\hbar\begin{pmatrix}\Omega_0 - \omega & \Omega' \\ \Omega' & -(\Omega_0 - \omega)\end{pmatrix} \stackrel{\text{def}}{=} \begin{pmatrix}E_1 & V \\ V & -E_1\end{pmatrix}.$$

Переходим к базису, диагонализующему  $\hat{H}$ . Находим его собственные числа:

$$E_{\pm} = \pm\sqrt{V^2 + E_1^2}.$$

Считая, что  $\Omega_0, \Omega' \gg \omega$  и  $\Omega^2 = \Omega_0^2 + \Omega'^2$ , можем получить

$$E_{\pm} \approx \pm\frac{\hbar}{2}\Omega\left(1 - \omega\frac{\Omega_0}{\Omega^2}\right).$$

Вспоминаем, что

$$\Omega_0 = \frac{|e|H_0}{mc}, \quad \Omega' = \frac{|e|\hbar}{mc}, \quad \Omega = \frac{|e|H}{mc}, \quad \Rightarrow \quad \frac{\Omega_0}{\Omega} = \frac{H_0}{H} = \cos\theta.$$

Тогда

$$E_{\pm} = \pm\frac{\hbar}{2}(\Omega + \omega\cos\theta).$$

Теперь вводим собственные вектора

$$|\uparrow(t)\rangle = e^{-\frac{i}{\hbar}E_+t}|\uparrow\rangle, \quad |\downarrow(t)\rangle = e^{\frac{i}{\hbar}E_-t}|\downarrow\rangle.$$

Собственно, сами собственные векторы

$$\begin{pmatrix}E_1 - E_{\pm} & V \\ V & -E_1 - E_{\pm}\end{pmatrix}\mathbf{v} = 0, \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = \frac{2}{\hbar}\begin{pmatrix}E_1 + E_{\pm} \\ V\end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix}\Omega_0 - \omega \pm (\Omega - \omega\cos\theta) \\ \Omega'\end{pmatrix}.$$

Тогда матрица перехода

$$S = \begin{pmatrix}\Omega_0 - \omega + \Omega - \omega\cos\theta & \Omega_0 - \omega - \Omega + \omega\cos\theta \\ \Omega' & \Omega'\end{pmatrix}.$$

Находим к ней обратную

$$S^{-1} = \frac{1}{2\Omega'(\Omega - \omega\cos\theta)}\begin{pmatrix}\Omega' & -\Omega_0 + \omega + \Omega - \omega\cos\theta \\ -\Omega' & \Omega_0 - \omega + \Omega - \omega\cos\theta\end{pmatrix}.$$

Тогда

$$\tilde{\xi}(t) = S\begin{pmatrix}e^{\frac{i}{2}E_+t} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{i}{2}E_-t}\end{pmatrix}S^{-1}|\chi(0)\rangle.$$

Перемножая, находим

$$|\tilde{\chi}(t)\rangle_1 = \cos\left(\frac{E_+t}{\hbar}\right) + i(\omega - \Omega_0)\sin\left(\frac{E_+t}{\hbar}\right), |\tilde{\chi}(t)\rangle_2 = \frac{i\Omega'\sin\left(\frac{E_+t}{\hbar}\right)}{\Omega - \omega\cos\theta},$$

а искомая величина будет

$$|\chi(t)\rangle = e^{-\frac{i}{2}\omega t\sigma_z}|\tilde{\chi}(t)\rangle.$$

**Поляризация.** Осталось найти

$$\mathbf{P} = \langle\xi(t)|\boldsymbol{\sigma}|\xi(t)\rangle,$$

которое считать и считать, а получится

$$\begin{aligned} P_x &= \sin \varphi (\cos \varphi (1 - \cos \Omega t) \cos \omega t - \sin \Omega t \sin \omega t), \\ P_y &= \sin \varphi (\cos \varphi (1 - \cos \Omega t) \sin \omega t + \sin \Omega t \cos \omega t), \\ P_z &= \cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi \cos \Omega t, \end{aligned}$$

где было введено обозначение

$$\sin \varphi = \frac{\Omega}{\Omega - \omega \cos \theta}, \quad \cos \varphi = \frac{\omega - \Omega_0}{\Omega - \omega \cos \theta}.$$

**Next.** Вообще

$$\begin{pmatrix} P_x \\ P_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \omega t & -\sin \omega t \\ \sin \omega t & \cos \omega t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{P}_x \\ \tilde{P}_y \end{pmatrix},$$

поэтому поляризация «следует» за **H**.

**Фаза Берри.** Её можно посчитать, как

$$\Delta_c \gamma = \oint A_\mu da^\mu = \oint_0^{2\pi} A_\varphi d\varphi, \quad A_\varphi = \langle \psi | \partial_\mu | \psi \rangle = i \langle \uparrow | \partial_\varphi | \uparrow \rangle.$$

где  $a$  – адиабатически меняющийся параметр гамильтониана.

Знаем, что

$$|\uparrow\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) |+\rangle + e^{i\varphi} \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) |-\rangle.$$

Тогда

$$A_\varphi = -\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2} (\cos \theta - 1),$$

тогда искомая фаза Берри

$$\Delta_c \gamma = \pi (\cos \theta - 1).$$

Связь с телесным углом можно найти, посчитав

$$\Omega = \int_0^1 d \cos \theta' \int_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi (1 - \cos \theta),$$

действительно пропорциональны.

## T11

**Матричный элемент.** Найдём матричный элемент оператора эволюции для свободной частицы

$$Z[0] = \langle q_N | U(t'', t') | q_0 \rangle = \int \mathcal{D}q \mathcal{D}p e^{\frac{i}{\hbar} S} = \lim_{N \rightarrow \infty} \int \frac{dp_N}{2\pi\hbar} \prod_{k=1}^{N-1} \frac{dq_k dp_k}{2\pi\hbar} \exp \left( \frac{i}{\hbar} \sum_{k=1}^N \left( p_k \dot{q}_k dt - \frac{p_k^2}{2m} dt \right) \right).$$

Перепишем аргумент экспоненты в виде

$$\sum_{k=1}^N p_k \dot{q}_k dt - \frac{p_k^2}{2m} dt = \sum_{k=1}^{N-1} q_k (p_k - p_{k+1}) + q_N p_N - q_0 p_1 - \sum_{k=1}^N \frac{p_k^2}{2m} dt$$

Вспомогая, что

$$\int_{\mathbb{R}} dt \delta(t) e^{i\omega t} = 1, \quad \Rightarrow \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{d\omega}{2\pi} e^{-i\omega t} = \delta(t),$$

можем проинтегрировать по всем координатам и получить

$$\int \exp \left( \frac{i}{\hbar} q_k (p_k - p_{k+1}) \right) = 2\pi\hbar \delta(p_k - p_{k+1}), \quad k = 1, \dots, N-1.$$

Теперь интегрирование по импульсу тривиально:

$$Z[0] = \lim_{N \rightarrow \infty} \int \frac{dp_N}{2\pi\hbar} \exp \left( \frac{i}{\hbar} p_N (q_N - q_0) - \frac{p_N^2}{2m} \underbrace{N dt}_{t'' - t'} \right) = \sqrt{\frac{-im}{2\pi\hbar(t'' - t')}} \exp \left( \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{(q'' - q')^2}{t'' - t'} \right),$$

где мы воспользовались

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-ax^2 + bx} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{b^2/4a}, \quad \int_{\mathbb{R}} e^{\pm ix^2} dx = e^{\pm i\pi/4} \sqrt{\pi}.$$

**Уравнение Шрёдингера.** Убедимся, что  $Z[0] = \langle q|U(t, t')|q' \rangle$  удовлетворяет уравнению Шрёдингера

$$i\hbar\partial_t Z = -\frac{\hbar^2}{2m}\partial_q^2 Z.$$

Введем для удобства

$$\sqrt{\frac{-im}{2\pi\hbar(t''-t')}} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{(q''-q')^2}{t''-t'}\right) \stackrel{\text{def}}{=} \alpha e^\beta.$$

Тогда

$$\partial_t Z = \alpha \left( -\frac{1}{2} \frac{1}{t-t'} - \frac{im}{2\hbar} \frac{(q-q')^2}{(t-t')^2} \right) e^\beta, \quad \partial_q Z = \alpha \frac{im}{\hbar} \frac{q-q'}{t-t'} e^\beta, \quad \partial_q^2 Z = \frac{i\alpha m}{\hbar(t-t')} \left( 1 + \frac{im}{\hbar} \frac{(q-q')^2}{t-t'} \right) e^\beta,$$

что и требовалось доказать.

## T12

Как обычно

$$Z[j] = \mathcal{N} \int \mathcal{D}q \exp\left(\frac{i}{\hbar} S + \frac{i}{\hbar} \int_{t'}^{t''} j(t)q(t) dt\right).$$

Запишем в виде

$$q(t) = \tilde{q}(t) + G^{(1)}(t), \quad \hat{\Gamma} G^{(1)}(t) = 0, \quad G^{(1)}(t') = q', \quad G^{(1)}(t'') = q''.$$

Тогда верно, что

$$\int q \hat{\Gamma} q dt = \int \tilde{q} \hat{\Gamma} \tilde{q} dt, \quad \Rightarrow \quad Z = \mathcal{N} e^{\frac{i}{\hbar} \int_{t'}^{t''} j(t) G^{(1)}(t) dt} \int \mathcal{D}\tilde{q} \exp\left(\frac{i}{2\hbar} \int \tilde{q} \hat{\Gamma} \tilde{q} dt + \frac{i}{\hbar} \int j \tilde{q} dt\right).$$

Можем записать, что

$$\tilde{q}(t) = \bar{q}(t) - \hat{\Gamma}^{-1} j(t), \quad \hat{\Gamma}^{-1} j(t_1) = - \int G^{(2)}(t_1 - t_2) j(t_2) dt_2.$$

Подставляя  $\bar{q}$ , находим

$$\frac{1}{2} \int \tilde{q} \hat{\Gamma} \tilde{q} dt + \int j \tilde{q} dt = \frac{1}{2} \int \left( \bar{q} \hat{\Gamma} \bar{q} + \hat{\Gamma}^{-1} j \hat{\Gamma} \hat{\Gamma}^{-1} j - 2j \hat{\Gamma}^{-1} j \right),$$

а значит

$$Z = \mathcal{N} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{t'}^{t''} j G^{(1)} dt + \frac{1}{\hbar} \int G^{(2)}(t_1 - t_2) j(t_1) j(t_2) dt_1 dt_2\right) \int \mathcal{D}\bar{q} e^{\frac{i}{2\hbar} \int \bar{q} \hat{\Gamma} \bar{q} dt},$$

где  $\int \bar{q} \hat{\Gamma} \bar{q} dt = e^{\frac{i}{\hbar} G_0}$ , а значит

$$Z = \mathcal{N} e^{\frac{i}{\hbar} G[j]}, \quad G[j] = G_0 + \int G^{(1)} j(t) dt + \frac{1}{2!} \int G^{(2)}(t_1 - t_2) j(t_1) j(t_2) dt_1 dt_2.$$