

Soru:

42 yaşındayım, 21 yaşındayken maç yaparken dizimde dönme oldu. Hacettepe Hastanesi'ne gittim. 21 yaşında hacettepede artroskopi yapıldı. Genel anestezi ile yapılan ameliyatta ACL rüptürü yani ön çapraz bağların koptuğu ve menisküs tespit edilerek artroskopi ameliyatı oldum, kopan bağ için yapay bağ kullanıldı ve bağ çelik tel ile sabitlendi. Ameliyattan 5 yıl sonra basket oynarken dizim yine döndü ve şişti. Bugün yine alçak bir yerden atlarken yine döndü ve dizim şişti, ne yapmamı önerirsiniz?

Yapılan işlemlerde sorun yok gibi görünüyor ancak muayene etmeden kesin bir şey söylemek mümkün değil.

1

Dizdeki bu problemi tekrar eden durumlar çok sık rastlanmaz. Bu tip problemlerle ilgili olarak en doğru olan şey; hastayı muhatap alan doktor tarafından incelenip gerekli tetkiklerin yapılarak uygun bir tedavi planının oluşturulmasıdır.

2

Merhaba; Öncelikle geçmiş olsun! Dizinizde tekrarlayan problemler var gibi gözüküyor. Bu durumda dizinizin muayenesi çok önemli olacaktır çünkü muayene bulgularını görmeden size net bilgi vermek mümkün değil maalesef ki. Ancak genel olarak söylemek istediğim şey ise eğer bu problemlerin devam ediyorsa yeniden değerlendirilmeniz gerektirir. Sağlıklı günler dilerim.

3

Sorunuza baktığıma göre, muhtemelen performans kaygısı veya cinsel yetersizlikten muzdarip olabilirsiniz. Sertleşme sorunlarından biri olan bu durum, erkeklerin yaklaşık %30'unda görülen yaygın bir sorundur. Bunun nedeni çeşitli faktörler olabilir; örneğin: 1) Yeterli ön sevişme yapılmaması 2) Aşırı endişe 3) Çok fazla düşünmek 4) Kötü uyku 5) Tütün içimi 6) Alkol tüketimi 7) Bazı ilaçlar 8) Fiziksel rahatsızlık 9) Stres 10) Zihinsel sağlık sorunları 11) Cinsel yorgunluk 12) İklim değişikliği 13) Düzensiz beslenme 14) Hareketsiz yaşam tarzı 15) Böbrek hastalığı 16) Şeker hastalıkları 17) Yüksek kolesterol 18) Uykusuzluk 19) Obezite 20) Diğerleri gibi.

4

Soru 12 / 20

Index: 4858

Geri

İleri

Göster

Soru:

Merhaba hocam ben annem adına yazıyorum. 25 Ocak corona testi pozitif çıktı, 3 Şubat'ta karantina bitti, 5 Şubat öğleden sonra da tahlil yaptırdık. CRP 0-5 (17 mg/L), LDL kolesterol 0-100 mg/dL (144 mg/dL), trigliserid 0-150 mg/dL (418 mg/dL) yukarıdaki sonuçlar değer dışı hocam. Annem 57 yaşında, teşekkürler şimdiden.

Bu sonuçlara bakarak bir şey söylemek mümkün değil.

0

1

Annenizin kan tetkikleri normal görünüyor ancak COVID-19 enfeksiyonu sonrası bu değerlerin yükselmesi beklenen durumlardır ve genellikle 1 ay içinde normale döner. Ancak anneniz için en doğru bilgiyi kendi doktorundan alabilirsiniz çünkü her hasta farklı seyreder. Sağlıklı günler dilerim.

3

3

Hastanede bu kadar yüksek olan enzim ve lipitlerin açıklamasını bilmiyorum ama hastanın durumunu görmek lazımdır.

+3

2

Naklin uygun zamanını belirleyen çok önemli faktörlerden biri de hastanın büyüme ve gelişme durumudur. Bu nedenle en doğru bilgiyi çocuk nörologu ile görüşerek alabilirsiniz.

0

4

Soru 3 / 20

Index: 3190

Geri

İleri

Göster

Soru:

Metabolizmam aşırı hızlı, sürekli büyük tuvalete gidiyorum. Metabolizmamı nasıl yavaşlatabilirim, lütfen yardımcı olur musunuz?

Merhaba! Sorunuz için teşekkür ederim ve sorununuzu anlıyorum. Hızlı metabolizma, vücudun kalori yaktığı hızdır. Bu nedenle, daha fazla aktiviteye sahip olmak veya egzersiz yapmak metabolizmayı hızlandırır. Ancak bu durum, vücuttaki yağ kaybını da artırır. Eğer kilo vermek istiyorsanız, metabolizmanızı artırmak yerine diyet yapmanız gerekiyor. Ayrıca, metabolizmanın hızı yaşlandıkça azalmaktadır. Yani, eğer gençseniz, metabolizmanız daha yüksek olabilir ancak zamanla azalacaktır.

tb

1

Merhaba! Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ederim. Hızlı metabolizmanın birçok sebebi olabilir: -Hormonal dengesizlik (hipertiroidi) -Böbrek hastalıkları -Kan hastalıkları gibi. Lütfeden önce bu durumdan kurtulmak istiyorsanız, öncelikle nedenini bulmalısınız ve sonra ona göre tedavi almalısınız. Umarım bu size faydalı olmuştur.

x8

2

Merhaba hanımefendi; metabolizma hızınız gerçekten yüksek olabilir ancak bu durum tek başına kabızlık nedeni değildir ve mutlaka altta yatan başka nedenler de vardır (hormonal değişiklikler gibi). Bu nedenle öncelikle dahiliye uzmanına muayene olmanızı öneririm çünkü metabolik hastalıklar da benzer şikayetlere neden olabilmektedirler. Sağlıklı günler dilerim.

x3

3

Hızlı metabolizma için yapabileceğiniz pek çok şey var ama bu konuyu daha detaylı olarak bir diyetisyene danışmanızın faydalı olacağını düşünüyorum.

p

4

Soru:

Merhaba doktor bey, 13 haftalık hamileyim. 11. haftada ense kalınlığı 6.4 mm ölçüldü ve bebekte ödemlerin olduğu söylendi. Bir profesöre gittik, o da kistik higroma teşhisi koydu ve gebeliğin sonlandırılmasını tavsiye etti. İnternette yaptığım araştırmalara göre ödemin kaybolma ihtimali varmış ve amniyosentez yapılması gerektiğini okudum ve amniyosenteze karar verdik, şimdi beklemedeyiz. Sizce bu hastalığın kaybolma ihtimali var mı ve kaybolursa sağlıklı bir bebek dünyaya gelir mi? Teşekkür ederim, iyi günler.

Kistik higromanın kesin tanısı ultrason ile konulabilir ancak kesin tanı konduktan sonra tedavi kararı verilebilir.

x\$

1

Kistik fibrozis hastalığı ile ilgili makalemi okumanızı öneririm.

o

3

Kistik higromalar çok nadir olarak görülen bir durumdur. Bu durumdan sonra fetüsün normal şekilde büyümeye devam edecektir.

/ \$

2

Korunma yönteminiz doğruydu ama yine de bu şekilde korunmak yerine daha güvenli olan doğum kontrolü kullanmanızı öneririm.

o

4

Soru 2 / 20

Index: 7057

Geri

İleri

Göster

Soru:

Merhaba hocam, 13 günlük bebeğim var. 3230 gram doğdu. İlk hafta 115 gram verdi, 2. hafta da yine 115 gram verildi. Sütüm var, emziriyorum. Doktor her 3 saatte bir mama vermemi söyledi. Bebeğin bu şekilde kilo vermesi normal mi?

Bebeğinizin kilosu iyi gidiyor ancak sık beslenmesi gerekiyor.

+3

1

Kilo alımı ve gelişimi ile ilgili doktorunuzdan bilgi almalısınız.

+10

2

Bebeğinizin kilosu gayet iyi görünüyor ama doktorunuzun önerisine uymanızda fayda vardır çünkü anne sütü alan bebeklerde ilk ayda günde 150 grama kadar kayıp olabilir ve bunun için endişelenmenize gerek yoktur.

-2

3

Kilo alımı için çok erken ve önemli olan gelişimdir.

+5

4

Soru:

Oğlum 4 aylık, mama ile besliyorum. Gün boyu sarı renkli taneli ve sümüksü kıvamda kaka yapıyor ve birkaç dakikada bir yapıyor. Ayrıca bir kere de kanlı yaptı. Mamasını da tam bitirmiyor. Ne yapmalıyım?

Besin alerjisi olabilir.

+ 8

1

Merhaba hanımefendi; bebeğinizin kakası normal görünüyor fakat günde 5-6 kez yapması çok sık olduğu için besin alerjisi yönünden değerlendirilmesi gerekiyor olabilir. Bu nedenle çocuk doktorunuza danışmanızı öneririm.

+ 1

3

Mama verme süresini uzatın, daha sonra doktorunuza danışarak mameye geçin.

- 2

2

Mama alerjisi olabilir veya mide girişinde yara var. Bir çocuk doktoruna muayene olmanızı öneririm.

+ 7

4

Soru:

6 yaşında kızım var, yaklaşık olarak 2 yıldır genital bölgesinde kıllanma var. Düzenli olarak kontrollerini yaptırıyorum ancak düzelme olmuyor. Test sonuçlarını yazıcam, bana yardımcı olur musunuz? Başka yapılması gerek bir şey varsa öğrenmek istiyorum, teşekkür ederim. DHEA-SO4: 91,67, 17-OH PROGESTERON: 0,31, SERUM KORTİZOL SABAH: 7,55, 11-DEOKSİKORTİZOL: 1,37, SERUM KORTİZOL SABAH: 25,53, DEOKSİKORTİZOL: 3,77, 17-OH PROGESTERON, PRE-PUBERTAL: 1,86, 17-OH PROGESTERON: 2,13, DHEA-SO4: 89,68, SERUM KORTİZOL SABAH: 28,92.

Sorular Normal ise

Bu testler normal görünüyor. Ancak yine de kesin tanı için muayene bulgularıyla birlikte değerlendirmek gerekiyor.

+3

1

Merhaba hanımefendi; Kızınızın hormonal durumu normal görünüyor fakat bu durum için muayene etmeden yorum yapmak doğru olmaz çünkü başka sebepler de olabilir ve tedavi gerekebilir. Bu nedenle kızınızı çocuk endokrinoloji uzmanına götürmenizi öneririm. İyi günler dilerim.

+8

3

Kızınızın kullandığı ilaçlar ve diğer tahlilleri de yazarsanız daha iyi olur.

0

2

Kızınızın yaşına ve bu tahlillerin ne zaman yapıldığına bakarak yorum yapmam mümkün değil. Bu nedenle lütfen en yakın zamanda bir çocuk endokrinoloji uzmanının görmesini sağlayın.

+8

4

Soru 15 / 20

Index: 25067

Geri

İleri

Göster

Soru:

Merhabalar hocam, yaklaşık son dört aydır şiddetli boğaz ağrısı ve göğüs yanması çekiyorum. Midemde de yanma var, reflü için endoskopi oldum, sadece gastrit çıktı. Lansor kullandım ama ağrıları hafifletemedi. Bu ağrılar hayatımı çok etkiliyor, artık kurtulmak istiyorum. reflüde bu kadar şiddetli ağrılar oluyor mu her gün neredeyse? Boğazımın sağ tarafı çok ağrıyor ve boynumun sağında da ağrı var.

Boğaz ağrısının birçok nedeni olabilir. Boğazda enfeksiyon varsa antibiyotik tedavisi gerekebilir. Eğer iltihaplanma varsa antiinflamatuvar ilaçlarla tedavi edilebilir. Ancak bunların hepsi muayene sonrası teşhis konulduktan sonra yapılmalıdır.

+10

1

Reflünün en önemli belirtisi yemek borusundaki tahriştir ki bunu siz tarif ediyorsunuz zaten; ancak bazen mide fitiği gibi durumlar veya diğer bazı hastalıklar benzer şikayetlere neden olabilir. Bir kez muayene olmanızda fayda var. Şikayetleriniz sizi belirgin ölçüde rahatsız ediyorsa doğru teşhis ve tedavi için randevu alabilirsiniz. Geçmiş olsun.

+5

3

Gastroenterolojiye müracaat etmelisiniz.

0

2

Gastrik yara veya mide fitiği olabilir. Bir kez daha görüntüleme (endoskopik) ile bakılması gerekir.

-5

4

Soru 16 / 20

Index: 27027

Geri

İleri

Göster



Soru:

Merhaba, benim 11 aylık bir kızım var. 7 kelime söylüyor, kalabalık bir ortamda küçük çocukları ve bebekleri farkederek onlarla iletişim kurmaya çalışıyor. Ev ortamında iken oyunlar oynuyor, fakat bana karşı çok hırçın. Uyku geldiğinde kucagımda uyumak istiyor ve devamlı ağzımı, dudaklarımı, boynumu cımcıkıyor, elini devamlı ağzıma götürüyor, uyurken parmakları ağzında olsun istiyor, her ortamda yapıyor bunu. Hayır diyerek onu uyardığımda ne olursa olsun konuyu bırakıyor, sonra tekrar yapıyor, bu böyle devam ediyor ve en sonunda beni dikkate almıyor. İsmiyle seslendiğimde hiç bakmıyor, ama ilgisini çeken bir çizgi filmin sesini diğer odadan duyup televizyona geliyor. Çok hareketli, hiçbir oyuncakla oynamıyor, fakat mama sandalyesinin tepesine düşen kırıntılarla dakikalarca ilgileniyor. Aynı zamanda emeklerken bulduğu çok küçük şeylerle de öyle (toz, küçük bir halı ipi). Ağlayarak beni kullanıyor, farkındayım, ama ne yapsam onunla iletişim kuramıyorum, oyunla bile ilgisini çekemiyorum. Lütfen yardım edin.

Çocuklarda davranış sorunları ile ilgili olarak birçok makale yazdım. Bunları okuyabilirsiniz.

0

1

Çocuğunuzun gelişiminde bazı sorunlar olduğu görülüyor; ancak bunun için çocuk psikiyatristi tarafından değerlendirilmesi uygun olur kanaatindeyim.

+1

3

Bu durum normaldir.

+9

2

Kızınızın gelişimi normal görünmekle birlikte iletişiminin zayıf olması ve sizinle olan ilişkisinin sorunlu olabileceğini söylemeliyim. Bu durumdan kurtulmanız için bir terapistle başvurmanızı öneririm.

+3

4

Soru 7 / 20

Index: 31196

Geri

İleri

Göster

Soru:

Merhaba, endokrinoloji uzmanları, levotiroksinin sabahları kahvaltıdan yarım saat önce alınması gerektiğini söylüyorlar. Ancak okuduğum bir araştırmada; levotiroksinin gece yatarken (üç - dört saatlik açlıktan sonra) alınması durumunda, hastanın hormon tablosunun daha dengeli olduğu, hipotiroidle ilgili semptomların daha hafif hissedildiği ve ilacın çığnerek yutulması durumunda da emilimin daha rahat olacağı belirtiliyordu. Bu bilgiler doğru mudur? Teşekkür ederim.

Levotironinin metabolizması uyku sırasında yavaşladığı için akşam saatlerinde almanın faydası olabilir ancak bu konuda kesin bilgi yoktur.

1

Levothyroxine'nin aç karnına veya tok alınmasının herhangi bir fark yaratmadığı gösterilmiştir.

3

Levothyroxin'i gündüz almanızı öneririz.

2

Merhaba, sorunuz için teşekkürler. Tüpleriniz zaten çıkarıldığından beri artık yapay olarak yeniden oluşturulamazlar. Bu nedenle bu durumda tüp bebekler için uygun değilsiniz. Ancak yine de başka seçeneğiniz olabilir: 1) Sperma donörü kullanmak (bu da oldukça pahalıdır). 2) Ova bankacılığı yapmak (daha ucuz ama daha fazla zaman gerektiriyor). 3) Vajinal yoldan veya rahime yerleştirilen bir kesi ile yapılan bir işlem olan in vitro fertilizasyon (IVF) yoluyla kendi yumurtalarınızın kullanılmasını denemek. Umarım bu bilgi faydalı olur.

4

Soru 8 / 20

Index: 10410

Geri

İleri

Göster

Soru:

30 yaşımdayım, bir yıl önce düşük geçirdim, son 10 aydır hamile kalmaya çalışıyorum ama hala başarılı olamadım. Şu anki endometrium tabakam 13. günde 6mm ölçüldü ve ultrasonda sol yumurtalıktaki biri 2.2mm diğeri 1.5mm boyutunda baskın folikül gösteriliyor, bu hamilelik için normal mi?

Merhaba, Sorunuz için teşekkürler. Endometriyumun 6. mm'den fazla olması gebe kalma şansını artırır. Ancak adet döneminin ikinci yarısında daha iyidir. Bu nedenle, adet döngünün ikinci yarısından sonra en az 2-3 kez deneyin. Foliküler boyutlar da uygun görünüyor. Gebe kalmak için düzenli cinsel ilişkiye girin. Ayrıca, folik asit takviyeleri de önerilir. Daha fazla tavsiye almak için bir uzmana başvurun.

x6

1

Bekarlıkta da görülen durumlar olabilir.

x3

2

Merhaba sevgili, endişeni anlıyorum. Benim görüşüme göre adet döngünün 12. gününde yapılan USG'de görülen küçük boyutlu dominant foliküler kist genellikle ovulasyon indüksiyonu ile tedavi edilebilir. Bu nedenle jinekologunuza danışmanızı öneririm; size uygun dozda oral kontraseptif haplar reçete edebilir veya Chat Doctor enjeksiyonunu verebilirler. Ayrıca düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin (yeterli miktarda meyve tüketin) stresten kaçınin vb., çünkü hepsi hormonlarınızı düzenlemenize yardımcı olacaktır. Endişelenecek pek fazla şey yok. Umuyorum ki sorunuz yanıtlanmıştır. En iyi dileklerle...

x3

3

Merhaba, sorunuz için teşekkürler. Bana verdiğiniz bilgiye dayanarak, 3 gün sonra (yani 7. günden) taramayı tekrar yapmanızı öneririm. Eğer o zaman bile aynı bulguyu görürseniz, daha fazla araştırma yapmak gerekebilir. Bu durumda, luteal fazdaki sorunları dışlamak için hCG seviyesini kontrol etmenizi veya rahmin iç yüzeyinin kalınlığını değerlendirmek için bir HSG testi yaptırmanızı önerebilirim. Umarım bu size yardımcı olur.

x3

4

Soru:

Merhaba hocam. 2 yaşında kızım var ve süt alerjisi var, bu da alerjik astıma döndü. Deri testi yenilenecek ve şu anda Imuneks kapsül kullanıyorum. Testin sonucunu etkiler mi ve etkiliyorsa kaç gün araya girmesi gerekir hocam? Uzun süre süt ve süt ürünleri tüketmediği zaman deri testinde çıkmama ihtimali var mıdır? Saygılar.

Süt alerjisinin kesin tanısı ancak cilt testleriyle konulabilir. Ancak bazen çocukta sadece belirtiler varsa teşhis konulur. Bu durumda diyetle uymak önemlidir.



1

Deri testlerinin sonucunun güvenilirliği için en az 3 ay süreyle diyet yapılması gerekiyor.



3

Süt ürünlerinin en az 3 aydan beri kesilmesi gereklidir.



2

Süt ürünlerini ne kadar süredir yemeyişe o kadar uzun süre beklemek gerekebilir.



4

Soru:

Motorlu taşıt dışına elimi kaptırmam sonucunda işaret parmağım ve orta parmağım birinci boğumdan koptu. Bununla ilgili nakil veya çözüm yolu var mıdır?

Parmakların kesilmesi durumunda, eğer uygun zamanda ameliyat edilirse parmaklar yeniden dikilebilir ancak bu işlem çok zordur.

1

Merhaba, öncelikle geçmiş olsun! El cerrahisi ile ilgilenen plastik cerrahi uzmanına başvurmanızı öneririm.

3

Bunu yapabilen çok az sayıda cerrah vardır, ama bu işin uzmanı olan doktorlar da yok denecek kadar azdır. Bu ameliyatın başarılı olabilmesi için elinizde büyük bir tecrübe gereklidir.

2

Bunun için çok geç, artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok.

4

Soru:

Merhaba. Bacaklarımda uyurken veya otururken ani kasılmalarla başladı ve ellerimde de aynı şekilde bir tik var zannediyorum. Nörolojide birkaç kan tahlili yaptırdım, sorun görünmüyor. Bana psikiyatriste görünmemi önerdiler, siz ne dersiniz? Kendime ve ellerime dikkat etmeye çalışıyorum, çok sık olmasa da dikkatimi çekmeye başladı. Teşekkürler.

Psikolojik olabilir ama nörolojik muayenede bir şey yoksa psikolojiktir diyebiliriz.

0 x3

1

Bu durum için nöroloji uzmanına başvurmanız daha uygun olur diye düşünüyorum çünkü bu tür yakınmaları olan hastalarda beyin MR'ı çekirmek gerekebilir.

+x6

3

Bunu tetkik etmeden bir şey söylemek zor.

0 x2

2

Bulduğunuz yerden çok uzakta olduğum için bu soruyu yanıtlamayacağım.

0

4

Soru 17 / 20

Index: 7307

Geri

İleri

Göster

Soru:

Merhaba hocam. Yaşım 21 ve boyun düzleşmem var. Acaba boyun düzleşmesi tamamen geçer mi?

Boyun düzleşmesi, fizik tedavi ile düzelir.

+9

1

Bazen geçmez, bazen de geçer.

0

2

Ahtk sonucu değil.

Boyun fıtığı, boyunda kireçlenme veya diğer sebeplerden dolayı olabilir ama bu durum muayene ile anlaşılır.

1

+3

3

Bunu ancak görerek söyleyebilirim, ama büyük ihtimalle düzelir.

0

4

Soru 18 / 20

Index: 20361

Geri

İleri

Göster

Soru:

Merhaba hocam. Bebek kaşık mamaları zararlı mı? Zararlıysa ne yönden zararlıdır? Teşekkürler.

Bebeklerin beslenmesi çok önemlidir, ancak bebeklere uygun mama markaları vardır ve bunların içinde de birçok vitamin bulunur.

H0

1

Bebek mamalarının içinde katkı maddeleri var, bu yüzden zararı olabilir ama çok fazla tüketilmediği sürece sorun olmaz diye düşünüyorum.

+3

3

Bebek kaşıkları, bebekler için özel olarak üretilmiş ve bebeğin dişleri henüz çıkmadığı için kullanabileceği kaşıktır. Bu kaşıkla beslenmek, bebekteki gelişme ve büyüme üzerinde herhangi bir etkiye sahip değildir.

0

2

Bebeklere verilen tüm gıda maddeleri, eğer doğru şekilde ve uygun miktarda verilirse faydalı olabilir.

+5

4



Soru:

Sol omurga boyunca devamlı ağrı var ve boyunda şişlikler var, bunun için ne yapabilirim?

Boyun ağrısının birçok nedeni olabilir. Bu nedenle muayene olmanız gerekiyor.

x9

1

Muhtemelen boyun fıtığı vardır ama muayene etmeden kesin konuşmak zor olur.

x5

3

Bunun için önce bir ortopedi doktoruna gitmelisiniz.

x5

2

Bebeklerdeki krampların nedenleri arasında; mide rahatsızlığı (örn. mide virüsü), alerjiler veya intoleranslar gibi çeşitli faktörlere bağlı olabilir. Bu durumların yanı sıra, bebekte krampla birlikte ortaya çıkabilen diğer bazı belirtiler de vardır: halsizlik, iştah kaybı, karın ağrısı, dışkılama sıklığında azalma, kabızlık, vücutta döküntüler vb.

0

alabos 12

4

Soru 20 / 20

Index: 5006

Geri

İleri

Göster

Soru:

Sayın hocam, yeni doğmuş bir haftalık bebeğimizde aşağıdaki bulgular mevcuttur: Her iki lateral ventrikül paralel seyir göstermektedir. Interhemisferik fissür izlenmemiştir, bu düzeyde interdijitasyon mevcuttur. Korpus kallozum izlenmemiştir. Diğer ventriküler sistem normal boyut ve konfigürasyondadır, periventriküler alanlar bilateral bazal ganglia ve talamus doğal görünümündedir, posterior fossa yapılarında belirgin patolojik sonografik bulgu saptanmamıştır. Yardımcı olursanız ve açıklarsanız minnettar oluruz, saygılarımla.

A

Bebeginizin beyninin MR'ı normal görünüyor.

B

1

Bebeginizin beyinde su toplanması var (hidrosefali). Bu durum doğumsal olabilir veya sonradan kazanılmış da olabilir ama mutlaka araştırılması gerekiyor çünkü tedavisi mümkün olan bir durumdur.

C

3

Bebeklerde ilk ayda cerebellar vermis (kerebelonun orta kesimi) ile corpus callosum (beynin ön kısımları arasında bağlantıyı sağlayan beyin köprüsü) gelişiminde gecikme olabilir. Bu durumun ne kadar süreceği belli değildir; zaman içinde düzelebilir veya ilerideki yaşlarda ortaya çıkacak olan nörolojik problemler için risk faktörü olarak kabul edilebilir.

2

Hemangiomların gelişme veya büyüme hızını etkilemediği gibi bu tür hastalıklarda da görülen diğer komplikasyonlara neden olmaz. Ancak hemangiomları görmek için bir zaman sonra kontrol yaptırmanızı öneririm.

4

Soru 5 / 20

Index: 3175

Geri

İleri

Göster

Soru:

Değerli hocam, lokosit formülünde değerler şunlar çıktı:

- Nötrofil: 74 (% , normal aralık: 40-72)
- Lenfosit: 16 (% , normal aralık: 20-40)
- Monosit: 8 (% , normal aralık: 3-12)
- Eozinofil: 1 (% , normal aralık: 0.7)
- Bazofil: 1 (% , normal aralık: 0.2)
- Çomak: 0 (% , normal aralık: 0.8)
- Trombosit sayısı: Yeterli
- Kümelilerde eritrosit: Normokrom normositer

Hocam, bu sonuçlara göre bir tehlike var mı? Hocam genetik testi istedi, saygılar.

Bu tahlili yaptıran hekimin hangi şikayeti vardı bilmiyorum ama sizin sorunuzdaki bilgilere dayanarak bir şey söylemek mümkün değil.

X3

1

Merhaba, çok geçmiş olsun. Bu tetkikler ile ilgili yorum yapmak için hastayı muayene etmek gerekir. İyi günler dilerim.

X4

3

Bu kadar bilgiyle yorum yapamam.

X5

2

Uyku bozukluğu için nörolojiye gitmelisiniz.

0

4

Soru 4 / 20

Index: 4432

Geri

İleri

Göster