

2) Let  $u_1 = (1, 1, 1, 1)$ ,  $u_2 = (1, -1, 2, 2)$  and  $u_3 = (1, 2, -3, -4)$

$$v_1 = u_1 = (1, 1, 1, 1)$$

$$v_2 = u_2 - \frac{\langle v_2, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 = (1, -1, 2, 2) - \frac{4}{4} (1, 1, 1, 1) = (0, -2, 1, 1)$$

$$\begin{aligned} v_3 &= u_3 - \frac{\langle v_3, v_1 \rangle}{\|v_1\|^2} v_1 - \frac{\langle v_3, v_2 \rangle}{\|v_2\|^2} v_2 \\ &= (1, 2, -3, -4) - \frac{(-4)}{4} (1, 1, 1, 1) - \frac{6}{6} (0, -2, 1, 1) \\ &= (2, 3, -2, -3) - (0, -2, 1, 1) = (2, 5, -3, -4) \end{aligned}$$

$$\frac{v_1}{\|v_1\|} = \frac{1}{2} (1, 1, 1, 1) \quad \frac{v_2}{\|v_2\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} (0, -2, 1, 1)$$

$$\frac{v_3}{\|v_3\|} = \frac{1}{3\sqrt{6}} (2, 5, -3, -4)$$

$$\left\{ \left( \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2} \right), \left( 0, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right), \left( \frac{2}{3\sqrt{6}}, \frac{5}{3\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{4}{3\sqrt{6}} \right) \right\}$$

are the orthonormal basis.

Orthogonal projection of  $v = (1, 2, -3, 4)$  over  $U$ ,

$$\text{proj}_U(v) = \left( \frac{u_1 \cdot v}{\|u_1\|^2} \right) u_1 + \left( \frac{u_2 \cdot v}{\|u_2\|^2} \right) u_2 + \left( \frac{u_3 \cdot v}{\|u_3\|^2} \right) u_3$$

$$= \frac{4}{4} (1, 1, 1, 1) + \frac{1}{10} (1, -1, 2, 2) + \frac{(-2)}{30} (1, 2, -3, 4)$$

$$= (1, 1, 1, 1) + \left( \frac{1}{10}, -\frac{1}{10}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5} \right) - \left( \frac{1}{15}, \frac{2}{15}, -\frac{1}{5}, \frac{4}{15} \right)$$

$$\text{proj}_U(v) = \begin{bmatrix} \frac{31}{30} \\ \frac{23}{30} \\ \frac{7}{5} \\ \frac{22}{15} \end{bmatrix}$$

③  $f(x) = x + k$ ,  $g(x) = x^2$

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 f(x) g(x) \cdot dx$$

$$= \int_0^1 (x+k) x^2 \cdot dx$$

$$= \int_0^1 (x^3 + kx^2) dx$$

$$= \left[ \frac{x^4}{4} + \frac{kx^3}{3} \right]_0^1$$

$$= \left[ \left( \frac{1}{4} + \frac{k}{3} \right) - (0 + 0) \right]$$

$$0 = \left( \frac{3+4k}{12} \right)$$

$$3+4k = 0$$

$$k = \frac{-3}{4}$$

$$k = -3/4$$

$$\textcircled{4} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore$  The basis of the  $C(A) = \left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$

Null space of  $A$  is orthogonal complement of column space of  $A$ .

$$\sim \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$\downarrow$$
$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore x_1 + x_2 = 0$$

$$x_3 = 0$$

$$\text{let } x_2 = t$$

$$N(A) = \begin{bmatrix} -t \\ t \\ 0 \end{bmatrix} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Basis of the orthogonal complement of column space of  $A$  is  $(-1, 1, 0)$

$$(5) \quad U = \text{Span} [(1, 1, 0, 0), (1, 0, 1, 0)]$$

$$W = \text{Span} [(0, 1, 0, 1), (0, 0, 1, 1)]$$

$$(ii) \quad U^\perp$$

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + x_3 = 0$$

$$x_2 - x_3 = 0$$

$$\boxed{x_2 = x_3}$$

$$\boxed{x_1 = -x_3} = -x_2$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -x_3 \\ x_3 \\ x_3 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

$$= x_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$



∴ The basis for  $U^\perp$  is  $\left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} \right\}$

(i)  $U+W$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

∴ Bas is of  $U+W$   $\left\{ (1, 1, 0, 0), (0, 1, -1, 0), (0, 0, 1, 1) \right\}$

$$\dim(U+W) = 3$$

(iii)  $U^\perp + W^\perp$

$$\frac{W^\perp}{W} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 + \lambda_4 = 0 \rightarrow \lambda_2 = -\lambda_4$$

$$\lambda_3 + \lambda_4 = 0 \rightarrow \lambda_3 = -\lambda_4$$

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \lambda_3 \\ \lambda_4 \end{bmatrix} = \lambda_4 \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} + \lambda_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore \text{Basis} = \{(0, -1, -1, 1), (1, 0, 0, 0)\}$

$$U^\perp + W^\perp = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \leftarrow \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \sim \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 5/3 & 1/6 \\ 0 & 0 & 2/3 & 1/6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

∴ Basis of  $V^\perp + W^\perp$

$$= \left\{ (1, -1, -1, 0), (0, 1, \frac{5}{3}, \frac{1}{6}), (0, 0, \frac{2}{3}, \frac{1}{6}), (0, 0, 0, 1) \right\}$$

⑤  $U \cap W$  :

$$\text{Let } V = \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mu \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\text{Let } \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \lambda + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \mu \mid \lambda, \mu \in \mathbb{R} \right\}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_2 \\ \mu_2 \end{bmatrix}$$

$$\lambda_1 + \mu_1 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2$$

$$\mu_1 = \mu_2$$

$$\lambda_2 + \mu_2 = 0$$

$$\boxed{\lambda_2 = -\mu_2}$$



$$= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (1-m) + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} m \mid m \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} m \mid m \in \mathbb{R} \right\}$$

The basis for  $U \cap W = (0, -1, 1, 0)$

$$\dim(U \cap W) = \dim(U) + \dim(W) - \dim(U \cup W)$$

$$= 2 + 2 - 3$$

$$= 1$$

$$\textcircled{1} \textcircled{i} \langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_3 v_3$$

Given:

$$u = (u_1, u_2, u_3) \quad v = (v_1, v_2, v_3)$$

axiom 1:  $\rightarrow$

$$\langle u, v \rangle = u_1 v_1 + u_3 v_3 = \langle v, u \rangle$$

axiom 2:

$$\begin{aligned} \langle u+v, w \rangle &= (u_1+v_1)w_1 + (u_3+v_3)w_3 \\ &= \cancel{u_1}w_1 + v_1w_1 + u_3w_3 + \cancel{v_3}w_3 \\ &= u_1w_1 + u_3w_3 + v_1w_1 + v_3w_3 \\ &= \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle \end{aligned}$$

axiom 3:

$$\begin{aligned} \langle ku, v \rangle &= k \langle u, v \rangle \\ \langle ku, v \rangle &= ku_1 v_1 + ku_3 v_3 \\ &= \cancel{k} k(u_1 v_1 + u_3 v_3) \\ &= k \langle u, v \rangle \end{aligned}$$

axiom 4:

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &\geq 0 \quad \& \langle u, u \rangle = 0 \\ &\Leftrightarrow u = 0 \end{aligned}$$

$$\langle u, u \rangle = u_1^2 + u_3^2 \geq 0$$

$$\langle u, u \rangle = u_1^2 + u_3^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow u_1 = u_3 = 0$$

$$\textcircled{ii} \langle u, v \rangle = u_1 v_1 - u_2 v_2 + u_3 v_3$$

axiom 1:

$$\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$$

axiom 2:

$$\begin{aligned} \langle u+v, w \rangle &= (u_1 + v_1)w_1 - (u_2 + v_2)w_2 + (u_3 + v_3)w_3 \\ &= u_1 w_1 + v_1 w_1 - u_2 w_2 - v_2 w_2 + u_3 w_3 + v_3 w_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (u_1 w_1 - u_2 w_2 + u_3 w_3) \\ &\quad + (v_1 w_1 - v_2 w_2 + v_3 w_3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \cancel{\langle u, w \rangle} + \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle \\ &= \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle \end{aligned}$$

axiom 3:

$$\begin{aligned} \langle ku, v \rangle &= k u_1 v_1 - k u_2 v_2 + k u_3 v_3 \\ &= k (u_1 v_1 - u_2 v_2 + u_3 v_3) \\ &= k \langle u, v \rangle \end{aligned}$$