
HARDSET POWERBUILDING

Continuous Bench Priority

Wersja 1.2 · trzy treningi w tygodniu · fala czterotygodniowa



88–90
%
90–91%
91–93%
85–88%

ADRIAN DROŻDŻYŃSKI

HARDSET Powerbuilding. Continuous Bench Priority

Wersja 1.2 (szkic próbki) · Adrian Drożdżyński · 2026

To program specjalistyczny oparty na metodzie HARDSET v1.0, opisanej w książce *HARDSET. Controlled Brutality*. Nie zastępuje jej i niczego w niej nie zmienia. Odstępstwa od zasad metody są nazwane w tekście.

Wyciskanie leżąc w stylu zawodniczym wykonuje się w racku z ustawionymi zabezpieczeniami albo z asekuracją. Przed startem w zawodach sprawdź aktualny regulamin swojej federacji: komendy, pauzę i wymogi techniczne.

Dla kogo. Program jest ułożony dla osoby, która trenuje trzy razy w tygodniu po najwyżej 60 minut i stawia wyciskanie leżąc na pierwszym miejscu. Przy tym limicie tylne aktony barków i pośladki mają status Optional, czyli bez wymaganego minimum. To skutek limitu czasu, a nie ocena ich ważności. Serie wyciskania zawodniczego liczysz osobno, poza Hard Sets klatki. Wszystkie pozostałe ćwiczenia działają według zwykłych zasad HARDSET.

Limit 60 minut na trening to założenie programu, które nie zostało jeszcze sprawdzone na prawdziwej siłowni. Zmierz dwie lub trzy pierwsze sesje.

© 2026 Adrian Drożdżyński. Wszelkie prawa zastrzeżone. Książka jest udostępniana bezpłatnie do użytku osobistego. Zmienianie, rozpowszechnianie zmienionych wersji i użycie komercyjne wymagają zgody autora.

Źródła sprawdzono 13 listopada 2026 roku.

Spis treści

01 Cel i granice programu

02 Sześć wzorców ruchu i ćwiczenia izolowane

03 Fala czterotygodniowa

04 AMRAP, e1RM i baza fali

05 Gotowy tydzień: 3 × 60 minut

06 Opcjonalnie: test 1RM i przygotowanie do zawodów

07 Ograniczenia, bezpieczeństwo i kiedy program nie działa

– Bibliografia

Skąd pochodzą zasady tego programu

Program łączy dwa cele: wzrost maksymalnego wyniku w wyciskaniu leżąc i ciągły bodziec do rozbudowy górnej części ciała. Te cele mają różne reguły, więc każda decyzja w tej książce należy do jednej z trzech grup.

GRUPA	CO DO NIEJ NALEŻY
ZASADA HARDSET	Ćwiczenia uzupełniające: domyślnie dwie serie, pierwsza około 1 RIR, druga 0–1 RIR przy bezpiecznym stopie, progresja serii prowadzącej. Dwanaście obszarów jako narzędzie kontroli planu. Zakaz 0 RIR bez bezpiecznego stopu.
WYJĄTEK SIŁOWY	Wyciskanie zawodnicze przy RPE 6–8, czyli z zapasem 2–4 powtórzeń. Pojedyncze powtórzenie (singiel) w poniedziałek. Trzy ekspozycje wyciskania w tygodniu. Fala procentowa zamiast progresji serii prowadzącej. Lżejszy tydzień wyciskania co cztery tygodnie, z kalendarza, a nie z potrzeby.
HIPOTEZA PROGRAMU	Długość fali, konkretne zakresy procentowe, seria AMRAP przy 82,5% bazy jako punkt kontrolny, krok bazy o 2,5 kg, 35 serii w trzech treningach po 60 minut. To ustawienia do sprawdzenia w praktyce, a nie wyniki badań.

Wyjątki mają jedno uzasadnienie. Rozdział 08 metody HARDSET dopuszcza periodyzację, gdy celem jest siła maksymalna w konkretnym boju. Program korzysta z niej tylko w wyciskaniu, reszta treningu działa według zwykłych zasad.

BADANIE Programy z większymi obciążeniami, powyżej 80% ciężaru maksymalnego, dawały największe przyrosty siły, a przyrost masy był porównywalny w szerokim zakresie obciążeń [Currier 2023; R17]. To uzasadnia ciężkie wyciskanie, ale nie konkretną falę z tej książki.

03

Fala czterotygodniowa

Procent wyznacza punkt startowy. RPE wyznacza granicę.

Wyciskanie prowadzi powtarzalna fala czterotygodniowa. W pierwszym tygodniu jest więcej powtórzeń, w drugim rośnie ciężar, w trzecim wypada najcięższa ekspozycja i seria kontrolna, a czwarty jest lżejszy. Potem fala zaczyna się od nowa, z zaktualizowaną bazą fali.

Procenty liczysz od bazy fali. To ostrożna liczba do planowania, a nie rekord życiowy i nie ostatni wynik z kalkulatora. Wynik mnożysz przez procent i zaokrąglasz do 2,5 kg. Gdy nie masz pewności, wybierasz niższą wartość z przedziału.

> **Nazwa.** W trójboju skrót „PB” oznacza rekord życiowy (*personal best*), więc tu mówimy: baza fali (angielskie *Wave Base*, WB).

PONIEDZIAŁEK · PRZYKŁAD DLA BAZY 120 KG

TYDZ.	SINGIEL	% BAZY	KG	BACK-OFF	% BAZY	KG
T1	1×1 @7	88–90	105–107,5	2×5 @7	75–78	90–92,5
T2	1×1 @7,5	90–91	107,5–110	2×4 @7–8	78–81	92,5–97,5
T3	1×1 @8	91–93	110–112,5	2×3 @7–8	82–85	97,5–102,5
T4	1×1 @6–7	85–88	102,5–105	2×4 @6–7	73–77	87,5–92,5

@7 oznacza RPE 7, czyli około 3 powtórzeń w zapasie; @8 to około 2, @9 około 1.

ŚRODA, WYCISKANIE Z 2-SEKUNDOWĄ PAUZĄ · BAZA 120 KG

TYDZ.	SERIE	RPE	% BAZY	KG
T1	2×5	6–7	70–74	85–90
T2	2×4	6,5–7,5	73–77	87,5–92,5
T3	2×3	7–7,5	77–80	92,5–95
T4	2×4	6	68–73	82,5–87,5

PIĄTEK, OBJĘTOŚĆ ALBO SERIA KONTROLNA · BAZA 120 KG

TYDZ.	SERIE	RPE	% BAZY	KG
T1	2×6	7	73–76	87,5–90
T2	2×5	7–8	76–80	90–95
T3	1×AMRAP	9	82,5	100
	potem 1×4	6–7	72,5–75	87,5–90
T4	2×5	6–7	70–75	85–90

Gdy procent i RPE się nie zgadzają

Tabela i RPE nie zawsze mówią to samo. U jednej osoby 2×5 przy 78% wypadnie lżej niż @7, u innej wyraźnie ciężej. BADANIE Liczba powtórzeń możliwych przy tym samym procencie ciężaru maksymalnego różni się między ludźmi, a w wyciskaniu leżąc przeciętnie jest niższa niż na przykład na suwnicy [Nuzzo 2024].

Dlatego decyduje rzeczywista trudność i jakość techniki. Jeśli RPE przekracza cel o mniej więcej jeden stopień albo więcej, zdejmujesz 2,5–5% i zapisujesz to jako korektę, a nie porażkę.

Gdy seria jest za lekka

HIPOTEZA PROGRAMU Baza fali jest ostrożna, więc serie wielopowtórzeniowe wypadają zwykle lżej niż docelowe RPE. Przeliczenie wzorem Epleya pokazuje, że nawet przy bazie równej prawdziwemu 1RM bywają za lekkie o pół punktu do około 2 punktów RPE. Singiel jest skalibrowany dobrze.

Po pierwszej serii wielopowtórzeniowej porównaj RPE z dolną granicą celu. Różnica mniejsza niż pełny punkt: nic nie zmieniasz. Różnica jednego punktu: następna seria o około 2,5% cięższa. Dwóch punktów i więcej: o około 5%, to jest limit. Zaokrąglasz do kroku talerzy, zwykle 2,5 kg, więc przy 100 kg wychodzi 102,5 albo 105 kg.

Warunki: technika w normie i prędkość sztangi nie spada w trakcie serii. Reguła nie dotyczy singla ani serii kontrolnej, a w tygodniu 4 jej nie stosujesz, bo lżejszy tydzień jest zaplanowany. Korekta nie zmienia bazy fali. Jeśli ta sama korekta wychodzi w dwóch kolejnych treningach tego samego typu, następny zaczynasz od ciężaru po korekcie.

> **Skąd 2,5%.** Wzór Epleya daje 2,6–2,9% ciężaru na jeden punkt RPE dla 3–6 powtórzeń przy RPE 6–8. Wzięto dolną granicę, bo błąd szacowania RIR (około 0,65 powtórzenia, `[Refalo 2024]`) jest tego samego rzędu co jeden punkt. Limit 5% to decyzja ostrożnościowa, nie wynik badania.

Seria kontrolna w tygodniu 3

W piątek trzeciego tygodnia pierwsza seria robocza to AMRAP przy około 82,5% bazy: tyle poprawnych powtórzeń, ile się da, ale z jednym powtórzeniem w zapasie (@9). Seria zastępuje cięższą serię objętościową. Nie jest dodatkowym testem ciężaru maksymalnego.

Technika	Ten sam chwyt i ustawienie co w zawodach, pauza na każdym powtórzeniu, bez odbicia.
Przygotowanie	Ta sama rozgrzewka co zwykle, 4–5 minut odpoczynku przed serią, żadnego ciężkiego singla tego dnia.

Koniec serii	Przy jednym poprawnym powtórzeniu w zapasie albo wcześniej, gdy siada technika lub kontrola. Bez celowej nieudanej próby.
Po serii	Jedna łatwa seria 1×4 i koniec wyciskania. Dobry wynik nie jest powodem do dokładania objętości.

Ciężar dobierasz tak, żeby wyszło mniej więcej 4–7 powtórzeń. Jeśli wychodzi więcej albo mniej, zmieniasz ciężar serii kontrolnej w następnej fali.

Szacowany ciężar maksymalny

```
e1RM = ciężar × (1 + (powtórzenia + RIR) / 30)
```

HEURYSTYKA To wzór Epleya z doliczonym zapasem powtórzeń. Służy do sterowania treningiem, a nie do ogłaszania rekordu. Inne wzory dają inne wyniki.

100 KG PRZY @9 (1 RIR)

POWTÓRZENIA	E1RM, KG
4	116,7
5	120,0
6	123,3
7	126,7

Jedno powtórzenie więcej to tutaj około 3,3 kg szacunku. To dużo, jeśli pamiętać, że sam RIR też jest szacunkiem.

BADANIE W badaniu 24 osób trenujących, wyciskających przy 75% ciężaru maksymalnego, przewidywania 1 i 3 powtórzeń w zapasie myliły się średnio o około 0,65 powtórzenia, z lekką skłonnością do

zaniżania [Refalo 2024]. To dobra trafność, ale tego samego rzędu co różnica jednego powtórzenia w serii kontrolnej. Dlatego zmiana bazy wymaga potwierdzenia z innego treningu.

Kiedy zmienić bazę fali

Notujesz trzy osobne liczby i ich nie mieszasz:

1RM	Najlepszy zaliczony wynik w wyciskaniu zawodniczym, jeśli go znasz.
e1RM	Szacunek z serii kontrolnej, z zapisanym ciężarem i RIR.
Baza	Ostrożna liczba, od której liczysz procenty w następnej fali.

Bazę zmieniasz tylko na wejściu do nowej fali. Tydzień 4 robisz jeszcze na starej.

REGUŁY DECYZJI

SYTUACJA	DECYZJA
Seria kontrolna wyraźnie lepsza niż poprzednio i potwierdzona przez singiel lub serie robocze	Baza +2,5 kg
Zmiana niewielka	Baza bez zmian, obserwujesz kolejną falę
Seria kontrolna słabsza, singiel stabilny	Baza bez zmian, sprawdzasz zmęczenie i warunki
Seria kontrolna i singiel systematycznie słabsze	Najpierw regeneracja, akcesoria, jedzenie i technika, dopiero potem baza
Dane sprzeczne albo seria nieporównywalna	Baza bez zmian, zapis „nierozstrzygnięte”

HIPOTEZA PROGRAMU Baza rośnie, gdy zachodzą oba warunki. Seria kontrolna dała co najmniej jedno powtórzenie więcej niż w poprzedniej fali przy tym samym ciężarze i RIR. I singiel z poniedziałku tygodnia 3 został wykonany w planowanym RPE, bez obniżania ciężaru. Gdy ciężar serii kontrolnej się zmienił, porównujesz e1RM: różnica musi wynosić co najmniej ciężar podzielony przez 30, przy 100 kg około 3,3 kg. W pierwszej fali nie masz odniesienia, więc baza zostaje, a wynik jest punktem wyjścia.

Przykład dwóch fal

Fala A, baza 120 kg: seria kontrolna 100 × 5 przy @9, e1RM 120 kg. Baza zostaje bez zmian.

Fala B, baza 120 kg: seria kontrolna 100 × 6 przy @9, e1RM 123,3 kg. Jeśli poniedziałkowy singiel potwierdza wzrost, następna fala startuje z bazą fali 122,5 kg. Jeśli nie, baza zostaje i obserwujesz kolejną falę.

HIPOTEZA PROGRAMU Krok 2,5 kg to około 2% przy bazie 120 kg, ale tylko 1,25% przy 200 kg. Przy wyższym poziomie siły krok trzeba dopasować.

Bibliografia (fragment)

Pozycje R## pochodzą z bibliografii metody HARDSET v1.0. Pozostałe są specyficzne dla tego programu. Status sprawdzono 13 listopada 2026 roku.

– Currier B. S., McLeod J. C., Banfield L. i in. (2023). Resistance training prescription for muscle strength and hypertrophy in healthy adults: A systematic review and Bayesian network meta-analysis. *British Journal of Sports Medicine*, 57(18), 1211–1220. doi.org/10.1136/bjsports-2023-106807

– Nuzzo J. L., Pinto M. D., Nosaka K. i in. (2024). Maximal number of repetitions at percentages of the one repetition maximum: A meta-regression and moderator analysis of sex, age, training status, and exercise. *Sports Medicine*, 54(2), 303–321. doi.org/10.1007/s40279-023-01937-7

– Refalo M. C., Remmert J. F., Pelland J. C. i in. (2024). Accuracy of intraset repetitions-in-reserve predictions during the bench press exercise in resistance-trained male and female subjects. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 38(3), e78–e85. doi.org/10.1519/JSC.0000000000004653

R17 Schoenfeld B. J., Grgic J., Ogborn D. i in. (2017). Strength and hypertrophy adaptations between low- vs. high-load resistance training: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 31(12), 3508–3523. doi.org/10.1519/JSC.0000000000002200

Nie cytujemy pracy Hughes, Peiffer i Scott o szacowaniu RIR (2020): wydawca ją wycofał.