EHM(X): 形式規則一覧

System F^{ξ} に集合効果 handler と静的述語 X を加える rank-1 表層

Figure 1. 構文・制約・効果の解釈

$$
\begin{aligned}
&e ::= x \mid \lambda x.e \mid e_1\, e_2 \mid \mathbf{let}\ x = e_1\ \mathbf{in}\ e_2 \mid \mathbf{perform}\ op\ e \mid \mathbf{handle}\ e\ \mathbf{with}\ h,\\
&h ::= \{\mathbf{return}\ r \mapsto e_r;\ op(x;k) \mapsto e_o\}, \qquad v ::= x \mid \lambda x.e,\\
&\tau ::= \alpha \mid \tau \xrightarrow{\epsilon} \tau, \qquad \epsilon ::= \varnothing \mid \{op\} \mid \mu \mid \epsilon \cup \epsilon,\\
&\sigma ::= \forall \bar{\alpha}, \bar{\mu}.\ P \Rightarrow \tau,\\
&C ::= \top \mid C \wedge C \mid \tau = \tau \mid \epsilon \subseteq \epsilon \mid op \notin \epsilon \mid p_X \mid \forall \alpha.C \mid \forall \mu.C.
\end{aligned}
$$

$$
\epsilon \equiv \epsilon' \quad \overset{\text{def}}{\Longleftrightarrow} \quad (\epsilon \subseteq \epsilon') \wedge (\epsilon' \subseteq \epsilon).
$$

$$
\mathrm{NF}(\epsilon) = (L_\epsilon, V_\epsilon), \qquad I_\rho(\epsilon) = L_\epsilon \cup \bigcup_{\mu \in V_\epsilon} \rho(\mu), \qquad I_\rho(\{Read\} \cup \mu) = \{Read\} \cup \rho(\mu).
$$

$$
\boxed{\mathrm{Split}(op, \epsilon, \delta) \overset{\text{def}}{=} (\delta \subseteq \epsilon) \wedge (\epsilon \subseteq \{op\} \cup \delta) \wedge (op \notin \delta)}
$$

$$
\rho \models \mathrm{Split}(op, \epsilon, \delta) \quad \Longleftrightarrow \quad I_\rho(\delta) = I_\rho(\epsilon) \setminus \{op\}.
$$

Figure 2. 値呼びの簡約規則

$$
(\lambda x.e)\, v \longrightarrow e[x \mapsto v] \qquad \mathbf{handle}\ v\ \mathbf{with}\ h \longrightarrow e_r[r \mapsto v].
$$

$$
\begin{gathered}
\mathbf{handle}\ E[\mathbf{perform}\ op[\bar{\theta}]\ v]\ \mathbf{with}\ h \longrightarrow e_o[\bar{\beta} \mapsto \bar{\theta}][x \mapsto v][k \mapsto k_E],\\
op \notin \mathrm{handled}(E), \qquad k_E = \lambda y.\mathbf{handle}\ E[y]\ \mathbf{with}\ h.
\end{gathered}
$$

宣言的型付け　$C; \Gamma \vdash e : \tau \mid \epsilon$

Figure 3. 基本規則

$$\frac{\Gamma(x) = \forall \bar{\beta}.P \Rightarrow \tau \quad C \models P[\bar{\theta}/\bar{\beta}]}{C; \Gamma \vdash x : \tau[\bar{\theta}/\bar{\beta}] \mid \varnothing} \quad (\textsc{Var})$$

$$\frac{C; \Gamma, x : a \vdash e : b \mid \eta}{C; \Gamma \vdash \lambda x.e : a \xrightarrow{\eta} b \mid \varnothing} \quad (\textsc{Abs})$$

$$\frac{C; \Gamma \vdash e_1 : a \xrightarrow{\eta} b \mid \epsilon_1 \quad C; \Gamma \vdash e_2 : a \mid \epsilon_2}{C; \Gamma \vdash e_1\, e_2 : b \mid \epsilon_1 \cup \epsilon_2 \cup \eta} \quad (\textsc{App})$$

$$\frac{\Sigma(op) = \forall \bar{\beta}.\tau_a \to \tau_b \qquad C; \Gamma \vdash e : \tau_a[\bar{\theta}/\bar{\beta}] \mid \eta}{C; \Gamma \vdash \textbf{perform}\ op\ e : \tau_b[\bar{\theta}/\bar{\beta}] \mid \eta \cup \{op\}} \quad (\textsc{Perform})$$

Figure 4. 値制限付き let

$$\frac{C_1; \Gamma \vdash v : \tau_1 \mid \varnothing \quad A = \mathrm{FV}(C_1, \tau_1) \setminus \mathrm{FV}(\Gamma) \quad \sigma = \forall A.C_1 \Rightarrow \tau_1 \quad C_2; \Gamma, x : \sigma \vdash e_2 : \tau_2 \mid \epsilon_2}{C_2; \Gamma \vdash \textbf{let}\ x = v\ \textbf{in}\ e_2 : \tau_2 \mid \epsilon_2} \quad (\textsc{LetVal})$$

$$\frac{\neg\, \mathrm{Value}(e_1) \quad C; \Gamma \vdash e_1 : \tau_1 \mid \epsilon_1 \quad C; \Gamma, x : \tau_1 \vdash e_2 : \tau_2 \mid \epsilon_2}{C; \Gamma \vdash \textbf{let}\ x = e_1\ \textbf{in}\ e_2 : \tau_2 \mid \epsilon_1 \cup \epsilon_2} \quad (\textsc{LetMono})$$

Figure 5. Deep handler

$$\frac{\begin{array}{c}\Sigma(op) = \forall \overline{\beta :: \kappa}.\tau_a \to \tau_b \qquad C; \Gamma \vdash e : \tau_{in} \mid \epsilon_{in} \\ C; \Gamma, r : \tau_{in} \vdash e_r : \tau_{out} \mid \epsilon_r \\ C; \Gamma, x : \tau_a, k : \tau_b \xrightarrow{\chi} \tau_{out} \vdash e_o : \tau_{out} \mid \epsilon_o \\ C \models \mathrm{Split}(op, \epsilon_{in}, \delta) \quad C \models \delta \subseteq \chi \quad C \models \epsilon_r \subseteq \chi \quad C \models \epsilon_o \subseteq \chi\end{array}}{C; \Gamma \vdash \textbf{handle}\ e\ \textbf{with}\ \{\textbf{return}\ r \mapsto e_r;\ \ op(x; k) \mapsto e_o\} : \tau_{out} \mid \chi} \quad (\textsc{Handle})$$

$\bar{\beta}$ rigid in the operation clause, $\qquad \bar{\beta} \cap \mathrm{FV}(\Gamma, \tau_{in}, \tau_{out}, \epsilon_{in}, \epsilon_r, \chi, \delta) = \varnothing.$

制約生成　$\mathcal{J}_\Gamma[\![e : \tau \mid \epsilon]\!] = C$

Figure 6. 構文に沿った生成方程式

$$\Gamma(x) = \forall\bar{\beta}.P \Rightarrow \tau_x, \qquad \mathcal{J}_\Gamma[\![x : \tau \mid \epsilon]\!] = \exists\bar{a}.\big(P[\bar{a}/\bar{\beta}] \wedge \tau = \tau_x[\bar{a}/\bar{\beta}] \wedge \epsilon \equiv \varnothing\big).$$

$$\mathcal{J}_\Gamma[\![\lambda x.e : \tau \mid \epsilon]\!] = \exists a, b, \eta.\big(\mathcal{J}_{\Gamma, x:a}[\![e : b \mid \eta]\!] \wedge \tau = a \xrightarrow{\eta} b \wedge \epsilon \equiv \varnothing\big).$$

$$\mathcal{J}_\Gamma[\![e_1\, e_2 : \tau \mid \epsilon]\!] = \exists a, \eta, \epsilon_1, \epsilon_2.\big(\mathcal{J}_\Gamma[\![e_1 : a \xrightarrow{\eta} \tau \mid \epsilon_1]\!] \wedge \mathcal{J}_\Gamma[\![e_2 : a \mid \epsilon_2]\!] \wedge \epsilon \equiv \epsilon_1 \cup \epsilon_2 \cup \eta\big).$$

$$\Sigma(op) = \forall\bar{\beta}.\tau_a \to \tau_b, \qquad \mathcal{J}_\Gamma[\![\textbf{perform } op\ e : \tau \mid \epsilon]\!] = \exists\bar{a}, \eta.\big(\mathcal{J}_\Gamma[\![e : \tau_a[\bar{a}/\bar{\beta}] \mid \eta]\!] \wedge \tau = \tau_b[\bar{a}/\bar{\beta}] \wedge \epsilon \equiv \eta \cup \{op\}\big).$$

Figure 7. let の生成と局所的な一般化

$$\mathrm{Gen}(\Gamma, v) = (\tau_1, \varnothing, C_1), \qquad A = \mathrm{FV}(\tau_1, C_1) \setminus \mathrm{FV}(\Gamma),$$
$$\sigma = \forall A.C_1 \Rightarrow \tau_1, \qquad \mathrm{Gen}(\Gamma, x : \sigma, e_2) = (\tau_2, \epsilon_2, C_2).$$

$$\mathrm{Gen}(\Gamma, \textbf{let } x = v \textbf{ in } e_2) = (\tau_2, \epsilon_2, C_2),$$

$$\mathcal{J}_\Gamma[\![\textbf{let } x = e_1 \textbf{ in } e_2 : \tau \mid \epsilon]\!] = \exists a, \epsilon_1, \epsilon_2.\big(\mathcal{J}_\Gamma[\![e_1 : a \mid \epsilon_1]\!] \wedge \mathcal{J}_{\Gamma, x:a}[\![e_2 : \tau \mid \epsilon_2]\!] \wedge \epsilon \equiv \epsilon_1 \cup \epsilon_2\big), \qquad \neg\,\mathrm{Value}(e_1).$$

Handler の生成・解決・健全性

Figure 8. Handler の制約生成

$$\Sigma(op) = \forall\overline{\beta :: \kappa}.\tau_a \to \tau_b, \qquad a, \delta, \chi \text{ fresh},$$
$$C_{in} = \mathcal{J}_\Gamma[\![e : \tau_{in} \mid \epsilon_{in}]\!], \qquad C_r = \mathcal{J}_{\Gamma, r:\tau_{in}}[\![e_r : \tau_r \mid \epsilon_r]\!],$$
$$C_o = \mathcal{J}_{\Gamma, x:\tau_a, k:\tau_b \xrightarrow{\chi} a}[\![e_o : \tau_o \mid \epsilon_o]\!].$$

$$\begin{aligned}\mathcal{J}_\Gamma[\![\textbf{handle } e \textbf{ with } h : \tau \mid \epsilon]\!] = \exists \tau_{in}, a, \delta, \chi, \epsilon_{in}, \epsilon_r, \tau_o, \epsilon_o.\big(&C_{in} \wedge C_r \wedge (\tau_r = a)\\ &\wedge \forall\bar{\beta}.(C_o \wedge \tau_o = a \wedge \epsilon_o \subseteq \chi)\\ &\wedge \mathrm{Split}(op, \epsilon_{in}, \delta) \wedge \delta \subseteq \chi \wedge \epsilon_r \subseteq \chi\\ &\wedge \tau = a \wedge \epsilon \equiv \chi\big).\end{aligned}$$

$$\bar{\beta} \text{ rigid}; \qquad \bar{\beta} \cap \mathrm{FV}(\Gamma, \tau_{in}, a, \delta, \chi, \epsilon_{in}, \epsilon_r) = \varnothing.$$

Figure 9. 解決器の保存条件

$$(a_1 \xrightarrow{\eta_1} b_1) = (a_2 \xrightarrow{\eta_2} b_2) \rightsquigarrow (a_1 = a_2) \wedge (b_1 = b_2) \wedge (\eta_1 \equiv \eta_2),$$
$$\mathrm{simplify}(C) = R \implies \forall\rho.\ \rho \models R \Rightarrow \rho \models C,$$
$$\mathrm{resolve}_X(A, C) = R_X \implies \forall\rho.\ \rho \models A \wedge R_X \Rightarrow \rho \models C.$$

$$\mathrm{inferQualified}(\Sigma, X, A, \Gamma, e) = (\tau, \epsilon, C) \quad \Longrightarrow \quad C; \Gamma \vdash_{\mathrm{EHM}(X)} e : \tau \mid \epsilon.$$

型変数の単一化・principal type・操作的安全性はこの証明の対象外。

Figure 10. *ping* **の制約簡約**

$$\Sigma(ping) = \forall\beta.\beta \to \beta, \qquad f : \forall\alpha.\ Eq\,\alpha \Rightarrow \alpha \xrightarrow{\varnothing} \alpha,$$
$$g = \lambda x.\textbf{perform } ping\,(f\,x), \qquad g : \forall\alpha.\ Eq\,\alpha \Rightarrow \alpha \xrightarrow{\{ping\}} \alpha,$$
$$e = \textbf{handle } (g\,y) \textbf{ with } \{\textbf{return } r \mapsto r;\ ping(x; k) \mapsto k\,x\},$$
$$\mathrm{Split}(ping, \{ping\}, \delta) \Longrightarrow \delta = \varnothing, \qquad \epsilon_r = \varnothing, \qquad \epsilon_o = \chi,$$
$$C_e = Eq\,\alpha \wedge (\varnothing \subseteq \chi) \wedge (\chi \subseteq \chi), \qquad \chi = \varnothing \text{ is one solution.}$$