


INTERNATIONAL SOCIETY OF GERIATRIC ONCOLOGY (SIOG):

LEITLINIEN-EMPFEHLUNGEN FÜR DIE BEHANDLUNG VON ÄLTEREN PATIENTEN MIT FORTGESCHRITTENEM PROSTATAKARZINOM

Lebenserwartung von älteren Männern:




Modifiziert nach Droz J.P et al, International Society of Geriatric Oncology (SIOG) proposal of guidelines for advanced prostate cancer in senior adults, 23. EAU Congress Mailand 2008, Abstract Nr. 644

DIE SIOG-EMPFEHLUNGEN FÜR DAS THERAPIE-MANAGEMENT BEI ÄLTEREN PATIENTEN MIT HRPC:

- Die **Therapieentscheidung** sollte auf Grundlage des Gesundheitszustandes des Patienten erfolgen, welcher die Abschätzung der individuellen Lebenserwartung ermöglicht
- Die **Bewertung des Gesundheitszustandes** sollte auf Basis folgender Bewertungsparameter erfolgen:
 - Komorbiditäten (CISR-G* Klassifikation)
 - Alltagskompetenz geriatrischer Patienten (funktionale Beurteilung nach IADL* und ADL*)
 - Ernährungszustand
 - kognitive Leistungsfähigkeit, emotionales Empfinden und/ oder wiederholte psychische Störungen (Delirium)
- Patienten sollten entsprechend des Gesundheitszustandes wie folgt therapiert werden:

Therapiestratifizierung älterer Patienten (>70 Jahre)



Modifiziert nach Droz J.P et al, International Society of Geriatric Oncology (SIOG) proposal of guidelines for advanced prostate cancer in senior adults, 23. EAU Congress Mailand 2008, Abstract Nr. 644