


Vergleich der leitlinienbasierten Empfehlungen zur Chemotherapie beim Kastrationsrefraktären Prostatakarzinom (CRPC)

Parameter	S3-Leitlinie	EAU-Leitlinie
Vor Einleitung der Therapie		
Testosteron < 50 ng/ml	Ja	Ja
Aufklärung des Patienten über Erfolg, Nebenwirkungen und Durchführung	Ja	Ja
Androgendeprivation mit LHRH-Analoga	Beibehalten	Beibehalten
Komplette Androgenblockade	Beibehalten	Antiandrogene absetzen
Interdisziplinäre Beratung vor Chemotherapie	Ja	Ja
Chemotherapie		
Zielsetzung		
Lebensverlängerung	Nein	Ja
Palliation	Ja	Ja
Medikation der Wahl		
	Docetaxel, 75 mg/m ² , 3-Wochen-Intervall	Docetaxel, 75 mg/m ² , 3-Wochen-Intervall
Indikation		
Symptomatische Metastasierung	Ja	Ja
Asymptomatische Metastasierung	Nicht generell	Ja
PSA-Verdopplungszeit < 3 Monate, Metastasen	Ja	Ja
PSA-Progress ohne Metastasen	Nein	Nein

Flussdiagramm der therapeutischen Optionen bei PSA-Progress nach initialer Hormontherapie



LHRH = Luteinising Hormone Releasing Hormone;
KAB = komplette Androgenblockade;
DES = Diethylstilbesterol