
| | 推出面积 | 菌柄产量 k/h | 疣块产量k/h | 菌索/菌产量k/h | 骨粉需求k/h | 输出/输入 [1] | 单位面积效率 [2] | |
|---------|--------|----------|---------|-----------|---------|-----------|------------|--|
| | 绯红菌 | | | | | 0.0 | | |
| 推地板频 | i率 4gt | | | | | | | |
| | 推出面积 | 菌柄产量 k/h | 疣块产量k/h | 菌索/菌产量k/h | 骨粉需求k/h | 输出/输入 [3] | 单位面积效率 [4] | |
| 7*5 | | 35 7 | 7 | 33 | 14.1 | 0.50 | 1.4 | |
| 10*6*2 | | 120 23 | 20 | 115 | 58.9 | 0.39 | 0.3 | |
| 10*14*2 | | 280 31 | 37 | 115 | 56.8 | 0.55 | 0.2 | |
| 10*24*2 | | 480 35 | 46 | 115 | 55.7 | 0.63 | 0.1 | |
| | 绯红菌 | | | | | | | |
| 推地板频 | 率 8gt | | | | | | | |
| | 推出面积 | 菌柄产量 k/h | 疣块产量k/h | 菌索/菌产量k/h | 骨粉需求k/h | 输出/输入 [5] | 单位面积效率 [6] | |
| 7*5 | | 35 3.6 | 3.9 | 18 | 6.9 | 0.53 | 1.5 | |
| 10*6*2 | | 120 22 | 18 | 64 | 27.9 | 0.79 | 0.7 | |
| 10*14*2 | | 280 25 | 34 | 64 | 25.9 | 0.96 | 0.3 | |
| 10*24*2 | | 480 27 | 36 | 64 | 25.7 | 1.05 | 0.2 | |
| | 诡异菌 | | | | | | | |
| 推地板频 | 率 4gt | | | | | | | |
| | 推出面积 | 菌柄产量 k/h | 疣块产量k/h | 菌索/菌产量k/h | 骨粉需求k/h | 输出/输入 [7] | 单位面积效率 [8] | |
| 7*5 | | 35 8.2 | 7.5 | 25.4 | 14.7 | 0.56 | 1.6 | |
| 10*6*2 | | 120 29.7 | 23.4 | 100 | 59.9 | 0.50 | 0.4 | |
| 10*14*2 | | 280 35.9 | 39.5 | 107.1 | 57.3 | 0.63 | 0.2 | |
| 10*24*2 | | 480 37.3 | 45.7 | 105.6 | 56.6 | 0.66 | 0.1 | |



- [1] 约大越好
- [2] 越大越好
- [3] 约大越好
- [4] 越大越好
- [5] 约大越好
- [6] 越大越好
- [7] 约大越好
- [8] 越大越好
- [9] 约大越好
- [10] 越大越好