

实验6

(课后作业, 课程项目)

需要提交程序代码和实验报告
截止日期2024年11月6日下午16:00
本次作业满分12分。

探索性实验

回顾：设 C 为一个大于或等于2的常数。设三个自变量 ρ, p, ν 的变化范围为

$$\Omega = \{(\rho, p, \nu) : \rho > 0, p > 0, |\nu| < 1\} \quad (1)$$

我们定义以下三个因变量

$$D = \frac{\rho}{\sqrt{1-\nu^2}}, \quad m = \frac{(\rho+Cp)\nu}{1-\nu^2}, \quad E = \frac{\rho+Cp}{1-\nu^2} - p. \quad (2)$$

我们在课上做过一个相关数学实验，结果表明：

$$D > 0, E > \sqrt{D^2 + m^2}. \quad (3)$$

问题1（4分）：对任意给定的 $-1 < t < 1$ ，定义

$$\tilde{D} = D(1 + t\nu), \quad \tilde{m} = m(1 + t\nu) + tp, \quad \tilde{E} = E + tm,$$

首先请通过随机实验探索以下不等式是否恒成立（1.5分）

$$\tilde{E} > \sqrt{\tilde{D}^2 + \tilde{m}^2}.$$

然后根据你探索的结果：若成立，请尝试给出严格的数学证明；若不成立，请尝试给出严格的解析的反例（2.5分）。

探索性实验

回顾：设 C 为一个大于或等于2的常数。设三个自变量 ρ, p, ν 的变化范围为

$$\Omega = \{(\rho, p, \nu) : \rho > 0, p > 0, |\nu| < 1\} \quad (1)$$

我们定义以下三个因变量

$$D = \frac{\rho}{\sqrt{1-\nu^2}}, \quad m = \frac{(\rho+Cp)\nu}{1-\nu^2}, \quad E = \frac{\rho+Cp}{1-\nu^2} - p. \quad (2)$$

我们在课上做过一个相关数学实验，结果表明：

$$D > 0, E > \sqrt{D^2 + m^2}. \quad (3)$$

问题2 (3.5分)：随机生成很多组满足(3)式的 (D, m, E) ，通过数学实验探索如下关于 x 的非线性方程

$$Cx + \frac{m^2}{E+x} + D \sqrt{1 - \frac{m^2}{(E+x)^2}} = E + x$$

是否一定总是有唯一的正根（正解）？ (2分)

然后，结合实验观察，然后严格证明你的结论 (1.5分)。

探索性实验

回顾：设 C 为一个大于或等于2的常数。设三个自变量 ρ, p, ν 的变化范围为

$$\Omega = \{(\rho, p, \nu) : \rho > 0, p > 0, |\nu| < 1\} \quad (1)$$

我们定义以下三个因变量

$$D = \frac{\rho}{\sqrt{1-\nu^2}}, \quad m = \frac{(\rho+Cp)\nu}{1-\nu^2}, \quad E = \frac{\rho+Cp}{1-\nu^2} - p. \quad (2)$$

我们在课上做过一个相关数学实验，结果表明：

$$D > 0, E > \sqrt{D^2 + m^2}. \quad (3)$$

问题3（3分）：随机生成大量的不同组 (ρ, p, ν) ，根据(2)式计算 (D, m, E) ，通过数学实验，猜想(2)式定义的 (D, m, E) 是否满足如下恒等式

$$Cp + \frac{m^2}{E+p} + D \sqrt{1 - \frac{m^2}{(E+p)^2}} = E + p.$$

然后证明你的结论。再结合问题2的观察结果，由此你总结到什么规律？

探索性实验

回顾：设 C 为一个大于或等于2的常数。设三个自变量 ρ, p, ν 的变化范围为

$$\Omega = \{(\rho, p, \nu) : \rho > 0, p > 0, |\nu| < 1\} \quad (1)$$

我们定义以下三个因变量

$$D = \frac{\rho}{\sqrt{1-\nu^2}}, \quad m = \frac{(\rho+Cp)\nu}{1-\nu^2}, \quad E = \frac{\rho+Cp}{1-\nu^2} - p. \quad (2)$$

我们在课上做过一个相关数学实验，结果表明：

$$D > 0, E > \sqrt{D^2 + m^2}. \quad (3)$$

问题4 (1.5分) : 事实上，(2)式定义了从自变量 (ρ, p, ν) 到因变量 (D, m, E) 的一个多元向量值函数，而(3)式表明该函数的值域为

$$A = \{(D, m, E) : D > 0, E > \sqrt{D^2 + m^2}\}$$

请结合问题2-3的实验观察结果，尝试证明：对任意给定 $(D, m, E) \in A$ ，存在唯一的满足(1)式的 (ρ, p, ν) 使得(2)成立。 (1分)

综合问题1 ($t=0$ 的结果) 和问题2、3、4的探索结果，是否表明该多元向量值函数是一个双射？请说明理由 (0.5分)