

Lab_09_HW

Contents

- [4.1a](#)
- [4.1b](#)
- [4.1c](#)
- [4.1e](#)

4.1a

```
wp = .6*pi;
ws = .64*pi;
dp = .05;
ds = .01;


frp = wp/(pi);
frs = ws/(pi);

[N, Fo, Ao, W] = firpmord([frp, frs], [1, 0], [.05, .01], 2);
M = N + 2;
b = firpm(M, Fo, Ao, W);
fprintf('\nOrder used was M = %d, predicted M = %d', M, N);
```

Order used was M = 75, predicted M = 73

4.1b



```
n = 1:length(b);
stem(n-1,b);
title('Stem Plot of Impulse Response');
xlabel('Index (n)');
ylabel('Magnitude');
```





4.1c

```
figure
ww = -pi:1/1000:pi;
HH = freqz(b, 1, ww);
plot(ww, abs(HH));
title('Frequency Response Magnitude');
xlabel('Normalized Frequency');
ylabel('Magnitude');

open HW_Mag.fig
open HW_Mag1.fig
open HW_Mag2.fig
```





```
figure
plot(ww, angle(HH));
title('Frequency Response Phase');
xlabel('Normalized Frequency');
ylabel('Phase');

open HW_phase.fig

slope = (-3.128 - 3.315)/(.08341 + .08359);
fprintf('\nSlope of FIR filter phase is %f', slope);
```

Slope of FIR filter phase is -38.580838

