

Решение на стационарна задача със самолетно крило

Калоян Стоилов

19 януари 2022 г.

$$(D) \quad \begin{cases} \ddot{u} - \Delta u = 0, & \text{в } \Omega \times J \\ n \cdot \nabla u |_{\Gamma_N \times J} = 0 \\ u |_{\Gamma_D \times J} = 0.1 \sin(8\pi t) \\ u = \dot{u} = 0, & \text{в } \Omega \text{ при } t = 0 \end{cases}$$

За да достигнем до вариационна формулировка, нека разгледаме за фиксиран момент $t \in J$ и умножим скалярно двете страни по функция v и приложим формула за интегриране по части:

$$\begin{aligned} \iint_{\Omega} v \ddot{u} d\Omega - \iint_{\Omega} v \Delta u d\Omega &= 0 \\ \iint_{\Omega} v \ddot{u} d\Omega - \iint_{\Omega} v (\nabla \cdot \nabla u) d\Omega &= 0 \\ \iint_{\Omega} v \ddot{u} d\Omega + \iint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u d\Omega - \int_{\partial\Omega} (n \cdot \nabla u) v ds &= 0 \\ \iint_{\Omega} v \ddot{u} d\Omega + \iint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u d\Omega &= \int_{\Gamma_N} \cancel{(n \cdot \nabla u)}^0 v ds + \int_{\Gamma_D} (n \cdot \nabla u) v ds \\ \iint_{\Omega} v \ddot{u} d\Omega + \iint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u d\Omega &= \int_{\Gamma_D} (n \cdot \nabla u) \cancel{v}^0 ds \\ \iint_{\Omega} v \ddot{u} d\Omega + \iint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u d\Omega &= 0 \end{aligned}$$

За да подсигурир последното съкращаване, ще е необходимо:

$$v \in V = \{v \in H^1(\Omega) \mid v |_{\Gamma_D} = 0\}$$

Така достигнахме до вариационната задача:

(V) За всяко $t \in J$ търсим $u \in V$, такава че:

$$\forall v \in V \left(\frac{d^2}{dt^2} \iint_{\Omega} vu \, d\Omega + a(u, v) = 0 \right)$$

$$a(u, v) = \iint_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla u \, d\Omega$$

Билинейната форма за задачата ни е скалярно произведение и съответно може да приложим цялата теория. Задачата на Риц-Гальборкин е:

(R-G) За всяко $t \in J$ търсим $u_h \in V_h(\mathcal{K})$, такава че:

$$\forall v \in V_h(\mathcal{K}) \left(\frac{d^2}{dt^2} \iint_{\Omega} vu_h \, d\Omega + a(u_h, v) = 0 \right)$$

След стандартните разписвания имаме:

$$\frac{d^2}{dt^2} M^0 \mathbf{q} + M^1 \mathbf{q} = 0$$

$$M^0 \frac{d^2 \mathbf{q}}{dt^2} + M^1 \mathbf{q} = 0$$

$$M^0 = \begin{pmatrix} \iint_{\Omega} \varphi_1 \varphi_1 \, d\Omega & \dots & \iint_{\Omega} \varphi_1 \varphi_n \, d\Omega \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \iint_{\Omega} \varphi_n \varphi_1 \, d\Omega & \dots & \iint_{\Omega} \varphi_n \varphi_n \, d\Omega \end{pmatrix}, \quad M^1 = \begin{pmatrix} \iint_{\Omega} \nabla \varphi_1 \cdot \nabla \varphi_1 \, d\Omega & \dots & \iint_{\Omega} \nabla \varphi_1 \cdot \nabla \varphi_n \, d\Omega \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \iint_{\Omega} \nabla \varphi_n \cdot \nabla \varphi_1 \, d\Omega & \dots & \iint_{\Omega} \nabla \varphi_n \cdot \nabla \varphi_n \, d\Omega \end{pmatrix}$$

M^0, M^1 са сметнати като по лекции. В кода се възползваме от факта, че при линейна интерполация градиента на функциите на формата $\nabla \Psi$ е константен. Тогава директно може да се пресметне интеграла за локалните матрици на коравина, който е лицето на стандартния триъгълник. Нормализираната система изглежда така:

$$(D) \quad \begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{p} \\ \dot{\mathbf{p}} = -(M^0)^{-1} M^1 \mathbf{q} \end{cases}$$