

# Heineho věta

# Heineho věta

Tomáš Kasalický, 2014

Heineho věta nám ukazuje jak mezi sebou souvisí pojmy "limita posloupnosti" a "limita funkce". Přesné znění této věty je následující:

**Věta:** Buď  $f$  reálná funkce reálné proměnné, body  $a, c \in \overline{\mathbb{R}}$ , a funkce  $f$  definovaná na okolí bodu  $a$  s možnou výjimkou bodu  $a$  samotného. Potom platí  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$  právě tehdy, když pro každou posloupnost  $x_n$ , jejíž každý člen patří do množiny  $D_f$  vyjma bod  $a$ , konvergující k  $a$  platí  $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = c$ .

Velmi hrubě můžeme říci, že  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = c$  platí právě tehdy, když limita posloupnosti  $(f(x_n))$  je rovna  $c$  nezávisle na způsobu jakým se posloupnost  $(x_n)$  blíží k bodu  $a$ .

Heineho věta, po jednoduché úpravě, v platí i pro jednostranné limity.

---


## Neexistence limity funkce $\sin(1/x)$ když $x \rightarrow 0$

Nadefinujme si naši funkci.

$f(x) = \sin(1/x)$

A podívejme se na její graf.

```
def f_plot():
    graph = Graphics()
    graph += plot( f(x) , (x, -.5, .5), color="black",
    axes_labels=['$x$', '$y=\sin(1/x)$'])
    return graph
f_plot()
```



Z obrázku vidíme, že tato funkce velmi osciluje, když se nezávisle proměnná  $x$  blíží k bodu 0. Jak je to s její limitou v bodě nula? To, že na obrázku vidíme jen černý flek nic neznamená, co když na vhodně zvolené horizontální škále již funkce "zkonverguje" do nuly?


## Zoom

Pokusme se podívat na menší okolí bodu nula, je snadné předchozí obrázek rozpohybovat. Vidíme, že chování u nuly je zřejmě velmi divoké.

```
def f_plot(radius):
    graph = Graphics()
    graph += plot( f(x) , (x, -radius, radius),
color="black", axes_labels=['$x$', '$y=\sin(1/x)$'])
    show (graph)
    return graph
#####
# make Interaction
#####
```

```
@interact
def _( radius= slider(srange(.01,.501,.01),default = .5,
    label="Poloměr okolí nuly:    ", display_value=True) ):
    f_plot(radius)
```

Poloměr okolí nuly:



Pokud si na grafu vygenerovaném počítačem (Sage, Mathematica atd.) všimneme podivných grafických artefaktů (jako třeba na obrázku výše), je potřeba zbystřit a být při interpretaci výsledků zvláště opatrný. Často jsou takovéto numerické artefakty známkou nepřesnosti vykreslovacích algoritmů.

## Dvě vhodné posloupnosti

Zvolme dvě posloupnosti.

```
a(n) = 1/(2*pi*n)
b(n) = 1/(2*pi*n + pi/2)
```

Obě patří do definičního oboru naší funkce, vzpomeňte  $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$ , obě očividně konvergují k nule. Otestujme si tyto vlastnosti pomocí Sage.

```
show(limit(a(n), n=infinity))
show(limit(b(n), n=infinity))
```

0

0

Pro následující výpočty je podstatné Sage dát najevo, že  $n$  je celočíselná proměnná.

```
assume(n, 'integer')
```

Avšak pro limity obrazů posloupností  $(a_n)$  a  $(b_n)$  vzledem k zobrazní  $f$  máme:

```
# alternativní zápis limity
f(a(n)).limit(n=infinity)
```

0

```
f(b(n)).limit(n=infinity)
```

1

Ve skutečnosti se jedná o konstantní posloupnosti (tak jsme je vlastně na přednášce i volili).

```
show(f(a(n)).simplify())
show(f(b(n)).simplify())
```


0

# 1

Následuje opět grafické interaktivní znázornění. Vizte komentář níže.

```
f(x)=sin(1/x)
def f_plot(n):
    graph = Graphics()
    graph += plot( f(x) , (x, -.1, .1), color="black",
axes_labels=['$x$', '$y=\sin(1/x)$'])
    graph += point((a(n),f(a(n))), rgbcolor="red", size =
100,zorder=3)
    graph += point((b(n),f(b(n))), rgbcolor="blue", size =
100,zorder=3)
    show (graph)
    return graph
#####
# make Interaction
#####
@interact
def _( n= slider(srange(1,100,1),default = 2,
    label="$n$:    ", display_value=True) ):
    f_plot(n)
```

$n$ :  2



Červené puntíky označují body o souřadnicích  $(a_n, f(a_n))$ , modré puntíky označují body o souřadnicích  $(b_n, f(b_n))$ . V demonstraci můžeme manipulovat indexem  $n$ . Vidíme, že když se  $n$  zvětšuje, pak  $x$ -ové souřadnice bodů konvergují k nule ( $a_n \rightarrow 0$  a  $b_n \rightarrow 0$  když  $n \rightarrow \infty$ ) a posloupnosti  $y$ -nových souřadnic, tedy funkčních hodnot,  $(f(a_n))$  a  $(f(b_n))$  konvergují po řadě k 1 a k 0. Podle Heineho věty proto limita funkce  $f$  v bodě 0 neexistuje.

Dodatek: Vidíte, že kdybychom zvolili posloupnost jinak, mohli bychom jako limitu obrazů dostat libovolné číslo z intervalu  $\langle -1, 1 \rangle$ .


```
f(x)=sin(1/x)
def f_plot(c,n):
```

```

graph = Graphics()
graph += plot( f(x) , (x, -.1, .1), color="black",
axes_labels=['$x$', '$y=\sin(1/x)$'])
graph += point((1/(arcsin(c)+2*pi*n),f(1
/(arcsin(c)+2*pi*n))), rgbcolor="red", size = 100,zorder=3)
graph += line( [(-.1,f(1/(arcsin(c)+2*pi*n))),(.1,f(1
/(arcsin(c)+2*pi*n)))], linestyle='--', color="red" )
show (graph)
return graph
#####
# make Interaction
#####
@interact
def _( n= slider(srange(1,100,1),default = 2,
label="$n$: ", display_value=True),c=
slider(srange(-1,1,.1),default = .5,
label="$c$: ", display_value=True) ):
f_plot(c,n)

```

*n*:  2  
*c*:  0.5000000000000000



## Existence limity funkce $x \sin(1/x)$ když $x \rightarrow 0$

Nadefinujme si naši funkci.


```
g(x)=x*sin(1/x)
```

A podívejme se na její graf.

```
def g_plot():
    graph = Graphics()
    graph += plot( g(x) , (x, -.4, .4), color="black",
    axes_labels=['$x$', '$y=x \sin(1/x)$'])
```



```
show (graph, aspect_ratio = 'automatic')  
g_plot()
```



Z obrázku vidíme, že tato funkce sice pořád velmi osciluje okolo nuly, když se nezávisle proměnná  $x$  blíží k bodu 0. Ale díky tomu, že se násobí nezávisle proměnnou  $x$ , tak je tato oscilace utolumena. Odhadujeme proto, že limita v nule existuje. To je jak již víme pravda, díky větě o limitě sevřené funkce. Podívejme se na tento problém z pohledu Heineho věty.

## Dvě vhodné posloupnosti

Zvolme opět dvě posloupnosti, stejně jako v minulém odstavci.

$$\begin{aligned} a(n) &= 1 / (2\pi n) \\ b(n) &= 1 / (2\pi n + \pi/2) \end{aligned}$$

Připomeňme, že obě patří do definičního oboru naší funkce ( $D_f = \mathbb{R} - \{0\}$ ),

obě očividně konvergují k nule.

Avšak pro limity jejich obrazů nyní máme:

```
show(g(a(n)).limit(n=infinity))  
show(g(b(n)).limit(n=infinity))
```


0

0

Podívejme se na graf.

```
def g_plot(n):  
    graph = Graphics()  
    graph += plot( g(x) , (x, -.4, .4), color="black",  
axes_labels=['$x$', '$y=x\sin(1/x)$'])  
    graph += point((a(n),g(a(n))), rgbcolor="red", size =  
100,zorder=3)  
    graph += point((b(n),g(b(n))), rgbcolor="blue", size =  
100,zorder=3)  
    show (graph, aspect_ratio = 'automatic')  
#####  
# make Interaction  
#####  
@interact  
def _( n= slider(srange(1,100,1),default = 2,label="$n$:  
", display_value=True) ):  
    g_plot(n)
```

$n$ :  2



Červené puntíky označují body o souřadnicích  $(a_n, g(a_n))$ , modré puntíky označují body o souřadnicích  $(b_n, g(b_n))$ . V demonstraci můžeme manipulovat indexem  $n$ . Vidíme, že když se  $n$  zvětšuje, pak  $x$ -ové souřadnice bodů konvergují k nule ( $a_n \rightarrow 0$  a  $b_n \rightarrow 0$  když  $n \rightarrow \infty$ ) a posloupnosti  $y$ -nových souřadnic, tedy funkčních hodnot,  $(g(a_n))$  a  $(g(b_n))$  konvergují obě k 0.

Dodatek: Vidíme, že kdybychom zvolili posloupnost jinak, dostaneme jako limitu funkčních hodnot vždy 0. Skutečně. Buď  $(u_n)$  libovolná posloupnost nenulových členů konvergující k bodu 0. Potom  $0 \leq |g(u_n)| = |u_n \sin(1/u_n)| \leq |u_n| \rightarrow 0$ , když  $n \rightarrow \infty$ . Podle věty o limitě sevřené posloupnosti proto je limita posloupnosti  $(g(u_n))$  rovna nule.

Podle Heineho věty je tedy limitou funkce  $g$  v bodě 0 číslo 0. Na přednášce si tento fakt později ukážeme i pomocí věty o limitě sevřené funkce.