AMAMI FLORA WALK BOOK ｜ VOL. 01

2〜3月、身近な散歩道で見つける自然

奄美の春を、
草花とゆっくり歩く

写真・文 ｜ かめとら

AMAMI ISLAND BOTANICAL ESSAY

AMAMI NATURALIST ESSAY SERIES

2〜3月、身近な散歩道で見つけた自然

奄美の春を、草花とゆっくり歩く

写真・文 | かめとら

AMAMI ISLAND BOTANICAL FLORA WALK

身近な散歩道に、奄美の自然を見つける

世界自然遺産への登録以降、奄美大島を訪れる旅人は増えました。原生林や美しい海岸など、有名な名所には多くの人が足を運びます。しかし、私が日々の暮らしの中で最も心揺さぶられるのは、名もない身近な散歩道にひっそりと息づく草花たちです。

温帯と亜熱帯が交わる奄美の環境は、少し目線を落とし、耳を澄ますだけで驚くほど豊かな表情を見せてくれます。観光の予定を詰め込まず、ほとんど貸切のような散歩道を五感を開いて歩く時間。この本は、そんな静かな奄美の散歩の楽しみ方を手渡すための小さな案内帖です。

花、葉、音、香りに気づく散歩の手引き

01 視線を上下に動かして歩く

花だけでなく、樹幹に這う肉厚な葉や、冬を越して残る果実にも注目します。頭上5mの梢と足元の岩肌に、思いがけない出会いが隠れています。

02 資料の花期と「実際の観察期」

一般的な植物図鑑の開花時期と、奄美の現場で実際に目にする時期にはズレがあります。本書では著者が現地で確認したリアルな時期を基準に記録しています。

03 五感を通して自然に意識を向ける

鳥の声、風の音、湿った土の匂い。歩く速度を緩め、五感で感じる静寂そのものが、旅の最大の贅沢になります。

01
桜の色から春を探す

本土よりふた足早く訪れる奄美の春。
山肌を鮮烈に染め上げる紅い寒桜、冬を越して岩肌に真珠のように輝く白い実、そして霧の山頂で出会う淡いピンクの山桜。
奄美の春の散歩は、多彩な「桜の色」を手がかりに始まります。

FEATURED FLORA IN CHAPTER 01

ヒカンザクラ（緋寒桜）

Cerasus campanulata

奄美の春の色を決定づける山肌の紅。ボトッと落ちる潔い散り際。

シラタマカズラ（白玉蔓）

Psychotria serpens L.

桜のピンクと冬の白い実の対比。岩肌に這い登る生命の強さ。

サクラツツジ（桜躑躅）

Rhododendron tashiroi

霧の森で出会う淡いピンクの花と、激しくねじれた幹の造形美。

散歩道の空気と音

2月下旬の曇り空。しっとりと湿った林道に、ルリカケスの澄んだ「ジャーッ」という声が響く。風が吹き抜けるたび、樹上から丸ごとの紅い花が音もなく足元へ落ちてくる。

ヒカンザクラ 緋寒桜

Cerasus campanulata　バラ科 サクラ属

本土の淡いソメイヨシノとは対照的に、奄美の山肌を鮮烈な紅で染め上げるのがヒカンザクラです。花びらは平らに開かず、小さなベルのように下を向いたまま半開きで咲きます。

この桜の散り際は、驚くほど潔いものです。花びらが一枚ずつ舞うのではなく、萼（がく）をつけたまま花の形のまま「ボトッ」と地面へ落ちていきます。舗装道路の上に鮮やかな緋色の絨毯が広がっているのを見つけたら、ぜひ立ち止まって樹上を見上げてみてください。深い緑の森の中で、そこだけ光が灯ったような静かな春に出会えます。

DETAIL ｜ 白花の変種

緋色の花より少し遅れて咲く珍しい白花。紅と白が並ぶと森の春の訪れがいっそう際立つ。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期	1月下旬 〜 2月下旬	出会いやすさ	★★★★☆（林道沿いに多数）
視線の向き	樹上（5〜8m）および足元の落花	生育環境	山間部の町道、明るい林縁

見分けの急所　鐘形に下垂して咲く濃紫紅色の花。地面に花首ごと丸ごと落ちる特徴的な散り際。

散歩道の空気と音

苔むした湿った岩肌。頭上には桜の紅が広がる一方、足元の薄暗い日陰には真珠のような白が点々と灯る。触れるとひんやりと冷たく、しっとりとした森の呼吸が伝わってくる。

シラタマカズラ 白玉蔓

Psychotria serpens L. アカネ科 ボチョウジ属

春まだ浅い2月の散歩道で、ヒカンザクラの鮮烈な紅と見事な対比を描くのが、シラタマカズラの冬の実です。花が咲くのは初夏の5〜6月ですが、冬から早春にかけては真珠のような半透明の白い球形果実が岩肌を彩ります。

光沢のある肉厚な葉が気根を出して樹幹や岩肌に這い登る姿は、亜熱帯の強い生命力を感じさせます。花だけでなく、冬を越して残る果実に目を留めることで、奄美の自然の時間の連なりがぐっと身近に感じられるはずです。

DETAIL ｜ 岩肌を這う光沢葉

気根を伸ばして大木や岩に密着。冬でも色褪せない肉厚な葉がみずみずしい。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期	冬〜3月（白い果実）	出会いやすさ	★★★☆☆（湿った岩肌・大木）
視線の向き	足元〜目線（岩肌、大木の幹の着生部）	生育環境	林内の湿った日陰、渓流沿いの岩石

見分けの急所　岩や樹幹に密着して這う多肉質の卵形小葉。直径約5mmの白玉のような艶やかな球果。

散歩道の空気と音

湯湾岳の山道。霧が流れ、ひんやりとした冷気が漂う中、森の緑に浮かび上がる淡いピンク。ツツジ特有のわずかな甘い気配が、湿った霧の中にふわりと溶けている。

サクラツツジ 桜躑躅

Rhododendron tashiroi ツツジ科 ツツジ属

奄美で「シロサクラ」の愛称でも親しまれるサクラツツジ。ツツジの仲間でありながら、桜のような淡い桃色から白色の優しい花を咲かせます。常緑のミツバツツジ類という植物学的にも貴重な種です。

花の見事さもさることながら、森を歩く際はぜひ「幹」にも注目してみてください。風雨に耐えながら年月を重ねた幹は激しくねじれ、独自の造形美を誇ります。静謐な森の中で出会うその姿は、奄美の冬から春への移ろいを告げる気品に満ちています。

DETAIL ｜ 淡桃色の花冠

直径約4cmの漏斗状花。雄しべが10本あり、花弁の奥に美しい赤紫色の斑点が宿る。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期 2月 〜 3月

出会いやすさ ★★★☆☆（山頂付近や湿潤な谷間）

視線の向き 目線〜樹上（幹のねじれと枝先の花）

生育環境 低山の林縁、湯湾岳や金作原などの湿潤な森

見分けの急所 直径約4cmの漏斗状花。雄しべが10本あり、花弁の内面上側に赤紫色の斑点がある。



02

森で出会う、
小さな花と不思議な形

遠くから眺める景色を通り過ぎ、森の懐へと足を踏み入れてみる。
サクソフォンを思わせる奇怪な筒花、薄暗い林床に灯る宝石のような瑠璃色の実、落ち葉に埋もれる極小の野生蘭。
立ち止まり、かがみ込むことで初めて見えてくる、奄美の奥深い命の造形に出会う章です。

FEATURED FLORA IN CHAPTER 02

リュウキュウウマノスズクサ

Aristolochia liukiuensis Hatus.

サクソフォン型の花と蝶の食草。受粉トラップを持つ不思議なつる植物。

リュウキュウルリミノキ

Lasianthus fordii

照葉樹林の林床に咲く可憐な白い小花と、深く輝く瑠璃色の宝石実。

ヒメフタバラン（姫双葉蘭）

Neottia japonica

草丈わずか数センチ。落ち葉の間でひっそり息づく極小の野生蘭。

散歩道の空気と音

昼下がりの林縁。木漏れ日の中にジャコウアゲハが黒く優雅に舞う。葉の陰に目を凝らすと、ひっそりと佇むサクソフォンのような奇妙な筒花。微かに土と青葉の香りが漂う。

リュウキュウウマノスズクサ 琉球馬の鈴草

Aristolochia liukiuensis Hatus.　ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ属

冬から春にかけての奄美の林縁で、宝探しのように探したくなるのがこの花です。サクソフォンや喫煙パイプを思わせる暗紫褐色の筒状花は、花弁ではなく萼が変化したもの。内部には逆毛があり、受粉のために昆虫を一時的に閉じ込めるトラップ構造を持っています。

大きなハート形のつる葉は、優美な蝶・ジャコウアゲハの幼虫の唯一のごちそうでもあります。図鑑の写真だけでは見過ごしてしまう草花も、その造形の面白さに気づくと、毎日の散歩道が博物館のように見えてきます。

DETAIL ｜ 葉裏の帯白色軟毛

光沢あるハート形葉の裏面には細かな毛が密生。受粉の罠と蝶の食草という二面性を持つ。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期　1月 〜 3月（花・果実）
出会いやすさ　★★☆☆☆（注意深く探すと発見）
視線の向き　低木に絡むつる・葉の裏陰（高さ1〜2m）
生育環境　照葉樹林の林縁、適度に陽の射す藪

見分けの急所　光沢のあるハート形の葉と、裏面の白い軟毛。葉陰に隠れる約3〜5cmのサクソフォン型花。

散歩道の空気と音

湯湾岳の深い木立。梢を渡る冷たい風の音だけが響く。薄暗い林床にしゃがみ込むと、静かな緑の合間に純白の小花と深い青の実が寄り添うように光を宿している。

リュウキュウルリミノキ 琉球瑠璃実の木

Lasianthus fordii アカネ科 ルリミノキ属

照葉樹林の湿潤な林床で、息を呑むような色彩のコントラストを見せてくれるのがリュウキュウルリミノキです。名前の通り、熟すと宝石のラピスラズリを思わせる鮮やかな瑠璃色に輝く球形の果実を実らせます。

一般的な植物資料では初夏の花とされることが多いですが、温暖な奄美では冬の1〜2月にも可憐な白い小花を咲かせている姿に出会えます。青い果実と白い花が同じ枝に並ぶ瞬間は、自然のめぐりの神秘を感じさせてくれます。

DETAIL ｜ 瑠璃色の宝石実

直径約8mmの鮮やかな球果。薄暗い林床でひときわ目を引く吸い込まれそうな深い青。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期	1月 〜 3月（花と実が同居）	出会いやすさ	★★★☆☆（湿った林床に自生）
視線の向き	足元〜膝丈（高さ0.5〜1.5mの低木）	生育環境	湯湾岳や金作原などの湿潤な照葉樹林内

見分けの急所 対生する長楕円形の革質葉の葉腋に、数個集まる白い小花と光沢あるコバルトブルーの実。

散歩道の空気と音

落ち葉が厚く積もる静寂の林床。鳥の鳴き声も遠のき、風も止む。踏みしめる土の柔らかさを感じながら、視線を地面すれすれまで下ろした時に初めて見つかる小さな息づかい。

ヒメフタバラン 姫双葉蘭

Neottia japonica　ラン科 サカネラン属

奄美の早春の山道で、最も見つけるのが難しい宝物のひとつがこのヒメフタバランです。草丈はわずか5〜10cmほど。落ち葉の間に2枚の小さな三角形の葉をピタリと広げ、その中央から細い花茎を伸ばします。

淡紫褐色の花は指先よりも小さく、唇弁の先が二股に分かれて逆Y字形を描く精緻な形をしています。急ぎ足の観光では絶対に気づけない、速度を落として歩く散歩者だけに許された格別の出会いです。

DETAIL ｜ 逆Y字形の精緻な花

花径約5mm。昆虫を確実に誘導するための複雑かつ優美なラン特有の唇弁構造。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期	2月中旬 〜 2月下旬	出会いやすさ	★★☆☆☆（極小・見落とし注意）
視線の向き	完全な足元・落ち葉の上（草丈5〜10cm）	生育環境	山地林床の落ち葉が堆積した腐植土上

見分けの急所　茎の基部に対生する2枚の小さな三角状卵形葉と、先端が2つに深く裂けた紫褐色の唇弁。

03
3月、草花の姿が変わり始めるころ

3月に入ると、奄美の空気はぐっとやわらぎ、林縁の光が一層明るくなります。
馬具の鐙のように堂々と巻き上がるムサシアブミ、斜面を一面の青紫で染めるタツナミソウ、そして季節を越えて咲き継ぐシュウブンソウ。
本格的な春の訪れとともに、島が生命の躍動に包まれていきます。

FEATURED FLORA IN CHAPTER 03

ムサシアブミ（武蔵鐙）

Arisaema ringens (Thunb.) Schott

馬具に似た迫力の仏炎苞と大きな三出複葉。森の主のような存在感。

アカボシタツナミソウ

Scutellaria rubropunctata

一方向に並び咲く青紫の波と、葉の裏に輝く星のような赤い腺点。

シュウブンソウ（秋分草）

Aster verticillatus

「秋」の名を持ちながら2月の湯湾岳で咲く、資料と現場の出会い。

散歩道の空気と音

木漏れ日が揺れる明るい林縁。春の風が通ると、肉厚で大きな葉がバサリと重い音を立てる。湿った土の香りが立ち上り、森が本格的に目覚めたことを知らせてくれる。

ムサシアブミ 武蔵鐙

Arisaema ringens (Thunb.) Schott サトイモ科 テンナンショウ属

3月の林縁で圧倒的な存在感を放つのがムサシアブミです。古武士が馬に乗る際に足を掛けた馬具「武蔵鐙（むさしあぶみ）」に形が似ていることから名付けられたサトイモ科の多年草です。

袋状にくるりと巻き上がった仏炎苞（ぶつえんほう）は深緑色に白や紫の筋が走り、まるで森の奥で息を潜める生き物のようです。上部を覆う光沢のある大きな三出複葉の傘の下を覗き込むと、自然が創り出した造形美の力強さに圧倒されます。

DETAIL ｜ 鐙（あぶみ）状の仏炎苞

上部が前方に大きく湾曲して開口部を覆う独特なフォルム。内部に肉穂花序を保護する。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期	2月下旬 〜 3月	出会いやすさ	★★★☆☆（湿った林床や林縁）
視線の向き	足元（高さ20〜40cm、大葉の下）	生育環境	低山の湿った半日陰、沢沿いの草地

見分けの急所 2枚の大きな光沢ある3小葉と、その下で鐙のように袋状に丸まった緑〜暗紫色の仏炎苞。

散歩道の空気と音

暖かな陽射しが注ぐ道端。斜面一面に揺れる淡い紫の波。道端の石垣に腰を下ろすと、遠くの森からウグイスの初鳴きが届き、心地よい春風が頬をなでていく。

アカボシタツナミソウ 赤星立浪草

Scutellaria rubropunctata　シソ科 タツナミソウ属

波頭が立つように一斉に同じ方向を向いて咲くタツナミソウ。奄美大島の林縁や沢沿いで出会うこの種は、葉を裏返してみることでその名の真の美しさに気づかされます。

葉の裏面には「赤褐色の腺点」が無数に散らばっており、光に透かすとまるで夜空にまたたく赤い星々のように輝きます。表の爽やかな青紫の筒花と、裏に隠された秘密の星空。散歩道で出会ったら、ぜひそっと葉裏を観察してみてください。

DETAIL ｜ 葉裏に輝く赤い星

三角状卵形の葉の裏面に密生する赤褐色の腺点。これが「アカボシ」の名前の由来。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期	3月 ～ 5月（斜面に群生）	出会いやすさ	★★★★☆（林道沿いの斜面）
視線の向き	足元～斜面（草丈10～25cm）	生育環境	低地の林縁、沢沿い、適度な日当たりの石垣

見分けの急所　同じ方向に並ぶ1.5cmほどの青紫の唇形花と、葉裏にびっしりある赤褐色の微細な腺点。

散歩道の空気と音

湯湾岳の山霧の中。水平に整然と枝を広げた端正な佇まい。葉に触れると、キク科特有のどこか懐かしい清々しい野草の香りが指先にふわりと残る。

シュウブンソウ 秋分草

Aster verticillatus キク科 シオン属

「秋分草」の名が示す通り、本土の植物図鑑では秋（8〜10月）の花として記載されています。しかし奄美大島では、真冬の2月から3月にかけて、湯湾岳などの湿潤な山道で元気な花姿に出会うことができます。

主茎から水平に何本も伸びる横枝の葉腋に、直径5mmほどの小さな目立たない頭花をつけます。本に書かれた一般的な季節と、実際の自然の現場との違いを教えてくれる、散歩者にとってかけがえのない観察体験です。

DETAIL ｜ 葉の付け根の極小花

水平に伸びた枝の付け根に下向きにつく淡黄緑色の花。派手さのない造形美。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期	2月 〜 3月（奄美での実測）	出会いやすさ	★★☆☆☆（見落としやすい）
視線の向き	足元（高さ30〜60cmの水平枝）	生育環境	湯湾岳などの山地林内、湿った半日陰

見分けの急所　水平に大きく開く側枝と、その葉腋に1〜3個下向きにつく直径約5mmの淡黄緑色頭状花。

また、いつもの道を歩く

旅の計画を立てる時、私たちはつい「どこへ行くか」「何を見るか」を過密に詰め込んでしまいがちです。しかし、名所を巡るだけでは見落としてしまう静かな命の輝きが、奄美の身近な道端にはあふれています。

季節が巡るたび、同じ道を歩いていても出会う草花の姿は刻一刻と変化します。昨日まで蕾だったものが花開き、散った花が地面を染め、やがて小さな実を結ぶ。自然の呼吸に自分の歩幅を合わせる散歩の時間は、日常の喧騒で固くなった五感をやさしくほどいてくれます。

この小さな本が、あなた自身の足元にある自然を見つめ直す、ひとつのきっかけとなれば幸いです。

奄美の自然を歩くための心得

01 ｜ ハブへの注意と対策

奄美の山野にはハブが生息しています。不用意に草むらや石垣の隙間、暗がりに手足を入れないこと。散歩時は長靴やくるぶしを覆う靴を着用し、夜間や日没前後の草地は避けましょう。

02 ｜ 植物の採取は厳禁

世界自然遺産エリアはもちろん、島内の希少植物の採取・持ち出しは法律および条例で厳しく禁止されています。出会った命は写真と記憶に収め、その場に残しましょう。

03 ｜ ゴミの持ち帰り

散歩道は島の人々の暮らしと生き物の棲み処です。持ち込んだものは全て持ち帰るマナーを徹底しましょう。

春の観察カレンダー ｜ 2〜3月の出会い

植物名	科名	実際の観察期	主な観察場所
ヒカンザクラ	バラ科	1月下旬〜2月下旬	山間部町道、林道
シラタマカズラ	アカネ科	冬〜3月（実）	湿った岩肌、大木
サクラツツジ	ツツジ科	2月〜3月	湯湾岳、金作原
リュウキュウウマノスズクサ	ウマノスズクサ科	1月〜3月	林縁、低木の藪
リュウキュウルリミノキ	アカネ科	1月〜3月（花・実）	湿潤な照葉樹林床
ヒメフタバラン	ラン科	2月中旬〜下旬	森林内の腐植土上
ムサシアブミ	サトイモ科	2月下旬〜3月	半日陰の林床、沢沿い
アカボシタツナミソウ	シソ科	3月〜5月	林縁斜面、石垣
シュウブンソウ	キク科	2月〜3月	湯湾岳などの山地林内

奄美の春を、草花とゆっくり歩く

2〜3月、身近な散歩道で見つけた自然

発行日	2026年11月2日 初版発行
写真・文	かめとら（奄美の草花さんぽ帖）
企画・装丁	奄美草花デジタル出版プロジェクト
協力	奄美自然観察の森、湯湾岳周辺山道

※本書の写真・文章の無断転載・複製を禁じます。