

AMAMI FLORA WALK BOOK ｜ VOL. 01

2〜3月、身近な散歩道で見つける自然

奄美の春を、
草花とゆっくり歩く

写真・文 ｜ かめとら

AMAMI ISLAND BOTANICAL ESSAY

身近な散歩道に、奄美の自然を見つける

世界自然遺産への登録以降、奄美大島を訪れる旅人は増えました。原生林や美しい海岸など、有名な名所には多くの人が足を運びます。しかし、私が日々の暮らしの中で最も心揺さぶられるのは、名もない身近な散歩道にひっそりと息づく草花たちです。

温帯と亜熱帯が交わる奄美の森は、少し目線を落とし、耳を澄ますだけで豊かな表情を見せてくれます。鳥の声や風の音、土の匂いを感じながら、歩く速度をほんの少し緩めてみる。この本は、そんな静かな奄美の歩き方を手渡すための小さな手帖です。

TABLE OF CONTENTS

CHAPTER 01 桜の色から春を探す P. 04

ヒカンザクラ（緋寒桜） 04

シラタマカズラ（白玉蔓） 06

サクラツツジ（桜躑躅） 08

CHAPTER 02 森の小花と不思議な形 P. 10

リュウキュウウマノスズクサ（琉球馬の鈴草） 10

APPENDIX 春の散歩手帖・索引・奥付 P. 12



散歩道の空気と音

2月下旬の曇り空。しっとりと湿った林道に、ルリカケスの澄んだ「ジャーッ」という声が響く。風が吹き抜けるたび、樹上から丸ごとの紅い花が音もなく足元へ落ちてくる。

ヒカンザクラ　緋寒桜

Cerasus campanulata　バラ科 サクラ属

本土の淡いソメイヨシノとは対照的に、奄美の山肌を鮮烈な紅で染め上げるのがヒカンザクラです。花びらは平らに開かず、小さなベルのように下を向いたまま半開きで咲きます。

この桜の散り際は、驚くほど潔いものです。花びらが一枚ずつ舞うのではなく、萼（がく）をつけたまま花の形のまま「ボトッ」と地面へ落ちていきます。舗装道路の上に鮮やかな緋色の絨毯が広がっているのを見つけたら、ぜひ立ち止まって樹上を見上げてみてください。



DETAIL ｜ 白花の変種

緋色の花より少し遅れて咲く珍しい白花。紅と白が並ぶと森の春の訪れがいっそう際立つ。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期　1月下旬 ～ 2月下旬

出会いやすさ　★★★★☆（林道沿いに多数）

視線の向き　樹上（5〜8m）および足元の落花

生育環境　山間部の町道、明るい林縁

見分けの急所　鐘形に下垂して咲く濃紫紅色の花。地面に花首ごと丸ごと落ちる特徴的な散り際。



散歩道の空気と音

苔むした湿った岩肌。頭上には桜の紅が広がる一方、足元の薄暗い日陰には真珠のような白が点々と灯る。触れるとひんやりと冷たく、しっとりとした森の呼吸が伝わってくる。

シラタマカズラ 白玉蔓

Psychotria serpens L. アカネ科 ボチョウジ属

春まだ浅い2月の散歩道で、ヒカンザクラの鮮烈な紅と見事な対比を描くのが、シラタマカズラの冬の実です。花が咲くのは初夏の5〜6月ですが、冬から早春にかけては真珠のような半透明の白い球形果実が岩肌を彩ります。

光沢のある肉厚な葉が気根を出して樹幹や岩肌に這い登る姿は、亜熱帯の強い生命力を感じさせます。花だけでなく、冬を越して残る果実に目を留めることで、奄美の自然の連なりがぐっと身近に感じられるはずです。



DETAIL ｜ 岩肌を這う光沢葉

気根を伸ばして大木や岩に密着。冬でも色褪せない肉厚な葉がみずみずしい。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期	冬〜3月（白い果実）	出会いやすさ	★★★☆☆（湿った岩肌・大木）
視線の向き	足元〜目線（岩肌、大木の幹の着生部）	生育環境	林内の湿った日陰、渓流沿いの岩石

見分けの急所 岩や樹幹に密着して這う多肉質の卵形小葉。直径約5mmの白玉のような艶やかな球果。



散歩道の空気と音

湯湾岳の山道。霧が流れ、ひんやりとした冷気が漂う中、森の緑に浮かび上がる淡いピンク。ツツジ特有のわずかな甘い気配が、湿った霧の中にふわりと溶けている。

サクラツツジ 桜躑躅

Rhododendron tashiroi ツツジ科 ツツジ属

奄美で「シロサクラ」の愛称でも親しまれるサクラツツジ。ツツジの仲間でありながら、桜のような淡い桃色から白色の優しい花を咲かせます。常緑のミツバツツジ類という植物学的にも貴重な種です。

花の見事さもさることながら、森を歩く際はぜひ「幹」にも注目してみてください。風雨に耐えながら年月を重ねた幹は激しくねじれ、独自の造形美を誇ります。静謐な森の中で出会うその姿は、奄美の冬から春への移ろいを告げる気品に満ちています。



DETAIL ｜ 淡桃色の花冠

直径約4cmの漏斗状花。雄しべが10本あり、花弁の奥に美しい赤紫色の斑点が宿る。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

実際の観察期	2月 〜 3月	出会いやすさ	★★★☆☆（山頂付近や湿潤な谷間）
視線の向き	目線〜樹上（幹のねじれと枝先の花）	生育環境	低山の林縁、湯湾岳や金作原などの湿潤な森

見分けの急所 直径約4cmの漏斗状花。雄しべが10本あり、花弁の内面上側に赤紫色の斑点がある。



散歩道の空気と音

昼下がりの林縁。木漏れ日の中にジャコウアゲハが黒く優雅に舞う。葉の陰に目を凝らすと、ひっそりと佇むサクソフォンのような奇妙な筒花。微かに土と青葉の香りが漂う。

リュウキュウウマノスズクサ 琉球馬の鈴草

Aristolochia liukiuensis Hatus. ウマノスズクサ科 ウマノスズクサ属

冬から春にかけての奄美の林縁で、宝探しのように探したくなるのがこの花です。サクソフォンや喫煙パイプを思わせる暗紫褐色の筒状花は、花弁ではなく萼が変化したもの。内部には逆毛があり、受粉のために昆虫を一時的に閉じ込めるトラップ構造を持っています。

大きなハート形のつる葉は、優美な蝶・ジャコウアゲハの幼虫の唯一のごちそうでもあります。図鑑の写真だけでは見過ごしてしまう草花も、その造形の面白さに気づくと、毎日の散歩道が博物館のように見えてきます。



DETAIL ｜ 葉裏の帯白色軟毛

光沢あるハート形葉の裏面には細かな毛が密生。受粉の罠と蝶の食草という二面性を持つ。

FIELD NOTE ｜ 観察の手がかり

- 実際の観察期: 1月 〜 3月（花・果実）
- 出会いやすさ: ★★☆☆☆（注意深く探すと発見）
- 視線の向き: 低木に絡むつる・葉の裏陰（高さ1〜2m）
- 生育環境: 照葉樹林の林縁、適度に陽の射す藪
- 見分けの急所: 光沢のあるハート形の葉と、裏面の白い軟毛。葉陰に隠れる約3〜5cmのサクソフォン型花。