

# ROZWIAZANIE WYGENEROWANE PRZEZ CHAT GPT

6. Oblicz  $\int_K^{AB} (2a - y)dx + xdy$ , gdzie  $K$  jest pierwszym łukiem cycloidy w kierunku zgodnym ze wzrostem parametru  $t$ .

““latex article amsmath

## Dane wejściowe:

Funkcja cycloidy z parametrem  $t$  jest dana równaniami parametrycznymi:

$$x(t) = a(t - \sin t)$$

$$y(t) = a(1 - \cos t)$$

Interwał parametrów:  $t \in [0, 2\pi]$

## Ogólny wzór:

Musimy obliczyć całkę:

$$\int_K^{AB} (2a - y) dx + x dy$$

Podstawiając równania parametryczne:

$$dx = \frac{d}{dt} [a(t - \sin t)] dt = a(1 - \cos t) dt$$

$$dy = \frac{d}{dt} [a(1 - \cos t)] dt = a \sin t dt$$

Zamieniamy całkę na parametr  $t$ :

$$\int_0^{2\pi} ((2a - a(1 - \cos t))a(1 - \cos t) + a(t - \sin t)a \sin t) dt$$

## Przekształcenie wzoru:

Uproszczenie wyrażenia:

$$= \int_0^{2\pi} ((a + a \cos t)a(1 - \cos t) + a(t - \sin t)a \sin t) dt$$

$$= \int_0^{2\pi} (a^2(1 + \cos t - \cos^2 t) + a^2(t \sin t - \sin^2 t)) dt$$

Podział na dwie całki:

$$= a^2 \int_0^{2\pi} (1 + \cos t - \cos^2 t) dt + a^2 \int_0^{2\pi} (t \sin t - \sin^2 t) dt$$

## Przeliczenie krok po kroku:

Całka pierwsza:

$$\int_0^{2\pi} (1 + \cos t - \cos^2 t) dt$$

Różnicujemy po składnikach:

$$= \int_0^{2\pi} 1 dt + \int_0^{2\pi} \cos t dt - \int_0^{2\pi} \cos^2 t dt$$

$\int_0^{2\pi} 1 dt = 2\pi$ ,  $\int_0^{2\pi} \cos t dt = 0$ , Używając formuły redukcyjnej:

$$\int_0^{2\pi} \cos^2 t dt = \pi$$

Wynik dla pierwszej całki:

$$= 2\pi - \pi = \pi$$

Całka druga:

$$\int_0^{2\pi} (t \sin t - \sin^2 t) dt$$

Używamy całkowania przez części i formuły redukcyjnej:

$$= \int_0^{2\pi} t \sin t dt - \int_0^{2\pi} \sin^2 t dt$$

Pierwsza częściowa całka:

$$\int_0^{2\pi} t \sin t dt = [-t \cos t]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \cos t dt = 0$$

Wynik druga całka:

$$\int_0^{2\pi} \sin^2 t dt = \pi$$

Podsumowanie drugiej całki:

$$= 0 - \pi = -\pi$$

**Wynik końcowy:**

Wynik całej całki:

$$a^2(\pi - \pi) = 0$$

**Ostateczny wynik:**

$$\boxed{0}$$